بسم الله الرحمن الرحيم

# هدية مميزة لكل طالب توجيهي علمي في فلسطين

## تلخيص المرجان للأستاذ معتصم ريحان

# رياضيات توجيهي علمي 2022
# حسب المنهاج الفلسطيني

**و لأول مرة في فلسطين**

هذا التلخيص مشروح بالكامل و بشكل تفصيلي مميز

بفيديوهات خاصة ، للطلب راسلني واتس

أ. معتصم ريحان 00972598709519

**الوحدة الثانية**

***محتويات التلخيص :**

*حل أسئلة و أمثلة الكتاب الوزاري بشكل مفصل مع التوضيح

*حل أسئلة امتحانات سابقة مهمة بشكل مفصل مع التوضيح

*حل أسئلة خارجية مهمة بشكل مفصل مع التوضيح

*تلخيص المفاهيم و القوانين و النظريات بشكل مبسط


تابع الأستاذ : معتصم ريحان على الفيسبوك و اليوتيوب

حصص خاصة أون لاين ( زووم) 00972598709519

روابط فيديوهات شرح رياضيات توجيهي علمي للأستاذ : معتصم ريحان

1) نظريتا رول والقيمة المتوسطة أولاً (رول)

2) نظريتا رول والقيمة المتوسطة ثانياً (نظرية القيمة المتوسطة )

3) نظريتا رول والقيمة المتوسطة (نظرية القيمة المتوسط)حل أسئلة امتحانات سابقة

هذه أول ثلاث فيديوهات لشرح هذا التلخيص و التلخيص مرتب حسب ترتيب الفيديوهات ، للطلب راسلني واتساب

أ. معتصم ريحان 009728709519

ملاحظة هذه الفيديوهات موجودة على اليوتيوب و لكن بروابط خاصة لن تستطيع الدخول إليها إلا عن طريق الرابط الخاص أو رمز ال QR

# أهـم الروابط التي تخص الأستاذ معتصـم ريحان والتي تخص مادة الرياضيات

**أولاً : رابط الصفحة الرسمية على الفيسبوك**
https://www.facebook.com/moatsem99/
**ثانياً : رابط قناة اليوتيوب**
https://youtube.com/channel/UCgPSlTtKlXKAZAlx6oij7gw
**ثالثاً : جروب توجيهي فلسطين المميزين على الفيسبوك**
https://www.facebook.com/groups/238012177540675/?ref=share
**رابعاً : جروب توجيهي فلسطين الأوائل على الفيسبوك**
https://www.facebook.com/groups/196693448738715/?ref=share
**خامساً : جروب جيش الصف العاشر والتاسع والثامن والسابع على الفيسبوك**
https://www.facebook.com/groups/2513410778968166/?ref=share
**سادساً : جروب توجيهي فلسطين ٢٠٢٢ طريق التميز على الفيسبوك**
https://www.facebook.com/groups/212508760785340/
**سابعاً : جروب أخبار توجيهي فلسطين عللى الفيسبوك**
https://www.facebook.com/groups/384829289738741/
**ثامناً : جروب توجيهي علمي علمك عللى الفيسبوك**
https://www.facebook.com/groups/390990069179374/?ref=share
**تاسعاً : جروب رياضيات توجيهي فلسطين مع الاستاذ معتصم ريحان**
https://www.facebook.com/groups/988870048361125/?ref=share
**عاشراً : جروب فيزياء ورياضيات توجيهي فلسطين على الفيس بوك بإشراف أ.معتصم ريحان أ.معتز ريحان**
https://www.facebook.com/groups/1630835297115843/?ref=share
**الحادي عشر : قناة مميزة على التليجرام❤**
https://t.me/twgehe
**الثاني عشر : جروب توجيهي فلسطين المميزين على التليجرام**
https://t.me/moatsem999
**الثالث عشر : جروب المناقشة على التيليجرام**
https://t.me/joinchat/OVsG6v9lUUg2MmU0

**الرابع عشر : مجموعات الواتس**

**(مجموعة الواتس الاولى)**

https://chat.whatsapp.com/IGgn478qSlXJkSgGyLNgv1

**(مجموعة الواتس الثانية)**

https://chat.whatsapp.com/Fpi1Cn9O0tj5O6fNUqP9Rw

**( مجموعة الواتس الثالثة)**

https://chat.whatsapp.com/L9iPBQN6XV32DcYtVjEPDk

**(مجموعة الواتس الرابعة)**

https://chat.whatsapp.com/Isj9IZtliKm4RUctHKDKdL

**(مجموعة الواتس الخامسة**

https://chat.whatsapp.com/J01c64XwfKqHPkzvSB4B6a

**(مجموعة الواتس السادسة)**

https://chat.whatsapp.com/ExeSmRQ9R8WI7JhbmBI0KO

**(مجموعة الواتس السابعة)**

https://chat.whatsapp.com/HGJE4dkii9sIntVL4LvqYc

**(مجموعة الواتس الثامنة)**

https://chat.whatsapp.com/GmepTq0asoiJBHxYo9KLad

**(مجموعة الواتس التاسعة)**

https://chat.whatsapp.com/Gsuw09BcD0NKt5NDLgiXn2

**(مجموعة الواتس العاشرة)**

https://chat.whatsapp.com/DgOlXo9Bthz4QbwE5DEtEt

**الخامس عشر : حساب الانستغرام الرسمي الخاص بالأستاذ معتصم ريحان**

https://www.instagram.com/moatasemabdallah/

**للدروس الخاصة أون لاين على برنامج الزووم راسلني واتساب**

**أ. معتصم ريحان**

00972598709519

# الوحدة الثانية (تطبيقات التفاضل)

صفحة رقم (26)

توجيهي 2022

## (2-1) الدرس الأول (نظريتا رول والقيمة المتوسطة)

(*) **نظرية رول**: إذا كانت $م(س)$ اقتراناً متصلاً في الفترة $[أ، ب]$ وقابلاً للاشتقاق في $]أ، ب[$ وكان $م(أ) = م(ب)$

فإنه يوجد عدد حقيقي واحد على الأقل $جـ \in ]أ، ب[$ بحيث $م'(جـ) = صفر$

**باختصار** (شروط رول (3) ونتيجة): أ. معتصم ريحان

(1) متصل $[أ، ب]$ (2) قابلاً للاشتقاق على $]أ، ب[$ (3) $م(أ) = م(ب)$

(*) النتيجة: يوجد $جـ \in ]أ، ب[$ بحيث $م'(جـ) = صفر$

أ. معتصم ريحان

**مثال (1) ص 56**: بين أن الاقتران $م(س) = س^2 - س - 6$ يحقق شروط نظرية رول في الفترة $[0، 1]$ ثم جد قيمة أو قيم $جـ$ التي تعينها النظرية

**الحل**

بما أن $م(س)$ متصل على $[0، 1]$ (2) وقابلاً للاشتقاق في $]0، 1[$ لأنه كثير حدود.

(3) الشرط الثالث: $م(0) = م(1)$

$(0)^2 - (0) - 6 = (1)^2 - (1) - 6$

$-6 = -6$ تحقق الشرط الثالث

إذاً يوجد $جـ \in ]0، 1[$ بحيث $م'(جـ) = صفر$

$م'(س) = 2س - 1$

$م'(جـ) = 2جـ - 1 = صفر$

$2جـ = 1$

$جـ = \frac{1}{2} \in ]0، 1[$ (1)

أ. معتصم ريحان

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس والتيليجرام
00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال (2) ص 55

اذا علمت أن الاقتران $م(س) = جتا^2 س + 2 جا س$ يحقق شروط نظرية رول في الفترة $[\rho ، \pi]$ حيث $\rho > 0$ فما قيمة / قيم الثابت $\rho$ .

أ. معتصم ريحان

الحل بما أن الاقتران $م(س)$ يحقق شروط نظرية رول في الفترة $[\rho ، \pi]$ فإنه متصل وقابل للاشتقاق.

لاحظ
$جا\pi = 0$
$جتا 2\pi = 1$

وأيضاً $م(\rho) = م(\pi)$ ← لأنه يحقق رول

$جتا^2 \rho + 2 جا \rho = جتا^2 \pi + 2 جا \pi$ ← تطابقة

$1 - جا^2 \rho + 2 جا \rho = 1 + 0$

$-جا^2 \rho + 2 جا \rho = 0$

$جا \rho (-جا \rho + 2) = 0$

اما $جا \rho = 0$ او $-جا \rho + 2 = 0$

$جا \rho = 1$

$\Leftarrow جا \rho = 0$

$\Leftarrow \rho = 0, \pi, 2\pi$

وبما $\rho = 0, \pi, 2\pi$ كلهم مرفوضين لانه شرط بنه السؤال $\rho > 0$

$\pi \notin ]\rho ، 2\pi[$

$2\pi \notin ]\rho ، \pi[$

$\Leftarrow \rho = \frac{\pi}{2} \in ]\rho ، \pi[$

(1) $جتا 2س = جتا^2 س - جا^2 س$
(2) $جتا 2س = 2 جتا^2 س - 1$
(3) $جتا 2س = 1 - 2 جا^2 س$




أ. معتصم ريحان
تابعني على اليوتيوب والفيس
00972598709519

مثال (3) ص 55

نتيجة جـ التي تحددها نظرية رول على الاقتران $م(س) = جا س + جتا س$ في الفترة $[0 ، \frac{\pi}{2}]$

أ) 0 ب) $\frac{\pi}{2}$ ج) $\frac{\pi}{4}$ د) $\frac{\pi}{3}$

① $م(س)$ متصل على $[0 ، \frac{\pi}{2}]$ وقابل للاشتقاق على $]0 ، \frac{\pi}{2}[$

$م(0) = م(\frac{\pi}{2})$

$جا(0) + جتا(0) = جا(\frac{\pi}{2}) + جتا(\frac{\pi}{2})$

$1 = 1$

② $م'(جـ) = جتا جـ - جا جـ = 0$

$جتا جـ = جا جـ$

$\frac{جتا جـ}{جتا جـ} = \frac{جا جـ}{جتا جـ}$

$1 = ظا جـ$

$\therefore جـ = 45°$

$\therefore جـ = \frac{\pi}{4} \in ]0 ، \frac{\pi}{2}[$ حيث





تم تحويله صوتيا بـ CamScanner

مثال 3 / ص 55 — اثبت أن د تحقق شروط نظرية رول على الاقتران

$$د(س)=\begin{cases} س-2 & ,\ -4 \le س < -1 \\ س^2-7 & ,\ -1 \le س \le 1 \end{cases}$$

في الفترة $[-4,1]$ ثم جد قيمة/قيم جـ التي حددها النظرية إنه وجدت.

الحل ① $د(س)$ متصل على $[-4,1[$ لأنه كثير حدود

$د(س)$ متصل على $]-1,1]$ لأنه كثير حدود

لكن $د(س)$ غير متصل عند $س=-1$ لأن $\lim_{س\to -1^+} د(س) \neq \lim_{س\to -1^-} د(س)$

وعليه فإن الاقتران $د(س)$ غير متصل على $[-4,1]$

② $هـ(س)=\begin{cases} 1 & ,\ -4 < س < -1 \\ 2س & ,\ -1 < س < 1 \end{cases}$

هـ(-1) غير موجودة لأنه غير متصل أصلاً عند $س=-1$

أ. معتصم ريحان

اذاً $د(س)$ غير قابل للاشتقاق على $]-4,1[$

③ $د(-4)=د(1)=(-6)$

لم تتحقق شرط نظرية رول على $[-4,1]$، وهذا لا يعني بالضرورة عدم وجود قيم لـ جـ والبحث عن قيم جـ التي $د(جـ)=0$

فإنه عندما $-4 < س < -1$ تكون $د(س) \neq 0$ لا يوجد جـ في هذه الفترة

عندما $-1 < س < 1$ فإنه $2جـ=0$ أي أنه $جـ=0 \in ]-1,1[$

---

مثال 2015 / اذا كانت $د(س)=س^2-3س-ب$ تحقق شروط نظرية رول على الفترة $[-1,ب]$ فإن قيمة الثابت ب تساوي

(أ) 4 (ب) 2 (جـ) 3 (د) 1

الحل $د(-1)=د(ب)$ لأنه تحقق شروط رول

$(-1)^2-3(-1)-ب=ب^2-3ب-ب$

$4-ب=ب^2-4ب$

$ب^2-3ب-4=0$

$(ب-4)(ب+1)=0$

إما $ب=4$ أو $ب=-1$ (مرفوضة لا تنتمي الفترة المعطاة)

لو طلب قيمة جـ التي يحدد عندها رول

$د(جـ)=0$

$2جـ-3=0$

$جـ=\frac{3}{2}$

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس وانستجرام
00972598709519
حصص خاصة أونلاين



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال (٦) ص 56 / إذا علمت أنه الاقتران م(س) = $\frac{(س^3 - 5س + 6)(س + ب)}{(س - 3)}$

س ∈ ]-١، ب[ يحقق شروط نظرية رول على [-١، ب] وكانت ﻫ التي تعينها النظرية هـ جـ = صفر فجد الثابت ب، ب .

الحل بما أن الاقتران م(س) يحقق شروط نظرية رول في الفترة [-١، ب]

فإن م(س) متصل في [-١، ب] ومنها فإن ب > ٣

$م(س) = \frac{(س-3)(س-2)(س+ب)}{(س-3)} = (س-2)(س+ب)$

أ. معتصم ريحان

$م(س) = س^2 + ب س - 2س - 2ب$

$س \neq 3$

وبما أن م(١) = م(-١) لأن الاقتران يحقق شروط رول

إذاً $ب^2 + ب ب - 2ب - 2ب = (-1)^2 + ب(-1) - 2(-1) - 2ب$

$ب^2 - 2ب + ب ب - 2ب = 1 - ب + 2 - 2ب$

$ب^2 - 2ب + ب ب = 3 - ب$ ... (١)

$م'(س) = 2س + ب - 2$ ، $س \in ]-1، ب[$

وبما أنه يحقق جـ معطاه في السؤال (صفر)

$\Rightarrow م'(هـ) = صفر$

أ. معتصم ريحان

تابعني على اليوتيوب والفيس

00972598709519

$م'(هـ) = صفر$

$م'(0) = ب - 2 = صفر$

$ب = 2$ عوض الآن في معادلة (١)

$ب^2 - 2ب + 2ب = 3 - 2$

$ب^2 = 1 \Leftarrow ب = \pm 1$

ب = -١ مرفوضة

$\therefore ب = 1$

أ. معتصم ريحان

مثال ٦



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مسألة (5) صـ 56

اذا كان $m(x)$ اقترانا متصلا على $[p, جـ]$ بحيث $g(x)$ موجودة في $]p, جـ[$ وكان $m(p) = m(ب) = m(جـ)$ حيث $p < ب < جـ$ اثبت وجود عدد حقيقي واحد على الأقل $د \in ]p, جـ[$ بحيث $g(د) = صفر$

الحل (1) نختبر في تحقق شروط رول على الاقتران $m(x)$ في $[p, ب]$

نرى أن $g(x)$ موجودة في $]p, جـ[$ فإنه $m(x)$ متصل على $[p, ب]$ وقابل للاشتقاق على $]p, ب[$ $\Leftarrow m(p) = m(ب)$

$\therefore$ تحقق شروط نظرية رول ومنها يوجد $جـ \in ]p, ب[$ بحيث $m'(جـ) = صفر$

(2) نختبر في شروط رول على الاقتران $m(x)$ في $[ب, جـ]$

$m(x)$ متصل على $[ب, جـ]$ وقابل للاشتقاق على $]ب, جـ[$ $\Leftarrow m(ب) = m(جـ)$

$\therefore$ تحقق شروط رول ومنها يوجد $جـ \in ]ب, جـ[$ بحيث $m'(جـ) = صفر$

لاحظ أن $جـ < جـ$

أ. معصم ريحان

(3) نختبر في تحقق شرط نظرية رول على الاقتران $g(x)$ في $[جـ, جـ]$

$g(x)$ متصل في $[جـ, جـ]$ وقابل للاشتقاق في $]جـ, جـ[$

$g(جـ) = g(جـ)$

$\therefore$ تحقق شروط نظرية رول على $g(x)$ في $[جـ, جـ]$

سيوجد على الأقل عدد مثل $هـ \in ]جـ, جـ[$ $\geq 2$ $]p, جـ[$

بحيث $g'(د) = صفر$

أ. معصم ريحان
تابعني على الفيس والبوتيوب
00972598709519

صـ 5


ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

## ⊛ تمارين ومسائل ص 59 "الدرس نظرية رول" أ. معتصم ريحان

س1/ بين أيا من الاقترانات الآتية تحقق شروط نظرية رول في الفترة المعطاة ثم جد جميع/ أو قيم جـ التي تمنحها النظرية في كل حالة "إن وجدت"

أ. معتصم ريحان

[أ] $م(س) = س^2 - 4س$ ، $س \in [0, 4]$

الحل ① $م(س)$ متصل على $[0, 4]$

② $م(س)$ قابلاً للاشتقاق على $]0, 4[$

③ $م(0) = م(4)$

$0 = 0$ $\quad$ $4^2 - 4(4) = 0^2 - 4(0)$

$\therefore م(س)$ تحقق شروط نظرية رول

في $]0, 4[$ : $\exists جـ \in ]0, 4[$ بحيث $م'(جـ) = 0$

$م'(س) = 2س - 4$

$م'(جـ) = 2جـ - 4 = 0$

$2جـ = 4$

$جـ = 2 \in ]0, 4[$

أ. معتصم ريحان

(ب) $م(س) = س^3 - 2س - 3$ ، $س \in [-1, 3]$

الحل ① $م(س)$ متصل على $[-1, 3]$ لأنه كثير حدود

② $م(س)$ قابل للاشتقاق على $]-1, 3[$

③ $م(-1) = م(3)$

$(-1)^3 - 2(-1) - 3 = (3)^3 - 2(3) - 3$

$0 = 0$

إذاً الاقتران $م(س)$ تحقق شروط نظرية رول على $[-1, 3]$

$م'(جـ) = 0$

$م'(جـ) = 3جـ^2 - 2 = 0$

$جـ = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$

$\frac{\sqrt{6}}{3} \in ]-1, 3[$ ، $-\frac{\sqrt{6}}{3} \in ]-1, 3[$

أ. معتصم ريحان

أ. معتصم ريحان
00972598709519
تابعني على اليوتيوب والفيس

ص 6



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ب) $م(س) = \ln(س + \frac{1}{س})$ $\quad س \in [\frac{1}{2}, 2]$

الحل

1) $م(س)$ متصل على $[\frac{1}{2}, 2]$

2) $م(س)$ قابلاً للاشتقاق على $]\frac{1}{2}, 2[$

3) $م(\frac{1}{2}) = م(2)$

$\ln \frac{1}{2} + \frac{1}{\frac{1}{2}} = \ln 2 + \frac{1}{2}$

$\ln \frac{1}{2} - \ln 2 = \frac{1}{2} - 2$

$\therefore م(س)$ تحقق شروط رول على $[\frac{1}{2}, 2]$

إذاً $\exists جـ \in ]\frac{1}{2}, 2[$ بحيث $مـ(جـ) = صفر$

$مـ(جـ) = \frac{1 + \frac{-1}{جـ^2}}{جـ + \frac{1}{جـ}} = صفر$

$\Leftarrow 1 - \frac{1}{جـ^2} = صفر \Leftarrow جـ^2 = 1 \Leftarrow$ (جـ = ± 1)

الباب رفض لانتمائه للفترة

$\therefore جـ = 1 \in ]\frac{1}{2}, 2[$

أ. معتصم ريحان

---

ثانوية 17 عام

الدور الثاني

قيمة جـ التي تحددها نظرية رول على الاقتران $م(س) = |س^2 - 2س + 1|$ في الفترة $[0, 2]$ هي

أ) $\frac{1}{2}$ ب) 1

ج) $\frac{3}{2}$ د) $\frac{5}{2}$

أولاً نعيد تعريف المطلق

$س^2 - 2س + 1 = 0$

$(س - 1)(س - 1) = 0$

$س = 1$

$م(س) = \begin{cases} س^2 - 2س + 1 & ، س \leq 1 \\ -س^2 + 2س - 1 & ، س > 1 \end{cases}$

| + + + + | + + + + |
|---|---|
| نفس ① | نفس صفر |

$م(0) = م(2)$

$1 = 1$

$\therefore مـ(س) = \begin{cases} 2س - 2 & ، س < 1 \\ -2س + 2 & ، س > 1 \end{cases}$

$مـ(جـ) = صفر \quad مـ(1)^+ = مـ(1)^-$

$-2جـ + 2 = 0$

$-2جـ = -2$

$جـ = 1 \in ]0, 2[$

$م(س)$ متصل عند $س = 1$

ومقابل للاشتقاق عند $س = 1$

أ. معتصم ريحان

---

حصص خاصة أونلاين

تأسيس ما قبل الفيزياء والبيولوجي

00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

د) $م(س) = جا^2 س + 2 جا س$ ، $س \in [0, \frac{\pi}{2}]$ أ. معتصم ريحان

الحل ① $م(س)$ متصل على $[0, \frac{\pi}{2}]$

② $م(س)$ قابلاً للاشتقاق $]0, \frac{\pi}{2}[$

③ $م(0) = م(\frac{\pi}{2})$

$جا^2(0) + 2جا(0) = جا^2 \frac{\pi}{2} + 2جا \frac{\pi}{2}$

$0 \neq 2$ خطأ

$م(س)$ لا يحقق شروط رول على $[0, \frac{\pi}{2}]$

$م'(س) = جتا^2 س \times 2 + 2 جتا س$

$م'(جـ) = 2جتا^2 جـ + 2 جتا جـ = 0$

$\Downarrow$

$(2جتا^2 جـ - 1) + جتا جـ = 0$

نكمل هنا

$2جتا^2 جـ + جتا جـ - 1 = 0$

$(2جتا جـ - 1)(جتا جـ + 1) = 0$

إما $2جتا جـ = 1$ أو $جتا جـ = -1$

$جتا جـ = \frac{1}{2}$ ، $جـ = \pi$

$\therefore جـ = 60°$

$\therefore جـ = \frac{\pi}{3}$

$\pi \notin ]0, \frac{\pi}{2}[$

$\frac{\pi}{3} \in ]0, \frac{\pi}{2}[$

أ. معتصم ريحان

00972598709519

---

**مثال 59** إذا كانت $م(س) = س$ جتا $س$ ، $س \in [0, \frac{\pi}{2}]$ تحقق نظرية رول لإيجاد أن العدد الذي تعينها النظرية هي عندما $س = ظتا س$

الحل ① $م(س)$ متصل على $[0, \frac{\pi}{2}]$

② $م(س)$ قابل للإشتقاق على $]0, \frac{\pi}{2}[$

③ $م(0) = م(\frac{\pi}{2})$

$0 \times جتا 0 = \frac{\pi}{2} \times جتا \frac{\pi}{2}$

$0 = 0$

$\therefore م(س)$ يحقق شروط رول على $[0, \frac{\pi}{2}]$

$م'(س) = س \times -جا س + جتا س \times 1$

$م'(جـ) = جـ \times -جا جـ + جتا جـ = 0$

$\frac{جـ جا جـ}{جا جـ} = \frac{جتا جـ}{جا جـ}$

$جـ = ظتا جـ$

$س = ظتا س$ #

أ. معتصم ريحان

تابعين لي اليوتيوب والفيس

صفحتي أونلاين خاصة

على الزوم



صفحة ضوئيا بـ CamScanner

السلام عليكم ورحمة الله

هذا التلخيص المميز جداً هدية جارية مني وعن أهلي وأموات وجميع موتى المسلمين .

* هذا التلخيص موجود بالكامل فيديوهات مصورة وهي عبارة عنه حصص خاصة مميزة على الزووم، اذا أردت التسجيلات كاملة وسلمني على العنوان 00972598 709519 أ.معتصم ريحان

* فيديوهات هذا التلخيص بنفس ترتيب التلخيص وهذا هو الشرح المميز جداً والذي لا يوجد في فلسطين مثله .
بفضل الله .

* بعض هذه الفيديوهات موجودة بشكل عام للكل على قناتي على اليوتيوب باسم (( معتصم ريحان رياضيات توجيهي ))
وباقي الفيديوهات موجودة بروابط خاصة لمنه يطلبها وانتي .

* اعتمد بشكل كامل في هذا التلخيص وبإذن الله ستحصل على العلامة الكاملة .

* لا تنسى أن تتابعي صفحتي الرسمية على الفيس بوك وقناتي على اليوتيوب وكلاهما باسم (( معتصم ريحان رياضيات توجيهي ))

* بشرى سارة لكل طلاب فلسطين هذا التلخيص شامل ومجاني بالكامل لكل طلاب فلسطين وبإمكانك ارساله لمنه تحب لكنه فيديوهات هذا التلخيص غير مجانية وانا أردت الحصول عليها وسلمني وانتي .

أ. معتصم سلام ريحان
00972598 709519

تابعيني على مجموعات الوانتي والتليجرام ضروري .



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

صفحة رقم 27

توجيهي علمي 2022

أ. معتصم ريحان

# ⊛ نظرية القيمة المتوسطة

⊛ تعريف : اذا كانت $م(س)$ اقترانا متصلا في $[ب، ا]$ وقابلا للإشتقاق في $]ب، ا[$ فإنه يوجد عدد حقيقي واحد على الأقل $جـ \in ]ب، ا[$ بحيث أن $م'(جـ) = \frac{م(ا) - م(ب)}{ا - ب}$

مثال (6) ص 57 كتاب

بين أن الاقتران $م(س) = س^3 + 1$ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في الفترة $[-2، 1]$ ثم جد قيمة/قيم $جـ$.

الحل شروط نظرية القيمة المتوسطة.

① الاقتران $م(س)$ متصل في الفترة $[-2، 1]$

② الاقتران $م(س)$ قابلا للإشتقاق في الفترة $]-2، 1[$ لأنه كثير حدود

إذن تحققت شروط نظرية القيمة المتوسطة على الاقتران $م(س)$ في $[-2، 1]$

والنتيجة يوجد على الأقل $جـ \in ]-2، 1[$ بحيث

$م'(جـ) = \frac{م(1) - م(-2)}{1 - (-2)} \Leftarrow 3جـ^2 = \frac{(2) - (-7)}{3}$

$\Leftarrow 9جـ^2 = 9 \Leftarrow جـ^2 = 1 \Leftarrow جـ = \pm 1$ $\therefore جـ = -1 \in ]-2، 1[$

| شروط رول | شروط القيمة المتوسطة |
|---|---|
| ① $م(س)$ متصل على $[ب، ا]$ | ① $م(س)$ متصل على $[ب، ا]$ |
| ② $م(س)$ قابل للاشتقاق على $]ب، ا[$ | ② $م(س)$ قابلا للاشتقاق على $]ب، ا[$ |
| ③ $م(ا) = م(ب)$ | ③ ينتج $جـ \in ]ب، ا[$ بحيث أن $م'(جـ) = \frac{م(ا) - م(ب)}{ا - ب}$ |
| ④ ينتج وجود $جـ \in ]ب، ا[$ بحيث أن $م'(جـ) = 0$ | |

أ. معتصم ريحان
00972598709519
حصص خاصة أونلاين Zoom



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال (7) صـ 58

إذا علمت أن الاقتران $ق(س) = \begin{cases} أس + ب ، -3 \leq س \leq -1 \\ -س^2 ، -1 < س \leq 0 \end{cases}$

يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في الفترة $[-3، 0]$ جد الثابتين أ، ب

الحل بما أن الاقتران $ق(س)$ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في الفترة $[-3، 0]$ فإنه $ق(س)$ متصل على $[-3، 0]$ وعليه $ق(س)$ متصل عند $س = -1$

أي أنه $\lim_{س \to -1^+} ق(س) = \lim_{س \to -1^-} ق(س)$

$-(-1)^2 = -أ + ب \Leftarrow$ $\boxed{-أ + ب = -1}$ ①

وأيضاً $ق(س)$ قابلاً للاشتقاق في $]-3، 0[$

$ق(س) = \begin{cases} أ ، -3 < س < -1 \\ -2س ، -1 < س < 0 \end{cases}$

$أ، ب \in ح$

وتكون $ق'(-1^+) = ق'(-1^-)$

$أ = -2 \times -1 \Leftarrow$ $\boxed{أ = 2}$

$-أ + ب = -1$

$-2 + ب = -1$

$\boxed{ب = 1}$

---

مثال (8) صـ 58

اثبت أن $ق$ تحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة للاقتران $ق(س) = [\![س^2 + 1]\!]$ في الفترة $[0، 1]$ ثم جد قيمة/قيم $ج$ التي تعينها النظرية إنه وجد

الحل أولاً نعيد تعريف اقترانه الصحيح

$ق(س) = \begin{cases} 1 ، 0 \leq س < \frac{1}{2} \\ 2 ، \frac{1}{2} \leq س < 1 \\ 3 ، س = 1 \end{cases}$

$ق(س) = \begin{cases} صفر ، \text{فلا} \ س < \frac{1}{2} \\ صفر ، \frac{1}{2} < س < 1 \end{cases}$

لأنه نبحث في شروط القيمة المتوسطة

$ق(س)$ غير متصل في الفترة $[0، 1]$

لأنه النهاية عند $س = \frac{1}{2}$ غير موجودة.

نكمل هنا

وأيضاً $ق(س)$ غير قابل للاشتقاق في $]0، 1[$

∴ لم تتحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على $ق(س)$ في $[0، 1]$، وهذا لا يعني عدم وجود قيم لـ $ج$ والبحث عن قيمة أو قيم $ج$ إنه وجد

$ق'(ج) = \frac{ق(1) - ق(0)}{1 - 0} = \frac{3 - 1}{1} = 2$

$2 \notin ]0، 1[$

إذاً لا يوجد $ج \in ]0، 1[$

أو مستحيل

ص 2



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

س 2 / بين أياً من الاقترانات الآتية يحقق شروط نظرية (القيمة المتوسطة) في الفترة المعطاة، ثم جد ممكن أو قيم جـ التي تحددها النظرية في كل حالة (إن وجدت).

الحل [أ] $م(س) = س^3 - س - 1$ ، $س \in [-1, 2]$

(ب) (أ)

① $م(س)$ متصل على $[-1, 2]$ وقابل للاشتقاق على $]-1, 2[$ كثير حدود

$\therefore م(س)$ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على $[-1, 2]$

$\therefore جـ \in ]-1, 2[$ $\quad م'(س) = 3س^2 - 1$

$م'(جـ) = \frac{م(ب) - م(أ)}{ب - أ}$ $\quad$ لاحظ $م(2) = 5$، $م(-1) = -1$

$3جـ^2 - 1 = \frac{م(2) - م(-1)}{2 - (-1)} \Leftarrow 3جـ^2 - 3 = 5 - (-1)$

$\Leftarrow 9جـ^2 = 9 \Leftarrow جـ^2 = 1 \Leftarrow جـ = \pm 1$ السالب مرفوض لأنه القيمة عندما تكون خارج الفترة

$\therefore جـ = 1 \in ]-1, 2[$

أ. معتصم ريحان

[ب] $م(س) = \frac{4}{س + 2}$ ، $س \in [-1, 2]$

الحل $م(س)$ متصل على $[-1, 2]$ لأنه كثير حدود وقابل للاشتقاق على $]-1, 2[$

$\therefore م(س)$ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في $[-1, 2]$

إذاً يوجد $جـ \in ]-1, 2[$

(ب) (أ)

لاحظ $م(2) = 1$، $م(-1) = 4$

$م'(جـ) = \frac{م(ب) - م(أ)}{ب - أ} = \frac{-4}{(جـ + 2)^2}$

$\Leftarrow \frac{-4}{(جـ + 2)^2} = \frac{1 - 4}{2 - (-1)} \Leftarrow -12 = -3(جـ + 2)^2$

$\Leftarrow 4 = (جـ + 2)^2 \Leftarrow جـ + 2 = 2 \Leftarrow جـ = 0 \in ]-1, 2[$

$جـ + 2 = -2 \Leftarrow جـ = -4 \notin ]-1, 2[$ ✗

أ. معتصم ريحان

00972598709519

ص 3



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

$[ج] \quad م(س) = \sqrt{س} + ٢س \quad ، \quad س \in [٤، ٩]$

الحل $م(س)$ متصل على $[٤، ٩]$ لانه مجموع اقترانين متصلين

$م(س)$ قابل للاشتقاق على $]٤، ٩[$

$\therefore م(س)$ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على $[٤، ٩]$

(ب) (أ)

$\therefore$ يوجد $جـ \in ]٤، ٩[$

$$م'(س) = \frac{١}{٢\sqrt{س}} + ٢$$

$$م'(جـ) = \frac{١}{٢\sqrt{جـ}} + ٢ = \frac{م(٩) - م(٤)}{٩ - ٤}$$

$$\frac{١ + ٤\sqrt{جـ}}{٢\sqrt{جـ}} = \frac{٢١ - ١٠}{٥}$$

$$\Leftarrow ٥ + ٢٠\sqrt{جـ} = ٢٢\sqrt{جـ} \Leftarrow ٥ = ٢\sqrt{جـ} \Leftarrow \sqrt{جـ} = \frac{٥}{٢}$$

بتربيع الطرفين $\Leftarrow$ $جـ = \frac{٢٥}{٤} \in ]٤، ٩[$ ✓

---

**اثراء وتحدي**

اذا كان $م(س) = س^٢ + ٤س$ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في $[١، ب]$ وكانت قيمة جـ التي تعينها النظرية تساوي $\frac{٥}{٢}$ فما قيمة ب

[أ] ٤ [ب] ٥ [جـ] ٦ [د] ٩

الحل $م'(جـ) = \frac{م(ب) - م(١)}{ب - ١}$ لانه يحقق النظرية $[١، ب]$

(ب) (أ)

$$٢جـ + ٤ = \frac{(ب^٢ + ٤ب) - (١ + ٤)}{ب - ١}$$

عندما $جـ = \frac{٥}{٢}$

فإنه $٢ \times \frac{٥}{٢} + ٤$

$م'(جـ) = ٩$

$$\Leftarrow ٩ = \frac{ب^٢ + ٤ب - ٥}{ب - ١}$$ بالضرب تبادلي

$$٩ب - ٩ = ب^٢ + ٤ب - ٥$$

$$ب^٢ - ٥ب + ٤ = ٠$$

إما $(ب - ٤) = ٠$ أو $(ب - ١) = ٠$ مرفوضة

$م'(جـ) = ٢جـ + ٤$



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال 3 / ص 59

اذا كانت $م(س) = \begin{cases} أ س^2 + 2س & ، 0 \leq س \leq 2 \\ س^3 - ب س + 12 & ، 2 < س \leq 3 \end{cases}$

تحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في الفترة $[0, 3]$ فجد قيم الثابتين أ، ب ثم جد العدد/القيم جـ التي تحددها النظرية.

الحل $م(س)$ متصل على $[0, 3]$ لأنه يحقق شرط القيمة المتوسطة إذاً أيضاً متصل عند نقطة التحول $س = 2$

$\lim_{س \to 2^+} م(س) = \lim_{س \to 2^-} م(س)$

$م(2) = أ(2)^2 + 2(2) = 4أ + 4$

$(2)^3 - ب(2) + 12 = 20 - 2ب$

$\Leftarrow 4أ + 2ب = 16$

ومنها $2أ + ب = 8$ ①

② $م(س)$ قابل للاشتقاق على $[0, 3]$ $\therefore$ $م(س)$ قابل للاشتقاق عند $س = 2$

$م'(س) = \begin{cases} 2أ س + 2 & ، 0 < س < 2 \\ 3س^2 - ب & ، 2 < س < 3 \end{cases}$

$م'(2^+) = م'(2^-)$

$2أ(2) + 2 = 3(2)^2 - ب$

$4أ + 2 = 12 - ب$

$\Leftarrow 4أ + ب = 10$ ②

نحل المعادلتين ① مع ② بالحذف :

$2أ + ب = 8$

$4أ + ب = 10$ (بالطرح)

$-2أ = -2$

$أ = 1$ بالتعويض $\Leftarrow ب = 6$

أ. معتصم رمضان
مصطفى أونه لابنيه خامسه
تابعنا على الفيس واليوتيوب

تكملة الحل في الصفحة التالية ↓



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تابع حل تمرين 3 ص 59 ك

هنا سنجد مكان/قيم جـ التي تحددها النظرية: (أ) [أ، ب] (ب)

أ. معتصم ريحان

$$م'(جـ) = \frac{م(ب) - م(أ)}{ب - أ}$$

$$م'(جـ) = \frac{م(3) - م(0)}{3 - 0}$$

$$م'(جـ) = \frac{21 - 0}{3} = 7$$

$$م(س) = \begin{cases} س^2 + 2س & ، 0 \leq س \leq 2 \\ -س^3 + 6س + 12 & ، 2 < س \leq 3 \end{cases}$$

$$م(3) = -3^3 + 18 + 12 = 21$$

$$م(0) = (0)^2 + 2(0) = 0$$

(أ) (ب) (ط) (ح) (ز)

(*) الآن نفوض من الفترة الأولى $0 \leq س \leq 2$

$$م'(جـ) = 7$$

$$2جـ + 2 = 7$$

$$2جـ = 5 \Leftarrow جـ = \frac{5}{2}$$

$\frac{5}{2} \notin ]0,2[$ مرفوضة

(*) الآن نفوض من الفترة الثانية $2 < س \leq 3$

$$م'(جـ) = 7$$

$$3جـ^2 - 6 = 7$$

$$3جـ^2 = 13$$

$$جـ = \pm \sqrt{\frac{13}{3}}$$

$\sqrt{\frac{13}{3}} \in ]2,3[$ ✓

$-\sqrt{\frac{13}{3}} \notin ]2,3[$ مرفوضة

$$م(س) = \begin{cases} 2س + 2 & ، 0 < س < 2 \\ 3س^2 - 6 & ، 2 < س < 3 \end{cases}$$

أ. معتصم ريحان
تابعنا على اليوتيوب والفيس

أ. معتصم ريحان
00972598709519
حصص أونلاين خاصة مميزة

ص 6


ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال ص 59 / اذا كانت $م(س) = \frac{1}{س}$ ، $س \in [أ، ب]$ حيث $أ < ب$

مناقشة باستخدام نظرية القيمة المتوسطة وجود عدد حقيقي واحد على الأقل $جـ \in ]أ، ب[$ بحيث $جـ^2 = أ \cdot ب$

أ. معتصم ريحان
00972598709519

الحل $م(س)$ متصل على $[أ، ب]$ المعرف عليها.

$م(س)$ قابل للاشتقاق على $]أ، ب[$ المعرف عليها.

$\therefore م'(س) = \frac{-1}{س^2}$

$\therefore م(س)$ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على $[أ، ب]$

$جـ \in ]أ، ب[$

$م'(جـ) = \frac{م(ب) - م(أ)}{ب - أ} = \frac{-1}{جـ^2}$

أ. معتصم ريحان

$\frac{\frac{1}{ب} - \frac{1}{أ}}{ب - أ} = \frac{-1}{جـ^2} \Leftarrow \frac{\frac{أ - ب}{أب}}{ب - أ} = \frac{-1}{جـ^2}$

أ. معتصم ريحان

$\Leftarrow (-ب + أ) = \frac{ب - أ}{أب} \times جـ^2$

$+1 = \frac{جـ^2}{أب} \Leftarrow جـ^2 = أب$ وهو المطلوب

---

مثال ص 60 / ما مجموعة قيم جـ التي تحددها النظرية القيمة المتوسطة على الاستراد

$م(س) = س^2 + س - 6$ في الفترة $[-1، 2]$

الحل $م'(جـ) = 2جـ + 1 = \frac{م(2) - م(-1)}{2 - (-1)}$

$\Leftarrow 6جـ + 3 = (ف) - (-6)$

$\Leftarrow 6جـ = 3$

$\Leftarrow جـ = \frac{1}{2} \in ]-1، 2[$

(أ) $\frac{5}{2}$ (ب) $\frac{3}{2}$ (جـ) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{1}{2}$

أ. معتصم ريحان
تابعين على اليوتيوب والفيس
00972598709519

ص 7



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال / اذا كان ع(س) = (م∘ه)(س) ، س ∈ ]أ، ب[

م(س)، ه(س) اقترانين متصلين من [أ، ب] وقابلين للاشتقاق

من ]أ، ب[ وكان ه(أ) = ب ، ه(ب) = أ

أثبت وجود عدد واحد على الأقل جـ ∈ ]أ، ب[ بحيث

ع(أ) - ع(ب) = قـ(جـ) (ب - أ)

أ. معتصم ريحان
00972598709519

الحل ① م(س) متصل على [أ، ب]

② م(س) قابل للاشتقاق على ]أ، ب[

م(س) يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على [أ، ب] ∴ جـ ∈ ]أ، ب[

قـ(جـ) = (م(ب) - م(أ)) / (ب - أ)

أ. معتصم ريحان

قـ(جـ) = (م(ه(أ)) - م(ه(ب))) / (ب - أ)

قـ(جـ) = (ع(أ) - ع(ب)) / (ب - أ) ← أخرج تبادلي

ع(أ) - ع(ب) = قـ(جـ) (ب - أ) #

* لاحظ مُعطى :-

ع(س) = (م∘ه)(س)

ع(س) = م(ه(س))

ع(أ) = م(ه(أ))

(م∘ه)(أ) = م(ه(أ))

(م∘ه)(ب) = م(ه(ب))

أ. معتصم ريحان

2020 / اذا علمت أن الاقتران م(س) = (س - ٥س + ٦)(س + ك) / (س - ٣) ، س ≠ ٣ يحقق شروط نظرية رول في الفترة المغلقة [أ، ب] وكانت القيمة (س - ٣) التي تحددها النظرية هي جـ = صفر فما قيمة الثابت ك

الحل م(س) = (س - ٣)(س - ٢)(س + ك) / (س - ٣) ⇐ م(س) = (س - ٢)(س + ك)

أ ١ ، ب -١

ج ٢ ، د -٢

يحقق رول ∴ قـ(جـ) = ٠ ⇐ قـ(٠) = ٠

قـ(س) = ١ × (س - ٢) + ١ × (س + ك)

صفر = -٢ + ك

ك = ٢

أ. معتصم ريحان ( رياضيات توجيهي )
تأسيس على الفيزيا والبوتيون
00972598709519
حصص خاصة أونلاين zoom



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2019 تجريبي خانيونس / اذا كانت $م(س) = \begin{cases} أ-س^2 & ، -2 \leq س \leq 1 \\ 6-ب س & ، 1 < س \leq 2 \end{cases}$

يحقق نظرية القيمة المتوسطة في $[-2، 2]$ فما قيمة الثابتين أ، ب على الترتيب

(أ) 2، 5 (ب) 2، 5 (ج) 2، -5 (د) -2، 5

الحل بما أن $م(س)$ يحقق شروط القيمة المتوسطة ∴ متصل على $[-2، 2]$

∴ نهاية $م(س)$ عند $س = 1^+$ = نهاية $م(س)$ عند $س = 1^-$

$6 - ب = أ - 1$

$أ + ب = 7$ ... (1)

$م(-2) = م(2)$

$-ب = -2 \times 1$

$∴ ب = 2$

$أ + 2 = 7 \Leftarrow أ = 5$

أ. معتصم ريحان

2019 تجريبي القدس / واحد فقط من الاقترانات الآتية يحقق شروط نظرية رول على $[-2، 2]$

(أ) $م(س) = |س|$ (ب) $م(س) = [س]$

(ج) $م(س) = س^2 - 1$ (د) $م(س) = \frac{س}{3س - 1}$

الحل $|س|$ اقترانه القيمة المطلقة غير قابل للاشتقاق عند $س = 0 \in [-2، 2]$

$[س]$ اقترانه الصحيح غير متصل وغير قابل للاشتقاق عند نقاط تحوله في الفترة $[-2، 2]$

$\frac{س}{3س - 1}$ اقترانه غير معرف عند صفر المقام وهو $س = \frac{1}{3} \in [-2، 2]$

$م(س) = س^2 - 1$ متصل وقابل للاشتقاق لأنه كثير حدود

$م(2) = م(-2)$

$2^2 - 1 = (-2)^2 - 1$

$3 = 3$ يحقق رول

أ. معتصم ريحان

تابعني على الفيس واليوتيوب

حل



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أ. معتصم ريحان

# أسئلة امتحانات سابقة على درس نظرية رول والقيمة المتوسطة

(28) حل تمرين رقم

توجيهي علمي 2022

**تجريبي نابلس 2019** اذا كانت $م(س) = \sqrt{س^2 + 9}$ يحقق شروط نظرية رول على الفترة المغلقة $[أ، ب]$ ، $م(أ) = 0$ فإن قيمة $أ$ ، $ب$ على الترتيب هما

(أ) $-0.5$ ، $0.5$ (ب) $-4$ ، $4$ (ج) $-3.3$ ، $3.3$ (د) هـ ، هـ

الحل يحقق رول $\therefore م(أ) = م(ب)$

$\Leftarrow$ مقدار موجب $= \sqrt{ب^2 + 9}$ ربع الطرفين

$\Leftarrow 25 = ب^2 + 9 \Leftarrow ب^2 = 16 \Leftarrow ب = \pm 4$

أ. معتصم ريحان

تابعنا على الفيس والبوتيوب

**تجريبي القدس 2019** قيمة جـ الناتجة من تطبيق نظرية رول على الاقتران $م(س) = س\sqrt{س^2 + 6س}$ في $[-6، 0]$ تساوي

(أ) $-5$ (ب) $-4$ (ج) $3$ (د) $-2$

قاعدة السلسلة

الحل $م(جـ) = 0 \Leftarrow م(س) = س \times \frac{1}{2\sqrt{س^2 + 6س}} (2س + 6) + \sqrt{س^2 + 6س}$

$م(جـ) = \frac{جـ}{\sqrt{جـ^2 + 6جـ}} + \sqrt{جـ^2 + 6جـ} = 0$

$\Leftarrow \frac{جـ}{\sqrt{جـ^2 + 6جـ}} = -\sqrt{جـ^2 + 6جـ}$

أ. معتصم ريحان

00972598709519

$\Leftarrow جـ = -(جـ^2 + 6جـ) \Leftarrow -جـ^2 - 12جـ = جـ$

$\Leftarrow -12 = 2جـ \Leftarrow جـ = -6$

**الكمال 2018** اذا كان $م(س) = جا^2 س + 2جا س$ ، $س \in [0، \frac{\pi}{2}]$ فما قيمة جـ التي تحددها نظرية رول عند تطبيقها.

(أ) $\frac{\pi}{4}$ (ب) $\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{2}$ (د) $\pi$

حاول أن تحل بنفسك

أ. معتصم ريحان

حل



تحويل صوتي بـ CamScanner

2011 أكمال

ق، ك اقترانان كل منهما يحقق شروط نظرية رول على الفترة [P، ب]
ابحث هل يحقق حاصل الضرب (م × ك) شروط هذه النظرية على الفترة [P، ب]

الحل

∵ م(س)، ك(س) يحققان شروط رول على الفترة [P، ب]

∴ م(س)، ك(س) متصلاً على الفترة [P، ب] وقابلان للاشتقاق على ]P، ب[ .

∴ م(P) = م(ب) ، ك(P) = ك(ب)

∵ هـ(س) = م(س) × ك(س) متصل على الفترة [P، ب] لأنه حاصل ضرب اقترانين متصلين

وقابلة للاشتقاق على ]P، ب[

∵ هـ(P) = م(P) × ك(P) ، هـ(ب) = م(ب) × ك(ب)

∴ هـ(P) = هـ(ب)

∴ الاقتران هـ(س) يحقق شروط رول على [P، ب]

∴ يوجد عدد حقيقي واحد على الأقل جـ ∈ ]P، ب[ بحيث هـ(جـ) = صفر

أ. معتصم ريحان
تابعنا على الفيس والتويتر

2016 إذا كان م(س) = { [س/٢] + جـ ، ١ ≤ س < ٣ ; س² - Pس ، ٣ ≤ س ≤ ب }

أولاً بغير تعريف الصحيح

طول الدرجة = ٣

سنأخذ الفترة الجزئية المطلوبة

صفر ١ ٢

[س/٢] = { صفر ، ١ ≤ س < ٣ ; ١ ، ٣ ≤ س ≤ ب }

∴ م(س) = { جـ ، ١ ≤ س < ٣ ; س² - Pس ، ٣ ≤ س ≤ ب }

⇐ قـ(س) = { صفر ، ١ < س < ٣ ; ٢س - P ، ٣ < س < ب }

∵ م(س) يحقق رول على [١، ب]

∴ م(١) = م(ب)

جـ = ب² - Pب

-٩ = ب² - ٦ب

ب² - ٦ب + ٩ = صفر

⇐ إما ب = ٣ أو ب = ٣

أ. معتصم ريحان

يحقق شروط نظرية رول أوجد الثوابت P، ب، جـ

أ. معتصم ريحان

بما أن م(س) يحقق رول إذاً

نهـ م(س) = نهـ م(س)
س ← ٣⁻ ، س ← ٣⁺

جـ = ٣ × P - ٣²

-جـ - ٣P = -٩

① جـ + ٣P = ٩

وبما أنه يحقق رول

∴ قـ(٣⁻) = قـ(٣⁺)

صفر = ٢ × ٣ - P

-٦ = -P

P = ٦

بالتعويض في ①

وينتج جـ = -٩



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

جد الثوابت $P$، $ب$، $جـ$ التي تجعل الدالة $م(س)$ تحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على الفترة $[٠، ٢]$.

$$م(س) = \begin{cases} |س^٢ - س - ٦| & ، ٠ \leq س < ١ \\ P س + ب & ، ١ \leq س < ٢ \\ جـ & ، س = ٢ \end{cases}$$

أ. معتصم ريحان

الحل / لابد أولاً عند تعريف المطلق $س^٢ - س - ٦ = ٠$

$(س = ٣)$ $(س = -٢)$

$$\therefore م(س) = \begin{cases} -س^٢ + س + ٦ & ، ٠ \leq س < ١ \\ P س + ب & ، ١ \leq س < ٢ \\ جـ & ، س = ٢ \end{cases}$$

الفترة المطلوبة




أ. معتصم ريحان
تابعونا على الفيس بوك واليوتيوب

بما أن $م(س)$ تحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على $[٠، ٢]$ إذاً $م$ متصل عند $س = ١$

$$\Leftarrow P \times ١ + ب = -(١)^٢ + (١) + ٦$$

$$P + ب = ٦ \quad (١)$$

$$م'(س) = \begin{cases} -٢س + ١ & ، ٠ < س < ١ \\ P & ، ١ < س < ٢ \end{cases}$$

$$م'(١^+) = م'(١)$$

$$P = -٢(١) + ١$$

$$P = -١$$

الآن نعوض في المعادلة (١)

ومنها $ب = ٧$

$$\Leftarrow م'(جـ) = \frac{م(ب) - م(P)}{ب - P}$$

عند الفترة $]١، ٢[$ $\quad P = -١$

أ. معتصم ريحان

$$P = \frac{م(٢) - م(١)}{٢ - ١}$$

$$P = ٥ - ٦$$

$$P = -١$$

$\because$ قيمة $جـ$ في كل الفترة $]١، ٢[$ $\quad -١ = -١$

عند الفترة $]١، ٢[$ $\quad -٢جـ + ١ = -١$، $(جـ > ٠)$

$$-٢جـ + ١ = \frac{٦ - ٦}{١ - ٠}$$

$$-٢جـ + ١ = ٠$$

$$جـ = \frac{١}{٢} \in ]٠، ١[$$

$\therefore$ قيمة $جـ$ التي تحققها النظرية في $]١، ٢[$

$\because م(س)$ تحقق شروط النظرية

إذاً لابد أن تكون متصل عند $س = ٢$

$\therefore \lim_{س \to ٢} م(س) = م(٢)$

$$٢P + ب = جـ$$

$$٢ \times -١ + ٧ = جـ$$

$$-٢ + ٧ = جـ$$

$$جـ = ٥ \quad \#$$

لو طلب السؤال قيمة $جـ$ التي تحققها النظرية

أ. معتصم ريحان



CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

2018 س / اذا كان م(س) = { -س² + ٣س + ب ، ٠ ≤ س ≤ ١
                          { ب س + ٤ ، ١ < س ≤ ٢

معتمدا بجان

يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على [٠، ٢] جد قيمة الثابتين
ب، ب ثم جد قيمة جـ التي تعينها النظرية.

الحل / الاقترانه م(س) متصل عندما س = ١ لانه يحقق شروط النظرية القيمة المتوسطة

∴ نهـا م(س) = نهـا م(س)
س ← ١⁺ ، س ← ١⁻

ب × (١) + ٤ = -(١)² + ٣(١) + ب

ب + ٤ = ٢ + ب

ب - ب = -٢ ⟸ معادلة (١)

م(س) = { -٢س + ٣ ، ٠ < س < ١
       { ب ، ١ < س < ٢

م(١)⁺ = م(١)⁻ لانه م(س) يحقق شروط النظرية القيمة المتوسطة

ب = -٢(١) + ٣

ب = ١ ⟸ بعوض في معادلة (١) ينتج ان ب = ٣

∴ م(س) = { -٢س + ٣ ، ٠ < س < ١
         { ١ ، ١ < س < ٢

م(جـ) = (م(ب) - م(ا)) / (ب - ا) = (م(٢) - م(٠)) / (٢ - ٠) = (١ - ٣) / ٢ = -٢/٢

عندما ١ < جـ < ٢ ، عندما ٠ < جـ < ١

م(جـ) = ١ ، م(جـ) = -٢جـ + ٣

-٢/٢ ≠ ١ لا يوجد جـ ، -٢/٢ = -٢جـ + ٣

-٢جـ = -٢/٢ - ٣

-٢جـ = -٣/٢

جـ = ٣/٤ ⟸ مقبولة ∴ جـ = ٣/٤

معتمد / بجان

الحل


ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2019 دور ثاني / اذا كانت $م(س) = \begin{cases} س^2 + 1 & ، -3 \leq س < 1 \\ 2س & ، 1 \leq س \leq 5 \end{cases}$

1) بين أن $م(س)$ يحقق شروط نظرية رول على $[-3، 5]$

2) أوجد معادلة/قيم جـ التي تعينها النظرية.

الحل $\lim_{س \to 1^+} م(س) = \lim_{س \to 1^-} م(س)$ ← بنحصل الاتصال عند نقطة التحول

$2 \times 1 = (1)^2 + أ$

$2 = أ + 1$ ∴ $م(س)$ متصل عند $س = 1$

$م'(س) = \begin{cases} 2س & ، -3 \leq س < 1 \\ 2 & ، 1 \leq س < 5 \end{cases}$ $م'(1^+) = م'(1^-)$

$2 = 2 \times 1$

∴ $م(س)$ قابل للاشتقاق عند $س = 1$

∴ $م(س)$ متصل على $[-3، 5]$ وقابل للاشتقاق على $]-3، 5[$

$م(-3) = م(5)$

$(-3)^2 + 1 = 2 \times (5)$

$10 = 10$

∴ $م(س)$ يحقق شروط رول على $[-3، 5]$

∴ يوجد على الأقل عدد حقيقي واحد جـ $\in ]-3، 5[$ بحيث $م'(جـ) = 0$

عندما $-3 \leq جـ < 1$

$م'(جـ) = ص$

$2جـ = ص$

$جـ = \frac{ص}{2}$ $ص \in ]-3، 1[$ مقبولة

∴ $جـ = \frac{ص}{2}$

وعندما $1 \leq جـ < 5$

$م'(جـ) = 2$

$\frac{ص}{2} \neq 2$ لا يوجد جـ هنا

أ. معتصم رحال
00972598709519
تابعنا على الفيس واليوتيوب

(ص ع)



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

س٢٥ / ٢٥ درجة

اذا كانت م(س) معرفة على الفترة [٠، ٢] حيث

$$م(س) = \begin{cases} \frac{٣-س}{٢} & ، س > ١ \\ \frac{١}{س} & ، س \leq ١ \end{cases}$$

اثبت ان م(س) تحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة للاقتران م(س) على الفترة [٠، ٢] ثم أوجد قيمة/قيم جـ التي تحددها النظرية إن وجدت.

$\because$ م(س) متصل عند س = ١

$\because$ نهـ م(س) = نهـ م(س) = م(١)
س ← ١⁺ ، س ← ١⁻

$\frac{١}{١} = \frac{٣-١}{٢}$

١ = ١

$$م'(س) = \begin{cases} -\frac{١}{٢} & ، س > ١ \\ -\frac{١}{س^{٢}} & ، س < ١ \end{cases}$$

م'(١)⁺ = م'(١)⁻

$-\frac{١}{٢} = -\frac{١}{م'(١)^{٢}}$

$-١ \neq -\frac{١}{٢}$

$\therefore$ لم تتحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على [٠، ٢] فإن م(س) غير قابلة للاشتقاق عند س = ١

وهذا لا يعني عدم وجود جـ

نبحث عن ايجاد قيمة جـ

$م'(جـ) = \frac{م(ب) - م(أ)}{ب - أ}$

$م'(جـ) = \frac{م(٢) - م(٠)}{٢ - ٠}$

$م'(جـ) = \frac{\frac{١}{٢} - \frac{٣}{٢}}{٢} = \frac{-١}{٢}$

عندما جـ < ١

فإن $م'(جـ) = -\frac{١}{٢} \Leftarrow -\frac{١}{٢} = -\frac{١}{٢}$

$\therefore$ قيمة جـ ∈ كل الفترة ]٠، ١[

$$م'(س) = \begin{cases} -\frac{١}{٢} & ، ٠ < س < ١ \\ -\frac{١}{س^{٢}} & ، ١ < س < ٢ \end{cases}$$

عندما ١ < جـ < ٢

$م'(جـ) = -\frac{١}{٢}$

$-\frac{١}{جـ^{٢}} = -\frac{١}{٢}$

$جـ^{٢} = ٢$

$جـ = \pm \sqrt{٢}$ السالب مرفوض

$\therefore جـ = \sqrt{٢} \in ]١، ٢[$

قيم جـ هي $\sqrt{٢} \cup ]٠، ١[$

جـ ∈ $]٠، ١[ \cup \sqrt{٢}$



Camscanner بـ صوتيا

2020 دور ثاني

اذا كانت $م(س) = \begin{cases} أ س^2 + 2س & ، 0 \le س \le 2 \\ س^3 - ب س + 12 & ، 2 < س \le 3 \end{cases}$

يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على الفترة $[0، 3]$ أوجد قيمة الثابتين أ، ب

الحل بما أن $م(س)$ يحقق القيمة المتوسطة اذاً متصل على $[0، 3]$ وعند $س = 2$

$\Leftarrow$ نهاية $م(س)$ = نهاية $م(س)$
$س \to 2^+$ $س \to 2^-$

$(2)^3 - ب(2) + 12 = أ(2)^2 + 2(2) \Leftarrow 8 - 2ب + 12 = 4أ + 4$

$\Leftarrow 4أ + 2ب = 16$ $\Leftarrow 4أ + ب = 8$ ①

$م(س)$ قابل للاشتقاق على $]0، 3[$ لأنه يحقق النظرية.

$\therefore م'(2^+) = م'(2^-)$

$3(2)^2 - ب = 2أ(2) + 2$

$12 - ب = 4أ + 2$

$4أ + ب = 10$ ②

أ. معتصم ريحات
تابعنا على الفيس والديوتوب

$م'(س) = \begin{cases} 2أس + 2 & ، 0 < س < 2 \\ 3س^2 - ب & ، 2 < س < 3 \end{cases}$

نحل معادلة ① مع ② بالحذف

① $8 = ب + 4أ$

② $10 = ب + 4أ$

(اطرح) $-2 = -2أ$

$أ = 1$ ومنها $ب = 6$

حاولة تحل بنفسك

اذا كانت $م(س) = س^2 - 9س + 2$ يحقق شروط رول على الفترة $[أ، ب]$

$م(أ) = 5$ فإن قيم أ، ب على الترتيب

أ) $-5، 5$ ب) $-4، 4$ ج) $-3، 3$ د) $-1، 1$

أ. معتصم ريحات
جميع حقوق محفوظة أونلاين Zoom

هذا التلخيص مشروح مع شرح تركيب العبارات الخاصة



تم مسحه ضوئيا بـ CamScanner

2020 اذا كانت م(س) كثير حدود وكان المستقيم ص = ٤س - ٣
يمس منحنى م(س) عند (١، م(١)) والمستقيم ٣ص - ١٢س = ١٨
يمس منحنى م(س) عند (٣، م(٣)) باستخدام نظرية رول اثبت انه
يوجد جـ ∈ ]١، ٣[ بحيث مَ(جـ) = صفر

الحل السؤال طلب الاثبات باستخدام رول اذا لازم تتحقق شروط رول

م(س) كثير حدود متصل على [١، ٣] وقابل للاشتقاق على ]١، ٣[
مَ(س) كثير حدود متصل على [١، ٣] وقابل للاشتقاق على ]١، ٣[

متصل ⟺ قابل للاشتقاق ⟺ م(أ) = م(ب)

الشرط الثاني وهو مَ(أ) = مَ(ب)

⟸ مَ(١) = مَ(٣)

مَ(١) = ظا هـ = ميل المماس عند س = ١

مَ(٣) = ظا هـ = ميل المماس عند س = ٣

الحالة الأولى تماس المستقيم الأول ص - ٤س = -٣

يمس عند (١، م(١))

الحالة الثانية تماس المستقيم الثاني ٣ص - ١٢س = ١٨

يمس عند (٣، م(٣))

معامل س / معامل ص = معامل س / معامل ص

-٤ / ١ = -١٢ / ٣

٤ = ٤ تحقق شرط رول الثاني

∴ يوجد جـ ∈ ]١، ٣[ بحيث مَ(جـ) = صفر

أ. معتصم رحال 00972598709519

حاول أنه تحل مجموعة جميع قيم جـ التي يمكن الحصول عليها من تطبيق نظرية القيمة المتوسطة على الاقتران م(س) = ٦س - ١١ من الفترة [٢، ٧] ؟

(أ) ]٢، ٧[ (ب) {٦} (جـ) { } (د) [٢، ٧]

أ. معتصم رحال
تابعني على الفيس والتويتر
صفحتي خاصة أو تلاقيني رسالة إيضا
00972598709519

صـ 8



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

**خاص** اذا كان $م(س)$ ، $هـ(س)$ اقترانين كثيري حدود موجبتين متقاطعين عند النقطتين $(س_1، صـ_1)$ ، $(س_2، صـ_2)$ اثبت أنه يوجد على الأقل جـ $\in ]س_1، س_2[$ بحيث أن

$$\frac{م(جـ)}{هـ(جـ)} = \frac{م'(س)}{هـ'(س)} \quad ، \quad هـ(س) \neq 0$$

أ. معتصم ريحاني
00972598709519

الحل نفرض أن $ك(س) = \frac{م(س)}{هـ(س)}$ ، $س \in [س_1، س_2]$ $هـ(س) \neq 0$ لأنها موجبة

① $ك(س)$ متصل لأنه حاصل قسمة اقترانين متصلين.

② $ك(س)$ قابل للاشتقاق

③ $ك(س_1) = \frac{م(س_1)}{هـ(س_1)} = \frac{صـ_1}{صـ_1} = 1$

$ك(س_2) = \frac{م(س_2)}{هـ(س_2)} = \frac{صـ_2}{صـ_2} = 1$

$\therefore ك(س)$ يحقق شرط رول

$\therefore$ يوجد جـ $\in ]س_1، س_2[$ بحيث أن $ك'(جـ) = 0$

$$ك'(جـ) = \frac{هـ(جـ) \times م'(جـ) - م(جـ) \times هـ'(جـ)}{(هـ(جـ))^2} = 0$$

$$\Rightarrow هـ(جـ) \times م'(جـ) - م(جـ) \times هـ'(جـ) = 0$$

$$\frac{هـ(جـ) \times م'(جـ)}{هـ(جـ) \times هـ'(جـ)} = \frac{م(جـ) \times هـ'(جـ)}{هـ(جـ) \times هـ'(جـ)}$$

$$\boxed{\frac{م'(جـ)}{هـ'(جـ)} = \frac{م(جـ)}{هـ(جـ)}} \quad \#$$

سؤال تميز

أ. معتصم ريحاني
تابعنا على الفيس بوك واليوتيوب

خارج ميز / اذا كان $م(س)$ كثير حدود معرف على $[0,2]$ بحيث
$م(1) > م(0) > م(2)$ اثبت انه يوجد $ج_1, ج_2 \in ]0,2[$
بحيث $هـ(ج_1) \times هـ(ج_2) < صفر$ أ. معتصم ريحان

الحل $م(س)$ كثير حدود متصل على $[0,2]$ وقابل للاشتقاق $]0,2[$

$\therefore م(س)$ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة

$\therefore$ يوجد $ج \in ]0,2[$ بحيث $هـ(ج) = \frac{م(2)-م(0)}{2-0}$

نبحث شروط نظرية القيمة المتوسطة على $[0,1]$

$م(س)$ متصل على $[0,1]$ وقابل للاشتقاق على $]0,1[$

$\therefore$ يوجد $ج_1 \in ]0,1[$ بحيث $هـ(ج) = \frac{م(1)-م(0)}{1-0}$

$\therefore هـ(ج_1) = م(1) - م(0)$ ①




$م(1) > م(0) > م(2)$
مُعطى من السؤال

موجبة

نبحث شروط نظرية القيمة المتوسطة على $[1,2]$

$م(س)$ متصل على $[1,2]$ وقابل للاشتقاق على $]1,2[$

$\therefore$ يوجد $ج_2 \in ]1,2[$ بحيث $هـ(ج) = \frac{م(2)-م(1)}{2-1}$

$\therefore هـ(ج_2) = م(2) - م(1)$ ②

سالبة

أ. معتصم ريحان

المطلوب اثبات انه $هـ(ج_1) \times هـ(ج_2) < صفر$

ولاحظ انه $م(1) - م(0) > صفر$ لانه مُعطى في السؤال $م(1) > م(0) > م(2)$

ولاحظ أيضاً انه $م(2) - م(1) < صفر$ من المُعطى $م(1) > م(0) > م(2)$

$\therefore هـ(ج_1) \times هـ(ج_2) < صفر$ #

موجب $\times$ سالب $<$ صفر

سالب $<$ صفر . #

أ. معتصم ريحان

تابعنا على الفيس والبوتيوب

مقطع خامة أونة لا يبيع ميزة



صحة صوتيا بـ CamScanner

ص 29 و 30
توجيهي علمي 2022
أ. معتصم ريحان

## * تعريف

يكون مخن الاقتران م (س) المعرف من [ P ، ب ] ، س1 ، س2 ∈ [ P ، ب ]

1. متزايداً من [ P ، ب ] إذا تحقق الشرط: عندما س1 < س2 فإن م (س1) < م (س2)
2. متناقصاً من [ P ، ب ] إذا تحقق الشرط: عندما س1 < س2 فإن م (س1) > م (س2)
3. ثابتاً من [ P ، ب ] إذا تحقق الشرط عندما س1 < س2 فإن م (س1) = م (س2)

**مثال (1) ص 26** من الشكل المجاور، حدد الفترات التي يكون فيها منحنى الاقتران م (س) متزايداً أو متناقصاً أو ثابتاً




1. الاقتران م (س) ثابتاً في الفترة [ P ، ج ]
2. الاقتران م (س) متناقصاً في الفترة [ ج ، د ]
3. الاقتران م (س) متزايداً في الفترة [ د ، ب ]

## * التزايد والتناقص باستخدام اختبار المشتقة الأولى:

**نظرية:** إذا كان م (س) اقتراناً متصلاً في [ P ، ب ] وقابلاً للاشتقاق على ] P ، ب [ .

1. الاقتران م (س) يكون متزايداً من [ P ، ب ] اذا كانت م′ (س) > صفر لأي س ∈ ] P ، ب [
2. الاقتران م (س) يكون متناقصاً في [ P ، ب ] اذا كانت م′ (س) < صفر لأي س ∈ ] P ، ب [
3. الاقتران م (س) يكون ثابتاً من [ P ، ب ] اذا كانت م′ (س) = صفر لأي س ∈ ] P ، ب [ .

**مثال (2) ص 31** جد فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران م (س) علماً بأن م′ (س) = (س − 1)(س + 2) ، س ∈ ح

**الحل** م′ (س) = (س − 1)(س + 2) = صفر

(س − 1)(س + 1)(س + 2) = صفر

س = 1 ، س = −1 ، س = −2




منحنى م (س) متناقصاً من الفترة ] −∞ ، −2 ] ، [ −1 ، 1 ]

منحنى م (س) متزايداً في الفترة [ −2 ، −1 ] ، [ 1 ، ∞ [

أ. معتصم ريحان
تابعنا على الفيس والبوك
/ أ


ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أ. معتصم ريحان

**مثال ③ صـ62** عين فترات التزايد والتناقص للاقتران م(س) = $س^4 + 4س^3 + 5$

**الحل**

م(س) متصل على ح لأنه كثير حدود.

م'(س) = $4س^3 + 12س^2$ = صفر ⇐ $س^3 = -3$ ⇐ س = −3




يكون منحنى م(س) متزايداً من $[-3, \infty[$ (صغر، كبر)

ومتناقصاً من الفترة $]-\infty, -3]$ (صغر، كبر)

دائماً الفترة حنونة

أ. معتصم ريحان

**مثال ⑥ صـ62** عين فترات التزايد والتناقص للاقتران م(س) = $\frac{س-1}{س+1}$ ، س ≠ −1

**الحل**

الاقتران م(س) متصل على ح − {−1}.

م'(س) = $\frac{1 \times (س+1) - 1 \times (س-1)}{(س+1)^2} = \frac{س+1-س+1}{(س+1)^2} = \frac{2}{(س+1)^2}$

∴ م'(س) ≠ صفر ∀ س ∈ ح − {−1} لأنه البسط 2 ≠ صفر أبداً.




الاقتران م(س) متزايد في الفترتين

$]-\infty, -1[$ ، $]-1, \infty[$ (صغر، كبر)

ولا يمكن أن نقول أن الاقتران م(س) متزايد على ح − {−1}

لأنه نحن نختبر التزايد والتناقص على فترات وليس على نقطة.

مفتوحة لأنه غير معرف عندما س = −1 ∉ للحال

أ. معتصم ريحان

**مثال 5 صـ62** اثبت أن منحنى الاقتران م(س) = $2س + ظاس$ متزايد في الفترة $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

**الحل**

م(س) متصل وقابل للاستقاق في الفترة $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

م'(س) = $(2 + قا^2 س)$ ≠ صفر




منحنى م(س) متزايداً في الفترة $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

لاحظ

$قا^2 س = \frac{1}{جتا^2 س} = \frac{1}{1} \neq 0$

$قا(0) = 1$


أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس واليوتيوب
00972598709519


صـ2



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال (6) ص 63 عين فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران .

م(س) = { جاس ، 0 ≤ س ≤ π/2 ; جتاس + س ، π/2 < س ≤ π } في الفترة [0 ، π]

الحل

م'(س) = { جتاس ، 0 < س < π/2 ; 1 - جاس ، π/2 < س < π }

م'(π/2) غير موجودة لأن الاقتران غير متصل عند س = π/2

م'(س) ≠ صفر ∀ س ∈ ]0 ، π[




يكون منحنى م(س) متزايداً في الفترتين

[0 ، π/2] ، [π/2 ، π]

أ. معتصم رحال

مثال (7) ص 63 عين فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران م(س) = |س² - 4| ، س ∈ [-3 ، 3]

الحل أولاً بغير تعريف المطلقة س² - 4 = 0 ⟸ س = ± 2

∴ م(س) = { 4 - س² ، -2 ≤ س ≤ 2 ; س² - 4 ، -3 ≤ س < -2 ، 2 < س ≤ 3 }

الاقتران م(س) متصل في الفترة [-3 ، 3] لأن اقتران القيمة المطلقة متصل

إذاً م'(س) = { -2س ، -2 < س < 2 ; 2س ، -3 < س < -2 ، 2 < س < 3 }

م'(-2)⁺ ≠ م'(-2)⁻

-2 × -2 ≠ 2 × -2

4 ≠ -4 ∴ م'(-2) غير موجودة

∴ م'(س) = { -2س ، -2 < س < 2 ; 2س ، -3 < س < -2 ، 2 < س < 3 ; غ.م ، س = -2 ، 2 ، -3 }




م'(س) = صفر

2س = 0

س = 0

منحنى م(س) متزايد [-2 ، صفر] ، [2 ، 3]

منحنى م(س) متناقص [-3 ، -2] ، [0 ، 2]

أ. معتصم رحال

تابعنا على الفيس واليوتيوب

صف 3

أ. معتصم رحال

تابعنا على الفيس واليوتيوب

حصص خاصة أونلاين سيتم Zoom



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

## تمارين ومسائل درس (١) الاقترانات المتزايدة والمتناقصة

**س١/** حدد فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران م(س) في كل حالة مما يأتي: أ. مقصم ريحان

**بداية صفحة رقم 30**

**(أ)** م(س) = ٣س − ٤ − س³ ، س ∈ [−٢، ٥]

**الحل** م(س) متصل على [−٢، ٥] وقابل للاشتقاق على ]−٢، ٥[

م′(س) = ٣ − ٣س² = ٠ ⟸ س = ±١ أو س = ٢

م′(س) غ.م عند س = −٢، ٥ لأنهم أطراف فترة.

∴ النقاط الحرجة هي = {−٢، −١، ١، ٢، ٥}




أ. مقصم ريحان

الاقتران م(س) متزايد [−١، ٢]

الاقتران م(س) متناقص [−٢، −١]، [٢، ٥]

**(ب)** م(س) = س + جاس ، س ∈ [٠، ٢π]

**الحل** م(س) متصل على [٠، ٢π] وقابلاً للاشتقاق على ]٠، ٢π[

م′(س) = ١ + جتاس = صفر ⟸ جتاس = −١ ⟸ س = π

∴ س = ١٣٥° ⟸ تحويلها إلى دائري $\frac{135 \times \pi}{180} = \frac{3\pi}{4}$

م′(س) غير موجودة عندما س = ٠، ٢π لأنهم أطراف فترة.

∴ النقاط الحرجة هي $\{0، \frac{3\pi}{4}، 2\pi\}$




الاقتران م(س) متزايد

$[0، \frac{3\pi}{4}]$، $[\frac{3\pi}{4}، 2\pi]$

نقطة حرجة

م′(س) = ٠ | م′(س) = غ.م

أ. مقصم ريحان

تابعني على التيليجرام واليوتيوب

حصص خاصة أونلاين Zoom

00972598709519



camscanner بـ ممسوحة ضوئيا

ج) $م(س) = \frac{س^2}{س^2 - 2س + 1}$ ، $س \in ح$

الحل $ق'(س) = \frac{(س^2 - 2س + 1)(2س) - س^2(2س - 2)}{(س^2 - 2س + 1)^2}$

$ق'(س) = 0 \Leftarrow 2س^2 - 2س = 0 \Leftarrow س = 1$




$م(س)$ متناقص $]-\infty, 1[$ حفر كبير

$م(س)$ متزايد $]1, \infty[$ حفر كبير

أ. معتصم ريحان

---

ص 66 س 2 / اذا كان $ق(س) = س^2 - لو_{ه}(س + 1)$ ، $س > -1$

فأثبت أن منحنى $م(س)$ متزايد في $ح^+$

الحل $م(س)$ متصل لأنه مُعرف ، وما داخل اللوغاريتم موجب

$ق'(س) = 2س - \frac{1}{س + 1}$ حفر $\Leftarrow 2س - \frac{1}{س+1} = 0 \Leftarrow 2س^2 + 2س - 1 = 0$

$س = \frac{-1}{2}$ مرفوض ، $س = \frac{1}{2}$

$ق(0) = 0 - لو_{ه}(1) = 0$

$ق(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - لو_{ه}(\frac{3}{2}) < 0$

$ق(1) = 1 - لو_{ه}(2) > 0$

لمعرفة إشارة الناتج

$ق(س) > 0$ في $ح^+$

$\therefore م(س)$ متزايد في $ح^+$ #

أ. معتصم ريحان

---

تابع تفاضل الفيزياء والبيوتكنولوجي

ص 66 س 3 / جد فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران $م(س) = \begin{cases} س^3 & ، 0 \leq س < 1 \\ س^2 - 2 & ، 1 \leq س \leq 2 \end{cases}$ في الفترة $[0, 2]$

الحل نبحث الاتصال عند $س = 1$

$\therefore م(س)$ غير متصل عند $س = 1$

$\therefore ق(س)$ عند $س = 1$ غير موجودة

وعند أطراف الفترة حفر، 2 أيضاً غ.م.

$ق'(س) = \begin{cases} 3س^2 & ، 0 < س < 1 \\ 2س & ، 1 < س < 2 \\ \text{غ.م} & ، س = 0, 1, 2 \end{cases}$

$ق'(س) = 0$ غير موجودة

نهاية $م(س)$ = نهاية $م(ب)$

$س \to 1^+$ ، $س \to 1^-$

(-1) ، (1)




$\therefore م(س)$ متزايد $[0, 1[ \cup ]1, 2]$

أ. معتصم ريحان

---

أ. معتصم ريحان

تابع تفاضل الفيزياء والبيوتكنولوجي

00972598709519

ص 5



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أ. معتصم ريحان

مثال ٦ ص ٦٥ / اذا كان م(س)، هـ(س) قابلين للاشتقاق على ح وكان ك(س) = م(س) + هـ(س) + س² فجد فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران ك(س) علماً بأن م'(س) = هـ(س)

هـ(س) = -م(س)

الحل ك(س) متصل على ح

ك'(س) = ٢ (م(س)) (م'(س)) + ٢ (هـ(س)) (هـ'(س)) + ٢س

ك'(س) = ٢ م(س) × هـ(س) + ٢ هـ(س) × -م(س) + ٢س

ك'(س) = ٢س = صفر ⟸ س = صفر




∴ م(س) متناقص ]-∞، ٠]

م(س) متزايد [٠، ∞[

أ. معتصم ريحان / تابعني على الفيس واليوتيوب

مثال ٥ ص ٦٥ / اذا كان م(س) كثير حدود متزايداً على ح وكان ك(س) = م(س² - ٤س) فجد فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران ك(س) باستخدام

الحل م(س) كثير حدود متزايداً على ح ⟸ م'(س) > صفر

ك(س) متصل على مجالاته

ك'(س) = م'(س² - ٤س) × (٢س - ٤) = صفر

٢س - ٤ = صفر ∴

س = ٢ ومنها

هذه لا يمكن أن تساوي صفر لأنه قال في السؤال أن م'(س) > صفر




ك(س) متناقص على ]-∞، ٢] صفر كبير

ك(س) متزايد على [٢، ∞[ صفر كبير

أ. معتصم ريحان تابعني على الفيس واليوتيوب

مثال ٤ ص ١٦ / اذا كان م'(س) = (س² - ١)³ (س - ٢)⁴ فإن م يكون متناقصاً على الفترة

أ) ]-∞، ١[ ب) [-١، ١] ج) [١، ٢] د) [٢، ∞[

أ. معتصم ريحان

حصص خاصة أونلاين Zoom



CamScanner بـ صوتيا

س 6 ص 66 / إذا كان م(س)، هـ(س) كثيرا حدود معرفين في الفترة [0، ٤٠] بحيث أن منحنى م(س) متناقص في مجاله ويقع في الربع الرابع ومنحنى هـ(س) متزايد في مجاله ويقع في الربع الأول أثبت أن منحنى الاقتران م(س) × هـ(س) متناقص في الفترة [0، ٤٠] .

| م(س) + | م(س) + |
|---|---|
| الربع الأول | الربع الثاني |
| م(س) − | م(س) − |
| الربع الرابع | الربع الثالث |

الحل / م(س) متناقص في مجاله ⇐ م'(س) < 0 (سالب)

م(س) يقع في الربع الرابع ⇐ م(س) > 0 (سالب)

هـ(س) متزايد في مجاله ⇐ هـ'(س) > 0 موجب

هـ(س) يقع في الربع الأول ⇐ هـ(س) > 0 موجب

ولتكن ك(س) = م(س) × هـ(س)

المطلوب أثبت أن ك(س) متناقص «سالب» في الفترة [0، ٤٠]

ك(س) = م(س) × هـ'(س) + هـ(س) × م'(س)

(م. الأول × الثاني) + (الثاني × م. الأول)

= سالب × موجب + موجب × سالب

سالب + سالب

= سالب ∴ ك'(س) سالب ∴ ك(س) متناقص

أ. معتصم ريحان

س 7 ص 66 / إذا كانت م(س) = جاس + جتاس ، س ∈ [0، π/2] فجد مجالات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران م(س)

لاحظ هنا اختلف الأمر اعطانا المشتقة الأولى لذلك سنحتاج إلى المشتقة الثانية.

الحل م(س) متصل على مجاله

م'(س) = جتاس − جاس

م''(س) = − جاس − جتاس = صفر

منها نحذف الإشارة فوق حظ الأعداد

− جاس / جتاس = جتاس / جتاس

أ. معتصم ريحان

− ظاس = 1

ظاس = −1

shift → tan → 1 −

∴ س = − هـ هذه زاوية في الربع الرابع لأنها سالبة.

− 45° + 180° = 135°

135 × π/180 = 3π/4 ∉ [0، π/2]




هـ مثلا نفوض فيها لنعرف الإشارة

ونفوض في م''(س)

∴ الاقتران م'(س) متناقص في [صفر، π/2]

أ. معتصم ريحان

ص 7



CamScanner بـ صوتيا حه

# ⊛ حل أسئلة امتحانات سابقة ⊛

2019 ش / ما مجموعة قيم الثابت م التي تجعل الاقتران ق(س) = (م² - ٦)س + ٧ متزايداً على ح .

أ) م > ٢ ب) م = ٢ ج) م < ٢ د) م = -٢

الحل ق(س) = ٢م - ٦ = ق ز ⇐ ٢م = ٦ ⇐ م = ٢




أ. معتصم ريحاني

2019 ش / اذا كان ق(س) اقتراناً كثير حدود من الدرجة الرابعة فما أكبر عدد ممكن من النقاط الحرجة للاقتران ق(س)

أ) ٢ ب) ٣ ج) ٤ د) ٥

الحل إذا ق(س) كثير حدود من الدرجة الرابعة فبعد ما نشتقه يصبح من الدرجة الثالثة والمعادلة من الدرجة الثالثة لها على الأكثر ثلاث حلول.

أ. معتصم ريحاني

2012 ش / اذا كان ق(س)، هـ(س) معرفان على ح وكان ق(س) متزايداً على ح

ق(س) ≠ صفر بحيث أن ق(س) × هـ(س) = ٧ فإن احدى العبارات الآتية صحيحة دائماً

أ) هـ(س) متناقص على ح ب) هـ(س) متزايد على ح

ج) هـ(س) ثابت على ح د) ق(س) < هـ(س) على ح .

الحل هـ(س) = ٧ / ق(س)

∴ هـ(س) ز.

∴ هـ(س) متناقص على ح

⇐ هـ(س) = -٧ ق(س) / (ق(س))² = -٧ × (+) / + = (-) / (+) = (-)

مقلوب من الدوال

2019 ش دورتان / اذا كان ق(س) = لو جاس ، س ∈ [π/٤ ، π] ما الفترة التي يكون فيها ق(س) متزايداً .

أ. معتصم ريحاني

أ) [π/٢ ، π/٤] ب) [π/٣ ، π/٢] ج) [π/٢ ، π/٣] د) [π/٤ ، π]

الحل ق(س) = جتاس / جاس = ٠ ⇐ جتاس = ٠ ∴ س = ٩٠ ⇐ س = ٢٧٠

π/٢ ∈ [π/٤ ، π] ⇐ ٣π/٢ ∉ [π/٤ ، π]




∴ ق(س) متزايد في [π/٤ ، π/٢]

ق ز / جتا٦٠ / جا٦٠ = ١/٢ / √٣/٢ = ١/√٣

جتا١٥٠ / جا١٥٠ = -√٣/٢ / ١/٢ = (-)



CamScanner

حصة رقم 31
توجيهي علمي 2022
أ. معتصم ريحان

# حل أسئلة امتحانات سابقة على درس الاقترانات المتزايدة والمتناقصة

دور ثاني 2019 / إذا كان $م(س) = 2س^3 + س^2$ فما مجموع قيم س التي يكون عندها للاقتران $م(س)$ نقط حرجة

أ) -1 ب) $-\frac{1}{2}$ ج) $-\frac{1}{4}$ د) $-\frac{1}{12}$ هـ) $-\frac{1}{10}$

الحل $م'(س) = \frac{4 + 2س}{2\sqrt{4س + س^2}} = صفر$

$4 + 2س = صفر$

$2س = -4$

$س = -2$ مرفوضة لأنها $\notin$ لمجال $م(س)$

لكنه $س = -2$ $\notin$ لمجال $م(س)$

$\therefore$ قيم س التي يكون عندها نقط حرجة للاقتران هي $-\frac{1}{10}$ فقط #

أ. معتصم ريحان

ملاحظة: تكون المشتقة غير موجودة للاقتران $م(س)$ عندما يكون المقام $= صفر$

$\therefore \sqrt{4س + س^2} = صفر$

$4س + س^2 = صفر$

$س(4 + س) = 0$

$س = 0$ أو $س = -4$ مقبولان لأنهم $\in$ لمجال $م(س)$

نقاط حرجة: $م'(س) = 0$ أو $م'(س)$ غير موجودة

---

دور ثاني 2022 / إذا كان $م(س) = س^2 - 32 لو س$ ، فما عدد القيم الحرجة للاقتران $م(س)$ على مجاله .

أ) صفر ب) 1 ج) 2 د) 3

الحل $م'(س) = 2س - 32 \times \frac{1}{س} = صفر$

$2س - \frac{32}{س} = صفر$

$\frac{2س^2 - 32}{س} = 0$

$2س^2 - 32 = 0$

$2س^2 = 32$

$س^2 = 16$

$س = \pm 4$

$س = 4$ مقبولة

$س = -4$ مرفوضة $\notin$ لمجال $م(س)$

$\therefore$ عدد النقاط الحرجة واحدة فقط

أ. معتصم ريحان

تابعنا اليوتيوب والفيس

ملاحظة: قيم س التي تجعل $م'(س)$ غير موجودة هي عندما يكون المقام $= صفر$ $\therefore$ عندما $س = 0$ لكنه الصفر $\notin$ لمجال $م(س)$

نقاط حرجة: $م'(س) = 0$ أو $م'(س)$ غير موجودة



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال 2025 / اذا كانه م(س) = $\frac{س}{س+1}$ ، س ≠ -1 فما العبارة الخطأ الصحيحة مما يأتي :-

أ) م(س) متزايد على ح

ب) م(س) متزايد على ]-∞، -1[ وعلى ]-1، ∞[

ج) م(س) متناقص على ح

د) م(س) متناقص على ]-∞، -1[ وعلى ]-1، ∞[

$م'(س) = \frac{(1)(س+1) - س(1)}{(س+1)^2} = \frac{1}{(س+1)^2} = 0$ ⟸ س + 1 = 0 أبداً .

∴ م'(س) لا يمكن أن تساوي صفر

⊗ م'(س) سيكون غير معرف عندما المقام يساوي صفر

$(س+1)^2 = 0$ ⟸ س + 1 = 0 ⟸ س = -1 نقطة حرجة لكنها لا تنتمي لمجال م(س) .




∴ م'(س) متزايد ]-∞، -1[ ∪ ]-1، ∞[

لاحظ الفترة مفتوحة عند -1 لأنها لا تنتمي لمجال م(س)

أ. معتصم رحال
تابعني على الفيس واليوتيوب

مثال دورتان 2025 / اذا كانه م(س) = س $ه^{س}$ فما مجموع / ناتج الحرجة لمنحنى م'(س)

أ) -2 ب) -1 ج) 0 ، -1 د) 0 ، -2

الحل

م'(س) = س × $ه^{س}$ + $ه^{س}$ × (1) ⟵ طبقنا قاعدة الضرب

م''(س) = س × $ه^{س}$ + $ه^{س}$ × (1) + $ه^{س}$

م''(س) = س × $ه^{س}$ + 2 $ه^{س}$ = صفر

$ه^{س}$ (س + 2) = 0

$ه^{س} \neq 0$ أبداً ∴ س + 2 = 0

س = -2 نقطة حرجة ∈ لمجال م'(س)

لاحظ عند المشتقة الثانية ومساويها بصفر وجدنا نقطة حرجة

أ. معتصم رحال
حصص خاصة أونلاين
مجموعة زووم
00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2016 الشكل المجاور يمثل اقترانات، المتحنى الذي يكون متناقص على [ب، جـ]




* ملاحظات من مثل هذه الأسئلة

① اذا كانت النقطة من الأعلى نأخذ الذي فوقها.
② اذا كانت النقطة من الأسفل نأخذ الذي تحتها.

أ. معتصم ريحان
تابعنا على الفيس
واليوتيوب

2019 الشتوي دور ثاني / اذا كان م(س) = لو جاس ، س ∈ [π/4 ، π] ما الفترة التي يكون فيها م(س) متزايداً

أ) [π/4 ، π/2] ب) [π/4 ، π] ج) [π/2 ، π] د) [π/2 ، 3π/4]

الحل م'(س) = جتاس / جاس = ظتاس = صفر




ظتاس يكون موجب من الربع الأول والثالث




∴ الفترة هي [π/4 ، π/2]

2019 الشتوي دور ثاني / اذا كان م(س) = ٢س٤ + س٣ فما مجموع قيم س التي يكون عندها للاقتران م(س) نقطة حرجة

تمارين

أ) -١ ب) ٠ ، -٤ ج) -٢ ، -٤ د) ٠ ، -٢ ، -٤

الحل نجد المجال أولاً ٤س + س٣ ≥ صفر

٤س + س٣ = صفر

س(٤ + س) = ٠

س = ٠ أو س = -٤




∴ مجال م(س) هو ]-∞، -٤] ، [صفر، ∞[ أو يمكن نقول ح - ]-٤، صفر[

الآن نشتق م'(س) = ٤ + ٢س / ٢√(٤س + س٣) = ٠ ⇐ ٤ + ٢س = ٠ ⇐ س = -٢ مرفوض لانتمائه للمجال

الآن نساوي المقام بصفر ٢√(٤س + س٣) = ٠ ⇐ ٤س + س٣ = ٠

⇐ س = ٠ | س = -٤

(3)



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2019 فريبي نابلس / اذا كان م(س) = { [½ س] س ، ٣ ≤ س < ٤ ; ب س + ٤ ، ٤ ≤ س ≤ ٥ } قابل للاشتقاق على ]٣، ٥[ فإن قيم كل من ب، ب على التوالي هي

أ) ١، صفر  ب) ١، ٢  ج) صفر، ٢  د) صفر، ١٦

الحل / أ. معتصم ريحان

أولاً نفيد تعريف الصحيح

∴ م(س) = { ١ × س ، ٣ ≤ س < ٤ ; ب س + ٤ ، ٤ ≤ س ≤ ٥ }

طول الدرجة = ٢




[½ س] = { ١ ، ٢ ≤ س < ٤ }

(الفترة المطلوبة ٣ ≤ س < ٤ جزء من المجموعة)

(*) من الاتصال عند س = ٤ نستنتج أن

٤ = ب × ٤ + أ(٤)^٢

٤ = ١٦ أ + ٤ ب

(١) ١ = ٤ أ + ب

م(س) = { ١ ، ٣ < س < ٤ ; ٢ أ س + ب ، ٤ < س < ٥ }

(*) من الاشتقاق عند س = ٤ نستنتج أن

١ = ٢ × أ × ٤ + ب

(٢) ١ = ٨ أ + ب

الآن نحل معادلة ① مع ② بالحذف

١ = ٤ أ + ب
١ = ٨ أ + ب
(اطرح)

صفر = -٤ أ

أ = صفر ∴ ب = ١

أ. معتصم ريحان تابعين معلم الفيزياء واليوستوب

2018 / الشكل المجاور يمثل منحنى م(س) على ]١، ٤[ متى يكون الاقتران متزايداً.

أ) ]١، ٤]  ب) ]١، ٤[  ج) [١، ٤[  د) [١، ٤] ✓




* ملاحظة مهمة جداً لحل مثل هذه الأسئلة:

(*) اذا كانت النقطة من الأعلى نأخذ الذي فوقها.

(*) واذا كانت النقطة من الأسفل نأخذ الذي أسفلها.

أ. معتصم ريحان

00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تجريبي تكميلي 2019

اذا كان $م(س) = [س] - [س - ٢]$ ، $س \in [-١، ١[$ فإن مجموعة أعداد قيم $س$ التي يكون عندها نقاط حرجة هي:

أ) $[-١، ١[$ ب) $[-١، ١]$ ج) $]-١، ١[$ د) $٢$

الحل $م(س) = [س] - [س] + ٢$

$م(س) = ٢$ ← هذا اقتران ثابت والاقتران الثابت كل نقاط حرجة فما فترة

∴ النقط الحرجة هي كل الفترة المعطاه وهي $[-١، ١[$

لاحظ
$[س - ٢] = -[س]$
$([س] - ٢) = -$
$-[س] + ٢$

خاصية لاقتران الصحيح

$[س + ص] = [س] + ص$ بشرط $ص \in ص$

خاصية

أ. معتصم ريحان
00972598709519
تابعنا على الفيس واليوتيوب

تجريبي 2019

اذا كانت $قـ(س) = (س^٢ - ١)^٣ (س - ٢)^٤$ وكان $م(س)$ اقتران متصل على $[٠، ٣[$ فما عدد النقاط الحرجة للاقتران $م(س)$

أ) ٣ ب) ٢ ج) ٤ د) ٥

$قـ(س) = ٠ \Leftarrow (س^٢ - ١)^٣ (س - ٢)^٤ = ٠$

إما $(س^٢ - ١)^٣ = ٠$ أو $(س - ٢)^٤ = ٠$

$س^٢ - ١ = ٠$ أو $س - ٢ = ٠$

$س^٢ = ١$ ← $س = ٢$

$س = \pm ١$

$س = ١ \in [٠، ٣[$

$س = -١ \notin [٠، ٣[$ مرفوضة

النقاط الحرجة هي $\{٠، ١، ٢\}$ عددهم ثلاثة

النقاط الحرجة
كل
$قـ(س) = ٠$ أو $قـ(س)$ غير موجودة

أ. معتصم ريحان
تابعنا على الفيس واليوتيوب

أ. معتصم ريحان

* أطراف الفترة نقاط حرجة لكنه لاحظ الفترة مفتوحة عند $س = ٣$

إذا $س = ٢$ لسيرلي $[٠، ٣[$ نقطة حرجة



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2015 ثانوي / اذا كان $م(س) = جتاس - ب(س) + ٣س$ ، $س \in [٠، \frac{\pi}{٢}]$
أثبت أنّ للاقتران $(م+ب)(س)$ متزايد في تلك الفترة.

أ. معتصم ريحان

الحل
$م(س) = جتاس - ب(س) + ٣س$
$م(س) + ب(س) = جتاس + ٣س$
$(م+ب)(س) = -جاس + ٣ = صفر \Leftarrow$ جاس = ٣ لا يمكن ولا يوجد قيم لسينه لأن

لاحظ
$-١ \leq جاس \leq ١$
$-١ \leq جتاس \leq ١$

سلوك $(م+ب)$ س
إشارة $(م+ب)$ س
صفر ، $\frac{\pi}{٢}$

نأخذ مثلاً $\frac{\pi}{٤}$ ونعوض في المشتقة نجد التالي

$-جا\frac{\pi}{٤} + ٣ = -\frac{١}{\sqrt{٢}} + ٣ = ٢$ موجب (+)

$\therefore (م+ب)(س)$ متزايد في الفترة $[٠، \frac{\pi}{٢}]$

أ. معتصم ريحان

---

2012 ثانوي / اذا كان $م(س) = جاس + جتاس$ ، $س \in [٠، \frac{\pi}{٤}]$ أثبت أنّ $م(س)$ متزايداً على مجاله، ومن ذلك أثبت أنّ جاس + جتاس $\geq ١$ في تلك الفترة.

الحل $م'(س) = جتاس - جاس = صفر \Leftarrow \frac{جتاس}{جتاس} = \frac{جاس}{جتاس}$

$\Leftarrow$ ظاس = ١

$س = ٤٥ \Leftarrow \frac{\pi}{٤} \notin ]٠، \frac{\pi}{٤}[$

$س = ٢٢٥ \Leftarrow$ لا تنتمي للفترة $[٠، \frac{\pi}{٤}]$

سلوك $م'(س)$
إشارة $م'(س)$
صفر ، $\frac{\pi}{٤}$

نأخذ مثلاً زاوية $(٣٠°)$ ونعوض في المشتقة

$جتا٣٠ - جا٣٠$

$\frac{\sqrt{٣}}{٢} - \frac{١}{٢} =$ موجب (+)

$\therefore م'(س) > صفر$

$\therefore م(س)$ متزايد $[٠، \frac{\pi}{٤}]$

أ. معتصم ريحان

بما أن ما الفيزياء واليوتيوب مخصص أونه لا يتيح خاصية ميزة الظل موجب في الأول والثالث

$٢٢٥ = ١٨٠ + ٤٥$

$٢٢٥ \notin [٠، \frac{\pi}{٤}]$

أ. معتصم ريحان صح


CamScanner بـ صوتيا

س 2020 إذا كانت $\theta(س) = ٢س - س^{٢}$ ، $\alpha(س)$ كثير حدود متزايد على ح ؟

أثبت أن الاقتران $ل(س) = \alpha(س) + \theta(س) \times \alpha(س)$ متزايد $\forall س \in [٠,٣]$

الحل

$ل'(س) = \alpha'(س) + \theta'(س) \times \alpha'(س) + \theta(س) \times \alpha'(س)$

$ل'(س) = \alpha'(س) + \theta(س) \times \alpha'(س) + (\theta(س))^{٢} \alpha'(س)$

$\Leftarrow$ معطى أن $\alpha(س)$ متزايد $\therefore$ ومنها $\Leftarrow \alpha'(س) > ٠$

$\Leftarrow$ الآن نريد أن نعرف إشارة $\theta(س)$ وإشارة $\theta'(س)$

$\Leftarrow$ نجد أصفار الاقتران $\theta(س)$ ثم نبحث عن إشارته.

$\Leftarrow ٢س - س^{٢} = ٠$

$\Leftarrow س(٢ - س) = ٠ \Leftarrow س = ٠$ أو $س = ٢$

$\Leftarrow$ 


$\Leftarrow$ هنا تقع الفترة المطلوبة عندما وهي $[٣,٠]$ $\therefore$ إشارة $\theta(س)$ سالبة

$\Leftarrow$ الآن نجد $\theta'(س) = ٢ - ٢س$

$\Leftarrow$ ثم نجد $\theta'(٠) = ٢ \Leftarrow$ $\therefore$ الاقتران $\theta'(س)$ إشارته موجبة

$\Leftarrow$ الآن نرجع ونعوض في الاقتران $ل'(س)$ لإثبات أنه متزايد على $[٣,٠]$

$\Leftarrow ل'(س) = \alpha'(س) + \theta(س) \times \theta'(س) + (\theta(س))^{٢} \alpha'(س)$

هنا ترتيب إذا أداة الإشارة ستكون موجبة

$\Leftarrow ل'(س) = (+) + (-) \times (-) + (+)$

$\Leftarrow ل'(س) = (+) + (+) + (+)$

$\Leftarrow ل'(س) = (+) > ٠$

$\therefore$ الاقتران $ل(س)$ متزايد لأن $ل'(س) > ٠$ #

أ. معتصم ريحان

تابعنا على الفيس واليوتيوب

صفحة أون لاين خاصة مميزة



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال / اذا كان متوسط التغير للاقتران م(س) = $أ س^{٣} + ب س$ في الفترة [١، ٣] يساوي ٢٢ وكان لمنحنى الاقتران م(س) مماس أفقي عندما س = ٢ أوجد قيمتي كل من أ، ب .

الحل / متوسط التغير = $\frac{م(س_٢) - م(س_١)}{س_٢ - س_١}$

$\frac{م(٣) - م(١)}{٣ - ١} = ٢٢$

$(أ(٣)^{٣} + ب(٣)) - (أ(١)^{٣} + ب(١)) = ٤٤$

$٢٧أ + ٣ب - أ - ب = ٤٤$

$٢٦أ + ٢ب = ٤٤$

$١٣أ + ب = ٢٢$ ... ①

م'(س) = $٣أ س^{٢} + ب$

م'(٢) = $٣أ(٢)^{٢} + ب = ٠$

$١٢أ + ب = ٠$ ... ②

بطرح ① من ②

$-٩أ = -٢٢$

$أ = ٢٢$ ومنها $ب = -٢٦٤$

أ. معتصم ريحان
00972598709519

مثال / عين فترات التزايد والتناقص للاقتران م(س) = $|س^{٢} - ٤|$

الحل $م(س) = |س^{٢} - ٤| = \begin{cases} س^{٢} - ٤ & ، س \geq ٢ \\ ٤ - س^{٢} & ، -٢ < س < ٢ \\ س^{٢} - ٤ & ، س \leq -٢ \end{cases}$

$م'(س) = \begin{cases} ٢س & ، س > ٢ \\ -٢س & ، -٢ < س < ٢ \\ ٢س & ، س < -٢ \\ غ.م & ، س = ٢، -٢ \end{cases}$

$٢س = ٠ \Rightarrow س = ٠$

$-٢س = ٠ \Rightarrow س = ٠$




① م(س) متصل على ح .

② م(س) قابل للاشتقاق على ح - {-٢، ٢}

③ بوضع م'(س) = صفر

| الفترة | | الفترة | | الفترة | |
|---|---|---|---|---|---|
| س > ٢ | | -٢ < س < ٢ | | س < -٢ | |
| ٢س = ٠ | | -٢س = ٠ | | ٢س = ٠ | |
| س = ٠ | | س = ٠ | | س = ٠ | |
| لا ينتمي للفترة | X | ينتمي للفترة | ✓ | لا ينتمي للفترة | X |

م(س) متزايد في الفترة $]-٢، ٠] \cup [٢، \infty[$

م(س) متناقص في الفترة $]-\infty، -٢] \cup [٠، ٢]$

أ. معتصم ريحان
00972598709519


هذا الملف خاص لأون لاين





ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

**نظرية** / اذا كانت م(س) متصلاً على [P، ب] وقابلاً للاشتقاق على ]P، ب[ وكانت جميع المماسات لمنحنى م(س) تصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، فإن العبارة الصحيحة من الآتي هي :

(أ) م(س) متناقص في [P، ب].  (ب) م(س) متزايد في [P، ب].  (ج) مَ(س) متناقص في [P، ب].  (د) مَ(س) متزايد في [P، ب].

ملاحظة اخترنا فرع (ب) وليس (د) لأنه إذا أردنا وصف سلوك م(س) فإننا نستخدم اختبار المشتقة الأولى

أما لو أردنا وصف سلوك مَ(س) فإننا نستخدم مَّ(س).

وهكذا

أ. معتصم ريحان

---

**خاصية** / م(س)، هـ(س) كثيرا حدود معرفان على [١، ٦] ويقع منحنى كل منهما في الربع الأول فإذا كان م(س) متزايداً في مجاله هـ(س) متناقصاً في مجاله هـ(س) ≠ صفر

أثبت أن م/هـ (س) متزايد أ في [١، ٦].

م(س) يقع في الربع الأول ⇐ م(س) > صفر ، م(س) متزايد ⇐ مَ(س) > صفر

هـ(س) يقع في الربع الأول ⇐ هـ(س) > صفر ، هـ(س) متناقص ⇐ هَ(س) < صفر

نفرض أن الاقتران ك(س) = م(س) / هـ(س) ، هـ(س) ≠ صفر ، س ∈ [١، ٦]

① ك(س) متصل لأنه حاصل قسمة كثيري حدود.

② ك(س) قابل للاشتقاق.

$$كَ(س) = \frac{هـ(س) \times مَ(س) - م(س) \times هَ(س)}{(هـ(س))^2} = \frac{(+) \times (+) - (+) \times (-)}{(+)} = \frac{(+) - (-)}{(+)}$$

$$= (+) \longrightarrow \therefore كَ(س) > صفر$$

وعليه ⇐ ك(س) متزايد على [١، ٦].

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس واليوتيوب.

---

**امتحاني** / اذا كانت م، هـ اقترانين كثيري حدود متزايدان على ح وكان م(س) > صفر ، ∀ س ∈ ح

اثبت أن الاقتران (م ○ هـ)(س)]² متناقصاً على ح.

تذكر أن (م ○ هـ)(س) = م(هـ(س))

الحل نعلم أن م، هـ اقترانان متزايدان على ح

اذاً مَ(س) > ٠ ، هَ(س) > ٠

نفرض أن ك(س) = [(م ○ هـ)(س)]² ⇐ ك(س) متصل وقابل للاشتقاق لأنه حاصل تركيب اقترانين متصلين كثيري حدود.

ومنه كَ(س) = ٢ [(م ○ هـ)(س)] × مَ(هـ(س)) × هَ(س)

كَ(س) = ٢ × م(هـ(س)) × مَ(هـ(س)) × هَ(س)

كَ(س) = ٢ × (−) × (+) × (+) = (−)

∴ كَ(س) < صفر

∴ ك(س) = [(م ○ هـ)(س)]² متناقص على ح ∎



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خارجي / اذا كانه م(س) = $\frac{س}{1+س^2}$ معرفاً على [-1، 1] جد مجالات التزايد والتناقص للاقتران م .

الحل (*) م(س) متصل على ح لانه قسمة اقترانين متصلين كثيرة حدود .

$م'(س) = \frac{(1+س^2)\times 1 - س \times (2س)}{(1+س^2)^2} = \frac{1-س^2}{(1+س^2)^2}$ ]-1، 1[

(*) م(س) قابل للاشتقاق على ح - {±1} لانها نقاط طرفية .

(*) نضع م'(س) = صفر ⇐ $\frac{1-س^2}{(1+س^2)^2} = 0$ ⇐ 1 - س² = 0 ⇐ س = ±1

فقط اشارة م'(س) في الشكل المجاور فيمكن م(س) متزايد في الفترة [-1، 1]




أ. معتصم ريحان تابعني على الفيس واليوتيوب.

خارجي / اذا كانه م(س) = |س - 1| (س + 2) أوجد مجالات التزايد والتناقص للاقتران م(س)

الحل |س - 1| = { 1 - س ، س ≤ 1 ; س - 1 ، س > 1 }

س - 1 = 0 ⇐ س = 1




∴ م(س) = { (1 - س)(س + 2) ، س ≤ 1 ; (س - 1)(س + 2) ، س > 1 }

الآن نضع م'(س) = 0

عندما س ≤ 1 : 1 + 2س = 0 ⇐ $س = -\frac{1}{2}$ ∈ س ≤ 1

عندما س > 1 : 2س - 1 = 0 ⇐ $س = \frac{1}{2}$ ∉ س > 1

⇐ م(س) = { -س² + س + 2 ، س ≤ 1 ; س² - س + 2 ، س > 1 }

م(س) متصل على ح وتصل عند س = 1 أيضاً

⇐ م'(س) = { 2س + 1 ، س < 1 ; -2س - 1 ، س > 1 ; غ.م ، س = 1 }

م(س) قابل للاشتقاق عند ح - {1} لأنه م'(1⁺) ≠ م'(1⁻)




م(س) متزايد ]-∞، -1/2] ∪ [1، ∞[

م(س) متناقص [-1/2، 1]

أ. معتصم ريحان

حصص أونه لاسيء خاصة نزوم تابعني على الفيس واليوتيوب

ص 10



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

السلام عليكم ورحمة الله

هذا التلخيص المميز جداً هدية جارية مني وعن أهلي وأموالي
وجميع موتى المسلمين .

* هذا التلخيص موجود بالكامل فيديوهات مصورة وهي عبارة
عبارة حصص خاصة مميزة على الزووم ، اذا أردت التسجيلات كاملة
رسالني على الواتس 00972598 709519 أ. معتصم ريحان

* فيديوهات هذا التلخيص بنفس ترتيب التلخيص وهذا
هو الشيء المميز جداً والذي لا يوجد في فلسطين مثله .
بفضل الله .

* بعض هذه الفيديوهات موجودة بشكل عام للكل على قناتي
على اليوتيوب باسم (( معتصم ريحان رياضيات توجيهي ))
وباقي الفيديوهات موجودة بروابط خاصة لمن يطلبها واتس .

* اعتمدت بشكل كامل في هذا التلخيص وبإذن الله ستحصل على
العلامة الكاملة .

* لا تنسى أن تتابع صفحتي الرسمية على الفيس بوك وقناتي
على اليوتيوب وكلاهما باسم (( معتصم ريحان رياضيات توجيهي ))

* بشرى سارة لكل طلاب فلسطين هذا التلخيص شامل ومجاني
بالكامل لكل طلاب فلسطين وبإمكانك ارساله لمن تحب
لكنه فيديوهات هذا التلخيص غير مجانية واذا أردت الحصول
عليها رسالني واتس .

أ. معتصم سلامة ريحان
00972598 709519

تابعني على مجموعات الواتس والتليجرام ضروري .


ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مصطفى رقم 32

توجيهي علمي 2022

أ. معتصم ريحان

# الدرس الثالث ((القيم القصوى))

(*) تعريف القيم القصوى والقيم المحلية:

ليكن م دالة اقتران معرفة على المجال ع، ولتكن جـ ∈ ع عندما يكون الاقتران م(س)

(1) قيمة عظمى محلية عند س = جـ هي م(جـ) إذا وجدت فترة مفتوحة (ف) تحتوي جـ بحيث أن م(جـ) ≥ م(س) لجميع قيم س ∈ (ف ∩ ع)

(2) قيمة صغرى محلية عند س = جـ هي م(جـ) إذا وجدت فترة مفتوحة (ف) تحتوي جـ بحيث أن م(جـ) ≤ م(س) لجميع قيم س ∈ (ف ∩ ع)

(3) قيمة عظمى مطلقة عند س = جـ هي م(جـ) اذا كانت م(جـ) ≥ م(س) لجميع قيم س ∈ ع.

(4) قيمة صغرى مطلقة عند س = جـ هي م(جـ) إذا كانت م(جـ) ≤ م(س) لجميع قيم س ∈ ع.

(*) ملاحظة: تسمى كل من القيم العظمى والقيم الصغرى قيماً قصوى سواء أكانت محلية أم مطلقة.




أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس واليوتيوب
00972598709519

(*) كل قيمة قصوى مطلقة هي قصوى محلية وليس بالضرورة العكس.

(*) اذا كانت للاقتران المتصل قيمة قصوى محلية وحيدة ⟸ اذاً هي مطلقة

س/ كيفية حساب القيم القصوى المحلية ؟؟

(1) أن تكون نقطة حرجة بمعنى م'(س) = صفر أو غير موجودة وأن تكون ضمن مجال الاقتران.

(2) أن يتغير عند ها سلوك الاقتران من تزايد إلى تناقص أو العكس.






Camscanner

(*) بالنسبة لأطراف الفترة: يكون




- حفرى محلية بداية تزايد.
- حفرى محلية نهاية تناقص
- عظمى محلية بداية تناقص
- عظمى محلية نهاية تزايد

أ. معتصم ريحان

(*) ملاحظة: أطراف الفترة المغلقة يجوز أن تكون نقاط حرجة وبالتالي قيم قصوى.

(*) اختبار أطراف الفترة:

اذا كان م(س) اقتراناً متصلاً من [أ، ب] وقابلاً للاشتقاق من ]أ، ب[ فإن:

1. م(أ) قيمة حفرى محلية اذا كانت م'(س) < 0 عندما س > أ بداية تزايد.
2. م(أ) " عظمى " " " م'(س) > 0 " س > أ بداية تناقص.
3. م(ب) " عظمى " " " م'(س) > 0 " س < ب نهاية تزايد.
4. م(ب) " حفرى " " " م'(س) < 0 " س < ب نهاية تناقص.

أ. معتصم ريحان

مثال ① حل كامل

يمثل الشكل المجاور منحنى الاقتران م(س) في الفترة [-٢، ٢] اعتمد عليه في ايجاد القيم القصوى المحلية والمطلقة (إن وجدت) ثم جد قيمة المشتقة الأولى عند كل قيمة منها (إن وجدت).




الحل: للاقتران م(س) قيمة حفرى محلية عندما س = -٢
وهما م(-٢) لأنه يوجد فترة مفتوحة مثل
ف = ]-٣، -١[ تحتوي العدد -٢ بحيث أن
م(-٢) ≤ م(س) ∀ س ∈ ف ∩ [-٢، ٢] = ]-٢، -١[
م'(-٢) غير موجودة لأنها طرف فترة

م(-١) قيمة عظمى محلية وهي مطلقة لأنها وحيدة على الفترة [-٢، ٢]
م'(-١) = صفر لأنه المماس عندها أفقي ولأن م'(-١)⁺ = م'(-١)⁻
∴ م(٢) قيمة حفرى محلية وهي مطلقة، م'(٢) غير موجودة لأنها طرف فترة.

أ. معتصم ريحان تابعني على الفيس واليوتيوب
حصص أونلاين خاصة ومميزة
00972598709519

مثال ② ص 66 / اذا كان م(س) = ٤ ، س ∈ [٠ ، ٣[ جد القيم القصوى المحلية للاقتران م(س)




الحل / م(س) متصل في [٠ ، ٣[

مَ(س) = صفر ∀ س ∈ ]٠ ، ٣[

وحسب التعريف ∀ س ∈ [٠ ، ٣[

يوجد قيمة صغرى محلية هي ٤ لأن م(س) ≥ ٤ ∀ س في تلك الفترة

كما أنه حسب التعريف ∀ س ∈ [٠ ، ٣[ يوجد قيمة عظمى محلية هي ٤ لأن م(س) ≤ ٤ ∀ س في تلك الفترة.

أ. معتصم ريحان

مثال ② ص 67 / الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران ق(س) في الفترة [-٢ ، ٢]

① يوجد قيمة عظمى محلية عندما س = -٢ وهي مطلقة .

② عندما س = صفر يوجد قيمة صغرى محلية وهي مطلقة .

③ قَ(٢) = غير موجودة طرف فترة ، قَ(٠) = صفر ، قَ(-٢) غير موجودة طرف فترة

(*) تعريف / تُسمى النقطة (P ، م(P)) نقطة حرجة للاقتران م(س) إذا كانت

① P ∈ مجال م(س) .

② مَ(P) = صفر أو مَ(P) غير موجودة .

أ. معتصم ريحان
تابعنا على الفيس واليوتيوب

مثال ③ ص 67 / عين جميع النقط الحرجة للاقتران

م(س) = { س² - ٣ ، -١ < س ≤ ٢ ; ٣ - س ، ٢ < س ≤ ٣ } من ]-١ ، ٣]

الحل / م(س) متصل عندما س = ٢

مَ(س) = { ٢س ، -١ < س < ٢ ; -١ ، ٢ < س < ٣ }

مَ(٢) غير موجودة لأن مَ(٢)⁺ ≠ مَ(٢)⁻

مَ(٣) غير موجودة لأنها طرف فترة.

الآن نجعل مَ(س) = صفر وهذا يحقق [س = صفر] ∈ ]-١ ، ٣[

لا يوجد قيم لـ س ∈ ]٢ ، ٣[ جميعها مَ(س) = صفر لأن -١ ≠ صفر

ولا يوجد نقطة حرجة عندما س = -١ لأنها لا تنتمي إلى مجال م(س)

∴ النقط الحرجة هي (٠ ، -٣) (١ ، ٢) (٣ ، ٠)

أ. معتصم ريحان
مرشد أردني لاعبة خامسة مميزة
00972598709519

ص 3



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال (٩) ص 67 / عين جميع النقط الحرجة للاقتران م(س) = { س³ ، ١ ≤ س ≤ ٢ ؛ [س+٣] ، ٢ < س ≤ ٣ } ، ف = [١، ٣]

الحل أولاً نعيد تعريف اقتران الصحيح

طول الدرجة = ١ ، س + ٣ = ٠ ، س = -٣

[س+٣] = { ٤ ، ١ ≤ س < ٢ ؛ ٥ ، ٢ ≤ س < ٣ ؛ ٦ ، س = ٣ }

هذه الفترة التي نريدها من فك الصحيح.

∴ م(س) = { س³ ، ١ ≤ س ≤ ٢ ؛ ٥ ، ٢ < س < ٣ ؛ ٦ ، س = ٣ }


أ. معتصم رحمان
تابعنا على الفيس والتويتر
00972598709519


م(س) غير متصل عند س = ٢ ، وعند س = ٣ ∴ مَ(٢) غير موجودة

وكذلك مَ(١) غير موجودة لأنها طرف فترة. مَ(٣) غير موجودة.

∴ مَ(س) = { ٣س² ، ١ < س < ٢ ؛ صفر ، ٢ < س < ٣ } ، س ∈ ]١، ٣[

نقاط حرجة عند س = ٢ ، س = ٣ ، س = ١

وهي (٢، ٨) ، (٣، ٦) ، (١، ١)

(*) اختبار المشتقة الأولى لتعيين القيم القصوى.

إذا كان م(س) اقترانًا متصلاً في الفترة [أ، ب] وكانت (جـ، م(جـ)) نقطة حرجة للاقتران م(س) جـ ∈ ]أ، ب[ فإن

1) إذا كان مَ(س) < صفر عندما أ < س < جـ وكان مَ(س) > صفر عندما جـ < س < ب

فإن م(جـ) تمثل عظمى محلية للاقتران م(س)




2) إذا كان مَ(س) > صفر عندما أ < س < جـ وكان مَ(س) < صفر عندما جـ < س < ب

فإن م(جـ) تمثل صغرى محلية للاقتران م(س)




ص ٦



ه ضوئيا بـ CamScanner

مثال 5 صـ 68 | جد القيم القصوى المحلية للاقتران م(س) = س³ + س² − ٥س − ٥

أ. معتصم ريحان

م(س) اقتران متصل على ح لأنه كثير حدود

م'(س) = ٣س² + ٢س − ٥ ، ∀ س ∈ ح نجعل م'(س) = صفر

٣س² + ٢س − ٥ = صفر

(٣س + ٥)(س − ١) = صفر

س = −٥/٣ أو س = ١







م(−٥/٣) = ٤٠/٢٧ صغرى محلية عظمى محلية للاقتران م(س) عند س = −٥/٣

م(١) = −٨ صغرى محلية للاقتران م(س) عند س = ١

أ. معتصم ريحان

---

مثال 6 صـ 69 | جد القيم القصوى المحلية للاقتران م(س) = (٨ − س) س^(٢/٣)

الحل

م(س) متصل على ح

نستخدم قاعدة الضرب في الإشتقاق

م'(س) = (٨ − س) × (١/٣) س^(−٢/٣) + س^(١/٣) × (−١)

م'(س) = (٨ − س) / (٣ س^(٢/٣)) − س^(١/٣)

العدد صفر لا ينتمي للمجال. س ∈ ح − {٠}

م'(س) = (٨ − س − ٣ × ٣ س^(٤/٣) × س^(١/٣)) / (٣ س^(٢/٣)) = صفر

⇐ نساوي البسط بصفر ٨ − س − ٣ × ٣س = صفر

٨ − ١٠س = ٠ ⇐ س = ٢ نقطة حرجة


عظمى
+ + + +

مثال (7) ص 69 جد القيم القصوى المحلية للاقتران م(س) = $\frac{س^2+3}{س-1}$ ، س ≠ 1

الحل م(س) متصل على ح − {1}

$م'(س) = \frac{(س-1)\times(2س)-(س^2+3)\times 1}{(س-1)^2} = \frac{2س^2-2س-س^2-3}{(س-1)^2}$

$= \frac{س^2-2س-3}{(س-1)^2}$ ⇐ م' غير موجودة عند س = 1

م' = صفر ⇐ بساوي البسط بصفر $س^2-2س-3=0$ صفر

$(س-3)(س+1)=0$ صفر

س = 3 ، س = −1

| | −∞ | | −1 | | 1 | | 3 | | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إشارة م' | | + | صفر | − | غير موجود | − | صفر | + | |
| | | متزايد | قيمة عظمى محلية | متناقص | | متناقص | قيمة صغرى محلية | متزايد | |

م(−1) = −2 قيمة عظمى محلية للاقتران م(س) عندما س = −1

م(3) = 6 قيمة صغرى محلية للاقتران م(س) عندما س = 3

عند س = 1 لا يوجد قيمة قصوى لأنه عند س = 1 لم يغير الاقتران من سلوكه ولأنها لا تنتمي إلى المجال أصلاً

أ. معتصم ريحان

مثال (8) ص 69 إذا كان م(س) = $أ س^3 + ب س^2 + جـ س + د$ وكان للاقتران قيمة عظمى محلية عند س = −1 قيمتها 2 وقيمة صغرى محلية عند س = 1 وقيمتها −1 فجد قيمة الثوابت أ، ب، جـ، د

الحل

م(−1) = 2 ⇐ $2 = -أ + ب - جـ + د$ ——— (1)

م(1) = −1 ⇐ $-1 = أ + ب + جـ + د$ ——— (2)

$م'(س) = 3أ س^2 + 2ب س + جـ$

م'(−1) = صفر ⇐ $3أ - 2ب + جـ = 0$ ——— (3)

م'(1) = صفر ⇐ $3أ + 2ب + جـ = 0$ ——— (4)

حل معادلة (3) مع (4) ناتجة حل معادلة (1) مع (2)

$-4ب = 0$ ⇐ $2 = -أ + جـ + \frac{1}{2}$ ⇐ $1 = 2ب + 2د$ ⇐ $-2 = أ + جـ$

ب = 0 ⇐ $جـ = -\frac{9}{4}$ ⇐ $د = \frac{1}{4}$ ⇐ $أ = \frac{3}{4}$

أ. معتصم ريحان
00972598709519
تابعني على الفيس واليوتيوب



Camscanner ممسوحة ضوئيا بـ

مثال (9) / اذا كان م(س) = { س² ، -١ ≤ س ≤ ٢ ؛ ٤ ، ٢ < س < ٣

① جد مجموعة قيم س للنقط الحرجة للاقترانة م(س)

② حدد القيم القصوى المحلية للاقترانة م(س).

أ. معتصم ريحان
00972598709519
حصص أونلاين خاصة Zoom

الحل / م(س) اقترانة متصل ف [-١ ، ٣[

م'(س) = { ٢س ، -١ < س < ٢ ؛ صفر ، ٢ < س < ٣

* أولاً عندما س ∈ ]-١ ، ٢[ نجعل م'(س) = صفر

⇐ ٢س = صفر ⇐ س = صفر ∴ يوجد نقطة حرجة فند س = صفر

* ثانياً: عندما ٢ < س < ٣ تكون م'(س) = صفر

وهذا يعني انه عند كل س ∈ ]٢ ، ٣[ يوجد نقطة حرجة م'(٢) غير موجودة ، م'(-١) غير موجودة.

فتكون مجموعة قيم س للنقط الحرجة { ٠ ، -١ ، ]٢ ، ٣[ }.

أ. معتصم ريحان حصص أونلاين مميزة جداً.

مثال (10) / اذا كان م(س) = س³ - ٢ لو س ، س ∈ ]٠ ، ٥] فحدد القيم المحلية التي يكون عندها للاقترانة م(س) قيم قصوى محلية.

الحل / م(س) متصل ف الفترة ]٠ ، ٥] ، م'(س) = ٢س - ٢/س  الآن نجعل م'(س) = صفر

⇐ ٢س - ٢/س = ٠ ⇐ ٢س² - ٢ / س = ٠ ⇐ نجعل البسط يساوي صفر

⇐ ٢س² - ٢ = ٠ ⇐ س² = ١ ⇐ س = ± ١ السالب مرفوض ∉ ]٠ ، ٥]

∴ س = ١

الآن نجعل المقام يساوي صفر لنجد القيم التي عندها م'(س) غير معرفة

∴ س = صفر ولكنه صفر ∉ ]٠ ، ٥]




∴ مجموعة النقط الحرجة للاقترانة م(س) هي { ١ ، ٥ }

أخذناها لأنها طرفي فترة وتنتمي للمجال.

م(١) = ١ قيمة صغرى محلية للاقترانة م(س)

م(٥) = ٢٥ - ٢ لو ٥ قيمة عظمى محلية للاقترانة م(س) نهاية تزايد.

مثال (11) / اذا كان م(س) = { س³ ، -١ ≤ س < ١ ؛ ½ ، س = ١ }
س ∈ [-١، ١]
أ. معتصم ريحان

جد القيم القصوى المحلية للاقترانه م(س)

الحل / م(س) متصل ف [-١، ١[ م(س) = ٣س² ، س ∈ ]-١، ١[

ومنه بإشارة م'(س) في الشكل المجاور
عند س = -١ يوجد قيمة عظمى محلية
ومقيتها م(-١) = -١

فلا يمكن الحكم عليها من خلال إشارة المشتقة الأولى لذلك نلجأ إلى
مقارنة م(١) مع نهايا م(س) وبما أن م(١) > نهايا م(س) فإن م(١) = ½
قيمة عظمى محلية

أ. معتصم ريحان 00972598709519

(*) نظرية القيم القصوى المطلقة :-
إذا كان م(س) اقتراناً متصلاً ف [أ، ب]
فإنه م(س) يتخذ قيمتا القصوى المطلقة في الفترة [أ، ب]

(*) إذا كانت م(س) متصلاً على فترة في مجاله وكان له نقطة قيمة قصوى وحيده فهي مطلقة في تلك الفترة.

مثال (12) جد أكبر قيمة وأصغر قيمة للاقترانه م(س) = س³ - ٤س ، س ∈ [-٢، ٢]

الحل / نحل المتباينة ٤ - س² ≥ ٠
-س² ≥ -٤
س² ≤ ٤
|س| ≤ ٢
-٢ ≤ س ≤ ٢

نستنتج أنه مجال م(س) هو [-٢، ٢]
∵ م(س) متصل ع [-٢، ٢] نستنتج أن
مجال م'(س) هو [-٢، ٢]
⇐ م'(س) = (٤ - ٣س²) / (٤ - س²)^½ ، س ∈ ]-٢، ٢[
بحل المقدار البسط يساوي صفر ٤ - ٣س² = ٠ ⇐ س² = ٤/٣
∴ س = ± ٢/√٣ ∈ ]-٢، ٢[
∴ النقط الحرجة هي { -٢، ٢، ٢/√٣، -٢/√٣ }
م(٢) = صغرى محلية
م(-٢) = صغرى محلية
م(٢/√٣) = ٤/٣ ⇐ القيمة العظمى المطلقة للاقتران.
م(-٢/√٣) = -٤/٣ ⇐ القيمة الصغرى المطلقة للاقتران ص 8


Camscanner بـ صوتيا حه

# (( القيم القصوى ))

حل المسألة وتمارين الدرس (ص ٧٤) من الكتاب الوزاري

س ١ / ص ٧٤ / أ / جد النقط الحرجة للاقترانات الآتية:

أ) $م(س) = \frac{1}{4}س^4 - س^3 + \frac{1}{3}$ ، $س \in [-2, 3]$

الحل $م'(س) = س^3 - 3س^2 = 0 \Leftarrow س(س-3) = 0$ أو $س = 0$ أو $س = 3$

$م'$ غير موجودة عند أطراف الفترة $س = -2$ ، $س = 3$ نقط حرجة

إذاً النقط الحرجة هي: $(0, م(0)) = (0, \frac{1}{3})$ ، $(3, م(3)) = (3, -\frac{1}{4})$

$(-2, م(-2)) = (-2, \frac{19}{3})$ ، $(3, م(3)) = (3, -\frac{1}{4})$

أ. معتصم ريحان

س ١ / ص ٧٤ / ب / $م(س) = س^{\frac{4}{3}}$ ، $س \in [-8, 8]$

أ. معتصم ريحان

الحل نجد $م'(س) = \frac{4}{3}س^{\frac{1}{3}}$ الآن نوجدها لأصلها ثم نساويها بصفر $م'(س) = \frac{4}{3\sqrt[3]{س}} = \frac{4}{3\sqrt[3]{س}}$

$4 \neq 0$ هي $م'(س)$ غير موجودة منها المقام $= 0$ $\therefore 3\sqrt[3]{س} = 0 \Leftarrow س = 0$

$م'(س)$ غير موجودة عند أطراف الفترة $س = -8$ ، $س = 8$

إذاً النقط الحرجة هي $(0, م(0)) = (0, 0)$ ، $(-8, م(-8)) = (-8, 4)$

$(8, م(8)) = (8, 4)$ أ. معتصم ريحان

س ٢ / ص ٧٤ / من التمارين منه (أ ← و) جد القيم العظمى والصغرى المحلية للاقتران $م(س)$ إنه وجدت.

أ) $م(س) = س^3 - 9س^2 + 24س$ ، $س \in \mathbb{R}$

الحل نجد $م'(س) = 3س^2 - 18س + 24 = 0$ هي $\Leftarrow س^2 - 6س + 8 = 0$

$\Leftarrow (س-4)(س-2) = 0$ ومنها $س = 4$ أو $س = 2$

| الفترة | $(-\infty, 2)$ | $2$ | $(2, 4)$ | $4$ | $(4, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| إشارة $م'(س)$ | + | 0 | − | 0 | + |
| سلوك $م(س)$ | ↗ | قيمة عظمى محلية | ↘ | قيمة صغرى محلية | ↗ |

* النقط الحرجة هي:

$(2, م(2)) = (2, 20)$ توجد عندها قيمة عظمى محلية.

$(4, م(4)) = (4, 16)$ توجد عندها قيمة صغرى محلية.

أ. معتصم ريحان
تابعنا على الفيس واليوتيوب
00972598709519

حل



تم مسحه ضوئيا بـ CamScanner

أ. مقصم ريحان

ص 74 / ب) $م(س) = 4س - س^2$

الحل أولاً نجد المجال $4 - س^2 > 0$ ⇐ $س^2 = 4$ ⇐ $س = \pm 2$

المجال ← ---(+++)--- ، $-2$ ، $2$

$\therefore س \in [-2, 2]$

$م'(س) = \frac{-2س}{2\sqrt{4 - س^2}} = 0$ ⇐ $-2س = 0$ ⇐ $س = 0$

$م'(س)$ غير موجودة عند أطراف الفترة $س = -2$ ، $س = 2$

| $س$ | $-2$ | | $0$ | | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| إشارة $م'(س)$ | | + | 0 | − | |
| سلوك $م(س)$ | | ↗ | عظمى | ↘ | |

$\therefore (-2, م(-2)) = (-2, 0)$ توجد عند صغرى محلية ومطلقة

$\therefore (0, م(0)) = (0, 2)$ توجد عند عظمى محلية ومطلقة

$\therefore (2, م(2)) = (2, 0)$ توجد عند صغرى محلية ومطلقة

أ. مقصم ريحان

ص 74 / ج) $م(س) = (س^2 - 3) e^{س}$ ، $س \in ح$

الحل $م'(س) = (س^2 - 3) \times e^{س} + e^{س} \times (2س)$ ← مشتقة ضائعة الضرب

$\therefore e^{س}(س^2 - 3 + 2س) = 0$

$e^{س} \neq 0$ ، $س^2 + 2س - 3 = 0$

$(س - 1)(س + 3) = 0$

$س = 1$ أو $س = -3$

| $س$ | $-3$ | | $1$ | |
|---|---|---|---|---|
| إشارة $م'(س)$ | + | 0 | − | + |
| سلوك $م(س)$ | ↗ | عظمى | ↘ | صغرى |

$\therefore (1, م(1)) = (1, -2e)$ توجد عند صغرى محلية

$\therefore (-3, م(-3)) = (-3, 6e^{-3})$ توجد عند عظمى محلية

أ. مقصم ريحان

S) $م(س) = \frac{س^3 - 1}{س - 1}$ ، $س \neq 1$

أولاً نحلل $م(س) = \frac{(س - 1)(س^2 + س + 1)}{(س - 1)} = س^2 + س + 1$ ، $س \neq 1$

$م'(س) = 2س + 1 = 0$ ⇐ $س = -\frac{1}{2}$

$م'(س)$ غير موجودة عند $س = 1$

$\therefore (-\frac{1}{2}, م(-\frac{1}{2})) = (-\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ عند محلية عند $س = -\frac{1}{2}$ وهي مطلقة أيضاً

ولا توجد قيم تحوي عند $س = 1$

| $س$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $1$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| إشارة $م'(س)$ | − | 0 | + | ○ | + |
| سلوك $م(س)$ | ↘ | صغرى | ↗ | | ↗ |

ص 74 / د)



CamScanner

ص 74 س 2 ب

ب) $م(س) = جتا س - جا س$ ، $س \in [0, \pi]$

الحل حاول تبسط أو ترتب أولاً $م(س) = جتا س - (1 - جتا س)$

$\Leftarrow م(س) = 2 جتا س - 1 \Leftarrow م(س) = جتا س$ ، $س \in [0, \pi]$

$م'(س) = -2 جا س = 0 \Leftarrow 2س = 0 \Leftarrow س = 0 \notin ]0, \pi[$

$\Leftarrow$ أو $2س = \pi \Leftarrow س = \frac{\pi}{2} \in ]0, \pi[$ معتصم ريحاوي

$م'(س)$ غير موجودة عند أطراف الفترة $(س = 0)$ ، $(س = \pi)$

$\therefore \left(\frac{\pi}{2}, م(\frac{\pi}{2})\right) = \left(\frac{\pi}{2}, -1\right)$ توجد قيمة عظمى محلية

$\therefore (\pi, م(\pi)) = (\pi, 1)$ توجد قيمة عظمى محلية

$\therefore (0, م(0)) = (0, 1)$ توجد قيمة عظمى محلية

إشارة $م'(س)$: $-$ $-$ | $+$ $+$

سلوك $م(س)$: 0 ↘ $\frac{\pi}{2}$ ↗ $\pi$

حصص أونة لاين خاصة

ص 74 س 2 و

و) $م(س) = ه^{-(س-2)}$ ، $س \in ؟$

$م'(س) = ه^{-(س-2)} \times -2(س-2) \times (1) = 0$

$\therefore -2س + 4 = 0 \Leftarrow س = 2$ الاشتقاق لا يساوي صفر

$\therefore (2, م(2)) = (2, 1)$ قيمة عظمى محلية ومطلقة

إشارة $م'(س)$: $+$ $+$ | $-$ $-$

سلوك $م(س)$: $-\infty$ ↗ 2 ↘

أ. معتصم ريحاوي

00972598709519

أ. معتصم ريحاوي

تابعنا على الفيس والبوتيوب

حصص خاصة أونة لاين

Zoom

ص 3



CamScanner بـ ممسوحة ضوئيا

س٣ / ص٦٤ جد أكبر وأصغر قيمة «إن وجدت» لكل من الاقترانات الآتية :-

[أ] $م(س) = \begin{cases} س^3 & ، 0 \leq س < 2 \\ س^2 + 4 & ، 2 < س \leq 3 \end{cases}$ ، $س \in [0، 3]$

أ. معتصم ريحان

الحل نبحث الاتصال عند نقطة الفصل $س = 2$ أولاً.

$م(2) = 8$ ، $\lim_{س \to 2^+} م(س) = 8$ ، $\lim_{س \to 2^-} م(س) = 8$

$\Leftarrow 8 = 8$ $\Leftarrow$ $\lim_{س \to 2^+} م(س) = \lim_{س \to 2^-} م(س) = م(2)$

$\therefore م(س)$ متصل عند $س = 2$ ومتصل أيضاً على $[0، 3]$

الآن نبحث الاشتقاق $م'(س) = \begin{cases} 3س^2 & ، 0 < س < 2 \\ 2س & ، 2 < س < 3 \end{cases}$

$م'(2^+) = م'(2^-)$

$2 \times 2 = 3 \times (2)^2$

$4 \neq 12$

$\therefore م'(2)$ غير موجودة.

$م'(س) = 0$ عندما $3س^2 = 0 \Leftarrow س = 0 \notin ]0، 2[$ في الفترة الأولى $0 < س < 2$

$م'(س) = 0$ عندما $2س = 0 \Leftarrow س = 0 \notin ]2، 3[$ في الفترة الثانية $2 < س < 3$

وأيضاً $م'(س)$ غير معرفة عند أطراف الفترة $س = 0$ ، $س = 3$

$\therefore$ النقط الحرجة عند $س = \{0، 2، 3\}$

أ. معتصم ريحان تابعني على الفيس واليوتيوب

$م(0) = (0)^3 = 0 \Leftarrow (0، م(0)) = (0، 0)$

$م(3) = (3)^2 + 4 = 13 \Leftarrow (3، م(3)) = (3، 13)$




(0، 0) هي نقطة حدي مطلقة لأنها أصغر قيمة.

(3، 13) هي نقطة عظمى مطلقة لأنها أكبر قيمة.

عند $س = 2$ لا يوجد قيم قصوى


حصص أونلاين خاصة وميزة Zoom
أ. معتصم ريحان
00972598709519


ص٦



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أ. معتصم ريحان

ب) (3/74) ص 2024

م(س) = $e^{س}$ − $e^{-س}$ − 2س ، س ∈ [0 ، 3]

الحل م(س) متصل على [0 ، 3] ⇐ م'(س) = $e^{س}$ + $e^{-س}$ − 2 = 0 ⇐ $e^{س}$ + $\frac{1}{e^{س}}$ = 2

⇐ $e^{2س}$ + 1 = 2$e^{س}$ ⇐ $e^{2س}$ − 2$e^{س}$ + 1 = 0 ⇐ $(e^{س} - 1)^2$ = 0 ⇐ $e^{س}$ = 1

⇐ س = 0

عندما تتساوى الأساسات تتساوى الأسس

أ. معتصم ريحان

⇐ م'(س) غير موجودة عند أطراف الفترة [0 ، 3] ∴ س = 0 ، س = 3

م(0) = $e^{0}$ − 2×0 = 1 ∴ (0 ، 1) هي نقطة عظمى محلية

م(1) = $e^{1}$ − 2×1 = $e$ − 2 ∴ (1 ، $e$ − 2) هي نقطة صغرى مطلقة

م(3) = $e^{3}$ − 2×3 = $e^{3}$ − 6 ∴ (3 ، $e^{3}$ − 6) هي نقطة عظمى مطلقة

أ. معتصم ريحان

| إشارة م'(س) | + + + | 0 | − − − | 0 | + + + |
|---|---|---|---|---|---|
| سلوك م(س) | ↗ | 1 | ↘ | 2 | ↗ |
| | | عظمى محلية | | صغرى مطلقة | |

عند س = 1 لا يوجد قيم قصوى

أ. معتصم ريحان

ج) (3/74) ص

م(س) = جتاس − $\frac{1}{2}$ جتا2س ، س ∈ $[\frac{\pi}{2} ، \frac{3\pi}{2}]$

الحل م(س) متصل على $[\frac{\pi}{2} ، \frac{3\pi}{2}]$ ⇐ م'(س) = −جاس + جتا2س × جاس = 0

⇐ م'(س) = −جاس (1 − جتا2س) = 0

⇐ م'(س) = −جاس × (جاس) = 0 ⇐ −$جا^{3}$س = 0 ⇐ جاس = 0

∴ س = π

⇐ م'(س) غير م عند س = $\frac{\pi}{2}$ ، س = $\frac{3\pi}{2}$ أطراف فترة.

س = عز ∉ للفترة.

أ. معتصم ريحان

لإيجاد الإشارة فوق خط الأعداد نعوض في م'(س)

| إشارة م'(س) | − − − | 0 | + + + | 0 | + + + |
|---|---|---|---|---|---|
| سلوك م(س) | ↘ | $\frac{\pi}{2}$ | ↗ | π | ↗ |
| | | صغرى مطلقة | | $\frac{3\pi}{2}$ | |

م($\frac{\pi}{2}$) = جتا($\frac{\pi}{2}$) − $\frac{1}{2}$ $(جتا\frac{\pi}{2})^{3}$ = عز ∴ ($\frac{\pi}{2}$ ، عز) قيمة عظمى مطلقة

م(π) = جتا(π) − $\frac{1}{2}$ $(جتا\pi)^{3}$ = $\frac{-1}{2}$ ∴ (π ، $\frac{-1}{2}$) نقطة صغرى محلية

م($\frac{3\pi}{2}$) = جتا($\frac{3\pi}{2}$) − $\frac{1}{2}$ $(جتا\frac{3\pi}{2})^{3}$ = عز ∴ ($\frac{3\pi}{2}$ ، عز) نقطة عظمى مطلقة

أ. معتصم ريحان

ص 5



CamScanner

س٦ / ص٦٩ اذا كانت $م(س) = أ س^{٣} + ب س^{٢} + ٩س + ١$ ، $أ، ب \in ح$

اقترن له قيمة عظمى محلية عند $س = ١$ ، وقيمة صغرى محلية عند $س = ٣$

ما قيمة كل من الثابتين $أ$ ، $ب$ .

الحل دائماً اذا قال لك السؤال يوجد قيمة قصوى سواء كانت عظمى أو صغرى عند $س = ...$

معناه أنه المشتقة عند هذا العدد يساوي صفر ∴ أ. مقدم ريحان

اذاً ⟸ $\boxed{م'(١) = صفر}$ وأيضاً $\boxed{م'(٣) = ٠}$

الآن نجد $م'(س)$ ثم نعوض مرة بواحد ومرة بثلاثة .

$م(س) = ٣أ س^{٢} + ٢ب س + ٩$

$م'(١) = ٣أ(١)^{٢} + ٢ب(١) + ٩$

$صفر = ٣أ + ٢ب + ٩$

$\boxed{-٩ = ٣أ + ٢ب}$ ①

$م'(س) = ٣أ س^{٢} + ٢ب س + ٩$

$م'(٣) = ٣أ(٣)^{٢} + ٢ب(٣) + ٩$

$صفر = ٢٧أ + ٦ب + ٩$

$\boxed{-٩ = ٢٧أ + ٦ب}$ ②

نحل المعادلتين بالحذف

$-٩ = ٣أ + ٢ب$ × (-٣) ← اطرح

$-٩ = ٢٧أ + ٦ب$

$٩ + ٢٧أ + ٦ب = ٩ - ٩أ - ٦ب$

$١٨ = ١٨أ$

$\boxed{أ = ١}$ ⟸ $\boxed{ب = -٦}$

أ. مقدم ريحان

00972598709519

يمكن التواصل معه على الواتس فقط

Zoom دروس خاصة أونلاين

س٥ / ص٦٩ باستخدام القيم القصوى أثبت أن المقدار $٤س^{٣} - س^{٤} - ٢٩$ سالب دائماً

$م(س)$ متصل لماذا ؟ لأنه كثير حدود

$م'(س) = ١٢س^{٢} - ٤س^{٣} = ٠$

$٤س^{٢}(٣ - س) = ٠$

إما $\boxed{س = ٠}$ أو $\boxed{س = ٣}$

| $س$ | $-\infty$ | | ٠ | | ٣ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إشارة $م'(س)$ | + + + | | + + + | | | | - - - |
| سلوك $م(س)$ | | صفر | | | عظمى | | |

∴ $م(٣) = ٤(٣)^{٣} - (٣)^{٤} - ٢٩ = -٢$ ②

∴ $(٣، م(٣)) = (٣، -٢)$ توجد قيمة عظمى محلية مطلقة

∴ $م(س) \leq -٢$ لكل $س \in ح$ وهنا $م(س)$ سالب دائماً .

أ. مقدم ريحان

00972598709519

يمكن التواصل معه على الواتس فقط

Zoom دروس خاصة أونلاين



تم مسحه ضوئيا بـ CamScanner

السلام عليكم ورحمة الله

هذا التلخيص المميز جداً هدفت جاريه عني وعن أهلي وأموالي وجميع موتى المسلمين .

* هذا التلخيص موجود بالكامل فيديوهات مصورة وهو عبارة عنه حصص خاصة مميزة على الزووم، اذا أردت التسجيلات كاملة وسلمني على العنوان 00972598 709519 أ. معتصم ريحان

* فيديوهات هذا التلخيص بنفس ترتيب التلخيص وهذا هو الشيء المميز جداً والذي لا يوجد في فلسطين مثله .
بفضل الله .

* بعض هذه الفيديوهات موجودة بشكل عام للكل على قناتي على اليوتيوب باسم (( معتصم ريحان رياضيات توجيهي ))
وباقي الفيديوهات موجودة بروابط خاصة لمنه يطلبها وانا .

* اعتمد بشكل كامل في هذا التلخيص وبإذن الله ستحصل على العلامة الكاملة .

* لا تنسى أن تتابعي صفحتي الرسمية على الفيس بوك وقناتي على اليوتيوب وكلاهما باسم (( معتصم ريحان رياضيات توجيهي ))

* بشرى سارة لكل طلاب فلسطين هذا التلخيص شامل ومجاني بالكامل لكل طلاب فلسطين وبإمكانك ارساله لمنه تحب لكنه فيديوهات هذا التلخيص غير مجانية وانا أردت الحصول عليها وسلمني وانا .

أ. معتصم سلام ريحان

تابعني على مجموعات الواتس والتليجرام ضروري . 00972598 709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مجلة رقم 34
توجيهي علمي 2022
أ. معتصم ريحان

# ((أسئلة امتحانات سابقة على درسا))
## ((القيم القصوى))

2008 الكمال) اذا كان للاقتران م(س) قيمة حرجة عندما س = جـ
فإنّ إحدى العبارات الآتية صحيحة دائماً

أ) م(جـ) < حز  ب) مَ(جـ) > حز
ج) مَ(جـ) = حز  د) (جـ، م(جـ)) نقطة حرجة للاقتران م(س)

الخيار (أ) ليس صحيحاً دائماً لأنه ممكن تكون م(جـ) > حز وتكون حز قيمة محلية
الخيار (ب) ممكن تكون مَ(جـ) غير موجودة وليس حز وتكون عندها قيمة حرجة محلية
الخيار (جـ) ليس صحيح لأنه ليس صحيح بالضرورة مَ(جـ) > حز والسؤال لم يقل ذلك.

أ. معتصم ريحان

2009 الكمال) اذا كان الاقتران م(س) متصلاً على [0، 1] وكانت مَ(س) > حز لجميع قيم س ∈ ]0، 1[ فإنّ إحدى العبارات التالية صحيحة دائماً

أ) لا يوجد للاقتران نقطة انعطاف من ]0، 1[
ب) للاقتران م(س) قيمة عظمى عندما س = 0
ج) الاقتران متقعر للأعلى على [0، 1]
د) للاقتران م(س) قيمة عظمى عندما س = 1

إشارة مَ(س): + + + + + على ]0، 1[

(*) التقعر رأيناه في الحصة الثانية

أ. معتصم ريحان

2009 الكمال) إذا كان م(س) = 2س³ − ps² وكان لمنحنى الاقتران م(س) قيمة قصوى محلية عندما س = 1 فإنّ قيمة p

أ) 2  ب) −3
ج) 3  د) −2

الحل: مَ(1) = حز ← لأنه قال عندما س = 1 فهي قيمة قصوى

مَ(س) = 6س² − 2ps
مَ(1) = 6(1)² − 2p(1)
حز = 6 − 2p
−6 = −2p
p = 3 #

أ. معتصم ريحان

تابعنا على الفيس واليوتيوب
حصص أونلاين خاصة Zoom


CamScanner

2012 / اذا كان م(س) معرف على ح وكانت قم(س) = $\frac{س^4 + 2س}{(س+1)^2}$ فإن عدد النقط الحرجة للاقتران م(س) يساوي

(أ) صفر (ب) 1 (ج) 2 (د) 3

الحل قم(س) = 0 عندما البسط يساوي صفر

$س^4 + 2س = 0 \Leftarrow س(س+2) = 0$

$\Leftarrow س = 0$ أو $س = -2$

وأيضاً قم غير معرف عندما المقام = صفر

$(س+1) = 0$

$س = -1$

أ. معتصم ريحان
00972598709519

---

2013 / اذا كان م(س) = $[2س - 4]$ $س \in [0, 2]$ فإن مجموع قيم س التي يكون عندها نقطة حرجة للاقتران م(س) هي

(أ) 2، 0 (ب) $[2, 0]$ (ج) $]2, 0[$ (د) $[2, 1.6, 0]$

الحل أولاً نغير تعريف الصحيح

طول الدرجة = $\frac{1}{2}$

$2س - 4 = 0$

$س = 2$

أ. معتصم ريحان
تابعنا على الفيس واليوتيوب

م(س) = $[2س - 4]$ =

(-4) ، $0 \leq س < \frac{1}{2}$

-3 ، $\frac{1}{2} \leq س < 1$

-2 ، $1 \leq س < 1\frac{1}{2}$

-1 ، $1\frac{1}{2} \leq س < 2$

صفر ، $س = 2$

$\Leftarrow$ قم(س) =

0 ، $0 < س < \frac{1}{2}$

0 ، $\frac{1}{2} < س < 1$

0 ، $1 < س < 1\frac{1}{2}$

0 ، $1\frac{1}{2} < س < 2$

قم(س) = 0 عند كل القيم $\therefore$ الفترة $[0, 2]$ ما كلها نقط حرجة

أ. معتصم ريحان

---

2017 / جاهل تكمل بعدك

لتكن م(س) = $\sqrt{6 - س^2}$ ، $س \in [-2, 1]$ فإن القيمة الصغرى المطلقة .

(أ) م(1) (ب) م(0) (ج) م(-1) (د) م(-2)

$\Leftarrow$ لاحظ هنا سأل عن القيمة ولم يسأل عن سينها.

أ. معتصم ريحان
مشرف أونه لاينه خاصة
ميزة على الزوم

ص 2



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2016 ثانوي / إذا كانت $م(س) = |س - 2| - 5$ ، $س \in [-2, 2]$

فإن القيمة المطلقة العظمى للاقتران $م(س)$ في مجاله هي

الحل أولاً نعيد تعريف المطلقة $س - 2 = 0 \Leftarrow س = 2$

(أ) 1 (ب) -1

(ج) -5 (د) 0

(هـ) -9

$$|س - 2| = \begin{cases} -(س-2) & ، س \leq 2 \\ س - 2 & ، س > 2 \end{cases}$$

هذه الفترة التي نريدها هي المجال المعطى $س \in [-2, 2]$

$$م(س) = \begin{cases} -س + 2 - 5 & ، -2 \leq س \leq 2 \\ -(س-2) - 5 & ، 2 < س \leq 2 \end{cases}$$

$$م(س) = \begin{cases} -س - 3 & ، -2 \leq س \leq 2 \\ -س - 3 & ، 2 < س \leq 2 \end{cases}$$

$$م'(س) = \begin{cases} -1 & ، -2 < س < 2 \end{cases}$$

$م'(س)$ غير معرف عندما $س = 2$ ، $س = -2$

∴ للاقتران $م(س)$ قيمة عظمى مطلقة عندما $س = -2$ وقيمتها $م(-2) = -1$

∴ $(-2, -1)$ قيمة عظمى مطلقة.

---

كامل الأسئلة / لتكن $م(س) = 2س^4 - س^2$ ، $س \in [-2, 2]$ فإن قيمة $س$ التي يكون عندها للاقتران $م(س)$ قيمة عظمى مطلقة هي

(أ) -2 (ب) صفر (ج) 1 (د) 2 (هـ) 2

الحل

$$م'(س) = \frac{-2س}{2\sqrt{2س^4 - س^2}}$$

$م'(س) = 0$ عندما البسط يساوي صفر

∴ $-2س = 0 \Leftarrow س = 0 \in ]-2, 2[$

$م'(س)$ غير معرف عندما المقام = صفر

$2\sqrt{2س^4 - س^2} = 0 \Leftarrow 2س^4 - س^2 = 0$

$\Leftarrow س = \pm 2 \notin ]-2, 2[$

يطلعك صفر والباقي راجعة.

لاحظ هنا سؤال عن قيمة $س$ وليس قيمة $م$ وليس سؤال عن القيمة



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2020 اختر / ما مجموعة قيم س التي يكون عندها للاقترانه م(س) قيمة صغرى محلية




أ) ١ ب) ٢
ج) ٣ د) ١، ٣

لاحظ أن الرسم هو للاقترانه المشتق (م'(س))

∴ القيمة الصغرى هي عند س = ٣




ومنه الشكل المرسوم

أ. معتصم ريحان

2020 دور ثاني / اذا كان م(س) = { س+١ ، -١ ≤ س < ٣ ; ٨ ، س = ٣ } فما القيمة العظمى المطلقة للاقترانه م(س) إنه وجدت

الحل نبحث الاتصال عند س = ٣

نهام(س) = م(٣)
س→٣

١٠ ≠ ٨

∴ م(س) غير متصل عند س = ٣ ⇐ ق(٣) = غ.م

أ) ٢ ب) ٨
ج) لا يوجد للاقترانه قيمة عظمى مطلقة
د) ١٠

أ. معتصم ريحان
00972598709519

ق(س) = { ٢س ، -١ < س < ٣ }

ق(س) = ٠ ⇐ ٢س = ٠ ⇐ س = ٠

ق(س) غير موجودة عند س = -١ ، س = ٣ لأنهم أطراف فترة .

م(٣) = غير متصل لأنه عندها الاقترانه غير متصل

م(-١) = (-١)^٢ + ١ = ٢

نجد النهايات عند س = ٣ من اليسار

نهام(س) = ٣^٢ + ١ = ١٠
س→٣

م(٣) > نهام(س)
س→٣

٨ > ١٠

| إشارة ق(س) | + | 0 | - | 0 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| سلوك م(س) | عظمى | | صغرى | | عظمى |
| | -١ | | ٠ | | ٣ |

لا يوجد للاقترانه قيمة عظمى مطلقة لكنه يوجد عظمى محلية عند س = -١

لأنه النهايات افترقت عند س = ٣ فرضيا بالقيمة العظمى المطلقة .


CamScanner ممسوحة ضوئيا بـ

دور ثاني 2020 / ليكن م(س) ، هـ(س) اقترانين سالبين وقابلين للاشتقاق ومتناقصين على ح وكان ل(س) = (م(س) × هـ(س))² فإن العبارات التالية صحيحة دائماً على الاقتران ل(س) .

أ. معتصم ريحان
تابعين على الفيس واليوتيوب

أ) ل(س) متناقص على ح
ب) ل(س) متزايد على ح
ج) ل'(س) ≥ صفر
د) ل(س) اقتران ثابت .

الحل / ل(س) = (م(س) × هـ(س))²
⇐ ل(س) = (م(هـ(س)))²
⇐ ل'(س) = ٢ (م(هـ(س))) × م'(هـ(س)) × هـ'(س)
⇐ ل'(س) = ٢ × (−) × (−) × (−) = (−)
∴ ل'(س) < صفر ∴ ل(س) متناقص على ح .

معطى م(س) سالب
المطلوب هـ(س) سالب
أ) م(س) متناقص ⇒ م'(س) < ٠
ب) م(س) متناقص ⇒ هـ'(س) < ٠

أ. معتصم ريحان

دور ثاني 2020 / ليكن م'(س) = ٦ (س+١) (س−٢)² فإن للمنحنى الاقتران م(س) يمثل

أ) عظمى محلية عندما س = −١
ب) صغرى محلية عندما س = −١
ج) عظمى محلية عندما س = ٢
د) صغرى محلية عندما س = ٢

الحل م'(س) = ٦ (س+١) (س−٢)² = صفر
إما س+١ = ٠ أو (س−٢)² = ٠
س = −١ أو س = ٢

أ. معتصم ريحان
صفرين أو نهاية خامسة ميزة

∴ للاقتران م(س) نقطة صغرى محلية عندما س = −١




لاحظ لا يوجد عندما س = ٢ ثم تكون

أ. معتصم ريحان
تابعين على الفيس واليوتيوب

د


CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

**تجريبي القدس 2020**

اذا كان م(س) كثير حدود ، م(١) = صفر ، قـ(١) × قـ(٢) < صفر
قـ(٢) > صفر فإن م(١) يمتلك

(أ) عظمى محلية (ب) صغرى محلية (ج) عظمى مطلقة (د) صغرى مطلقة .

**الحل** بما أن قـ(٢) > صفر ∴ قـ(٢) موجب

نعطى أيضاً أن قـ(١) × قـ(٢) < صفر

نستنتج أن (لازم قـ(١) يكون) ⊕ × ⊕ < صفر

نعطى أنّ م(١) = صفر و قـ(١) > صفر

نستنتج منها أنه م(١) يمتلك صغرى محلية

هذه قاعدة نعرف منه خلالها العظمى والصغرى عن طريق الطريقة الثانية

**قاعدة**
قـ(١) > صفر ∴ م(١) صغرى
ولو كانه قـ(١) < صفر ∴ م(١) عظمى

---

**تجريبي قلقيلية 2020**

اذا كان م(س) = جا٣س ، س ∈ [-١، ١] فإنه أكبر
يمتلك للاقتران م(س)

(أ) صفر (ب) ١ (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{\pi}{2}$

**الحل** م(س) = جتا٣س × ٣ = صفر

جتا٣س = صفر

ما هي الزاوية التي جتا لها يساوي صفر

٣س = ٩٠ ، ٣س = ٢٧٠

س = $\frac{1}{2}$ ، س = $\frac{3}{2}$ مرفوضة

$\frac{1}{2} \in ]-1، 1[$ $\frac{3}{2} \notin [-1، 1]$

(×) النقطة الحرجة وليس لها

م($\frac{1}{2}$) = جا٣ × $\frac{1}{2}$ = ١ أكبر قيمة للاقتران

م(١) = جا٣ × ١ = صفر صغرى مطلقة

م(-١) = جا٣ × -١ = صفر صغرى مطلقة

| س | -١ | | $\frac{1}{2}$ | | ١ |
|---|---|---|---|---|---|
| قـ(س) | | + | ٠ | - | |
| م(س) | صغرى | ↗ | عظمى | ↘ | صغرى |

(١، ٠)
(-١، ٠) | (٠، ١)
(٠، -١)


CamScanner بـ ممسوحة ضوئيا

2022 الدورة الاستكمالية / اذا كانت لمنحنى م(س) = ٢س^٣ + أ س^٢ تمتلك حرجة محلية عندما س = ١ فما قيمة أ

أ) -٣ ب) -٢ ج) ٢ د) ٣

الحل: م'(١) = صفر ← استنتج القاعدة وعوض.

م'(س) = ٦س^٢ + ٢أس

م'(١) = ٦(١)^٢ + ٢أ(١) = صفر

٢أ = -٦ ⇐ أ = -٣

---

2021 دور ثاني / اذا كانت م(س) = س هـ^س فماذا يكون للاقتران م(س)

أ) قيمة عظمى محلية عندما س = ١

ب) قيمة حرجة محلية عندما س = ١

ج) قيمة عظمى محلية عندما س = -١

د) قيمة حرجة محلية عندما س = -١

الحل: م'(س) = س × هـ^س + هـ^س × ١ = صفر

هـ^س (س + ١) = ٠

لا يساوي صفر ← هـ^س ≠ صفر ⇐ س + ١ = ٠ ⇐ س = -١




أ. معتصم رحايل 0097259870951

---

2019 تجريبي ملحق / إذا كانت م(س) = أ س^٣ - ب س^٢ وكان م(١) = -١ وكان للاقتران م أ، ب على الترتيب

أ) ٣، ٢ ب) ٢، ٢ ج) ١، ٣ د) ١، -١

صفر للاقتران م(١) = -١

م'(١) = ٠ ← ٣أ(١)^٢ - ٢ب(١)

-١ = أ - ب ... (١)

م'(س) = ٣أس^٢ - ٢ب س

م'(١) = ٣أ(١)^٢ - ٢ب(١)

صفر = ٣أ - ٢ب ... (٢)

نحل معادلة (١) مع (٢) بالحذف

نضربها في -٣ ← -١ = أ - ب

صفر = ٣أ - ٢ب

٣ = -٣أ + ٣ب

صفر = ٣أ - ٢ب

٣ = ب

الآن نعوض لإيجاد أ

-١ = أ - ٣

أ = ٢

أ. معتصم رحايل

تابعنا على الفيس والبوتيوب



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2019 تجريبي تام الله

إذا كانت $م(س) = \begin{cases} س^2 - 2س & ، س \geq 2 \text{ أو } س < -2 \\ 1 & ، س = -2 \end{cases}$ فكون على الفترة $[-2, 2]$ فإنه إحدى العبارات الآتية صحيحة :-

أ) $م(-2)$ عظمى محلية
ب) $م(1)$ عظمى محلية
ج) $م(0)$ عظمى محلية
د) $م(2)$ عظمى محلية.

أ. معتصم ريحان
00972598709519

الحل الاقتران $م(س)$ غير متصل عند $س = 2$

$م(س) = \begin{cases} 2س & ، س < 2 \\ س^2 & ، س \geq 2 \end{cases}$

$م(س)$ مساوي صفر $\Leftarrow$ $س < 2$

$\Leftarrow 2س = 0 \Leftarrow س = 0$

سلوك $م(س)$

إشارة $م'(س)$ : $---$ | $+++$ | $+++$ عند $-2$ و $0$ و $2$

$م(-2)$ عظمى

$م(-2)$ عظمى محلية بما أنه متناقص

$\therefore م(2) < \text{نهاية } م(س)$ عند $س \to 2^-$

$\therefore 1 < 4$

لاحظ $م(2) = 1$

نهاية $م(س) = 2^2 = 4$ عند $س \to 2^-$

أ. معتصم ريحان
00972598709519
تابعني على الفيس والبوستوب

فحص أوله كاينة خطة فيزة.

---

2019 تجريبي الوسطى

إذا كانت $م(س) = |س - 2| - 5$ ، $س \in ح$ فما القيمة الصغرى المطلقة للاقتران

أ) $-5$ ب) $-2$ ج) صفر د) $5$

أ. معتصم ريحان

الحل أولاً نجد تعريف المطلق $س - 2 = 0 \Leftarrow س = 2$

$+++$ | $---$ عند $2$

$|س - 2| = \begin{cases} س - 2 & ، س \geq 2 \\ 2 - س & ، س < 2 \end{cases}$

$م(س) = \begin{cases} س - 8 & ، س \geq 2 \\ -س - 2 & ، س < 2 \end{cases}$

$قـ(س) = \begin{cases} 1 & ، س \geq 2 \\ -1 & ، س < 2 \end{cases}$

الآن مساوي $قـ(س)$ صفر

$ص \neq 1$

$ص \neq -1$

$\therefore$ غير معرف عند $س = 2$ : $قـ(2^+) \neq قـ(2^-)$

$---$ | $+++$ عند $-3$ و $\infty$

يوجد قيمة صغرى محلية عند $س = 3$ وتساوي

$م(2) = -5$ $\neq$ صفر



Camscanner الوجه صوتيا بـ

الحصة رقم 35

توجيهي علمي 2022

أ. معتصم رحاحلة

00972598709519

## (( أسئلة مقالية )) أسئلة امتحانات سابقة

## (( على درس القيم القصوى ))

**2011 شتوي** جد مجالات التزايد والتناقص والقيم القصوى المحلية للاقتران $م(س) = \frac{س + 1}{س^2 + 3}$

**الحل** $م'(س) = \frac{(س^2+3)(1) - (1+س)(2س)}{(س^2+3)^2} = 0$

(1) بساوي البسط بصفر $\Leftarrow (س^2+3) - (1+س)2س = 0$

$\Leftarrow س^2 + 3 - 2س^2 - 2س = 0 \Leftarrow -س^2 - 2س + 3 = 0$

$\Leftarrow س^2 + 2س - 3 = 0 \Leftarrow (س+3)(س-1) = 0 \Leftarrow$ **س = -3 أو س = 1**

(2) نساوي المقام بصفر $\Leftarrow (س^2+3)^2 = 0 \Leftarrow س^2 + 3 = 0$

$\Leftarrow س^2 = -3$ لا يمكن حلها في ح / نستفيد ايجاد الجذور

سلوك $م'(س)$ : − − − | + + + | − − − (إشارة $م'(س)$)

الجذور: −3 ، 1

∴ $م(س)$ متناقص $]-\infty, -3[ \cup ]1, \infty[$

∴ $م(س)$ متزايد $]-3, 1[$

عند $س = -3$ يوجد مماس أفقي محلي ومميز $م(-3) = \frac{-3+1}{2+(-3)^2} = \frac{-2}{12} = \frac{-1}{6}$

عند $س = 1$ يوجد مماس أفقي محلي ومميز $م(1) = \frac{1+1}{2+(1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

أ. معتصم رحاحلة 00972598709519

---

**2019 تجريبي سلفيت** إذا كان للاقتران $م(س) = س^3 - 3س^2 + ج$ مماس أفقي محلي مميز عند $س = 2$ فما مميز المماس الثابت ج

**الحل** $م'(س) = 3س^2 - 6س = 0$

$س(3س - 6) = 0$

$س = 0$ أو $س = 2$

∴ $م(2) = 0$

$\Leftarrow م(2) = (2)^3 - 3(2)^2 + ج = 0$

$\Leftarrow ج = 8 - 12 + ج = 0$

$ج = 4$

إشارة $م'(س)$: + + + | − − − | + + +

الجذور: 0 ، 2

عند $س = 0$ يوجد مماس أفقي محلي مميز

عند $س = 2$ يوجد مماس أفقي محلي مميز

**الحل** أ. معتصم رحاحلة



Camscanner

2017 دور ثاني

اذا كانت $م(س) = ٤س - \frac{١}{٣}س^٣$ ، $[-٣، ٣]$ أوجد

① النقط الحرجة.
② فترات التزايد والتناقص
③ القيم القصوى المطلقة للاقتران $م(س)$.

الحل $م'(س) = ٤ - س^٢ = ٠ \Leftarrow س^٢ = ٤ \Leftarrow (س = \pm ٢) \in [-٣، ٣]$

① النقط الحرجة هي عندما $س = \{-٣، -٢، ٢، ٣\}$




$م(-٣) = ٤(-٣) - \frac{١}{٣}(-٣)^٣ = -٣$

$م(-٢) = ٤(-٢) - \frac{١}{٣}(-٢)^٣ = -\frac{١٦}{٣}$

$م(٢) = ٤(٢) - \frac{١}{٣}(٢)^٣ = \frac{١٦}{٣}$

$م(٣) = ٤(٣) - \frac{١}{٣}(٣)^٣ = ٣$

∴ النقط الحرجة هي

$(-٣، -٣)$ نقطة حرجة ويوجد عندها قيمة عظمى محلية

$(-٢، -\frac{١٦}{٣})$ نقطة حرجة ويوجد عندها قيمة صغرى محلية وهي مطلقة أيضاً (أصغر قيمة)

$(٢، \frac{١٦}{٣})$ نقطة حرجة ويوجد عندها قيمة عظمى محلية وهي مطلقة أيضاً (أكبر قيمة)

$(٣، ٣)$ نقطة حرجة ويوجد عندها قيمة صغرى

② الاقتران $م(س)$ متناقص $[-٣، -٢] \cup [٢، ٣]$

الاقتران $م(س)$ متزايد $[-٢، ٢]$

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس والبوتيوب

2019 تجريبي القدس

أكبر قيمة للاقتران $م(س) = س^٣ - ٣س + ١$ ، $س \in [٠، ٣]$ هي

أ) $\frac{١}{٣}$ ب) ٣
ج) صفر د) $-١$

حاول أنه تحل بنفسك يا بطل

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس والبوتيوب
فيها أدلة لأنه حاضر ومميزة على الزووم


CamScanner

2020 س / اذا كانه م(س) = ٦ س^{-١} - ٣ س^{٢} أوجد :

① مجالات التزايد والتناقص للإقتران م(س)

② القيم القصوى المحلية ، وحدد المطلقة منها إنه وجدت .

أ. معتصم ريحان

الحل م'(س) = ٦ × (-١) س^{-٢} - ٣ × ٢ س = ص'

⇐ ٣ س^{٢} = ٣ ⇐ س^{٢} = ١ ربع الطرفين

⇐ س = ١ ⇐ س = ١

لاحظ أن مجال م(س) هو ح ، ح ≠ صفر

الاقتران م(س) متزايد [صفر ، ١]

الاقتران م(س) متناقص [١ ، ∞[

إشارة م'(س)

+ + + + | - - - - -

صفر ١ ∞

سلوك م(س)

نفرض ن م'(س) لايجاد الاشارات فوق خط الاعداد .

أ. معتصم ريحان

للاقتران م(س) قيمة حرجة عندما س = صفر

وقيمتها م(٠) = صفر

للاقتران م(س) قيمة عظمى محلية ومطلقة عندما س = ١ وقيمتها م(١) = ٣

لاحظ أنه لا يوجد في السؤال قيمة حرجة مطلقة لأنه اما لا نهاية وطلبت على القيمة الحرجة . أ. معتصم ريحان

دور ثاني 2020 س / اذا كانه م(س) = ١/٣ س^{٣} - س^{٢} - ٢ س + ٤ أوجد ① مجالات التزايد والتناقص ② القيم القصوى المحلية انه وجدت .

الحل م'(س) = س^{٢} - ٢ س - ٢ = ٠

(س - ٢)(س + ١) = ٠

س = ٢ أو س = -١

إشارة م'(س)

+ + + + | - - - - | + + + +

-∞ -١ ٢ ∞

سلوك م(س)

م(س) متزايد ]-∞ ، -١] ∪ [٢ ، ∞[

م(س) متناقص [-١ ، ٢]

للاقتران م(س) قيمة قصوى عظمى محلية عندما س = -١ وقيمتها م(-١) = ٥/٣

للاقتران م(س) قيمة قصوى صغرى محلية عندما س = ٢ وقيمتها م(٢) = -٥

لاحظ لا يوجد قيم قصوى عظمى او صغرى مطلقة في السؤال لأنه اما لا نهاية وطلبت على القيمة

ص

أ. معتصم ريحان

حصص أونلاين خاصة مميزة

٠٠٩٧٢٥٩٨٧٠٩٥١٩



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2021 / اذا كان $ق(س) = ه^{س} - ه^{-س}$ فما هي أصغر قيمة للاقتران $ق(س)$ في الفترة $[0، 3]$

**قاعدة** إذا تساوت المسافات تتساوى الأسس

الحل $ق(س) = ه^{س} - ه^{-س} = صفر$

$\Leftarrow ه^{س} = ه^{-س} \Leftarrow$ **س = 1**

أصغر قيمة للاقتران $ق(س)$ هي عند $س = 1$

وقيمتها $ق(1) = ه^{1} - ه^{-1} = صفر$

**ق(1) = صفر** قيمة صغرى محلية ومطلقة

إشارة $ق'(س)$: $---$ (0) $---$ (1) $+++$ (3) $+++$

سلوك $ق(س)$: ↓ معكوس ↑

أ. معتصم ريحان تابعنا على الفيس واليوتيوب

---

2021 / اذا كان $ق(س) = س^{3} - 6س^{2} - 15س$ ، $س \in [-2، 6]$

أوجد ① فترات التزايد والتناقص للاقتران $ق(س)$

② القيم القصوى المحلية والمطلقة للاقتران $ق(س)$ إن وجدت.

الحل $ق'(س) = 3س^{2} - 12س - 15 = صفر \Leftarrow س^{2} - 4س - 5 = صفر$

$\Leftarrow (س - 5)(س + 1) = صفر \Leftarrow$ **س = 5** أو **س = -1**

أ. معتصم ريحان

الاقتران $ق(س)$ تزايد $[-2، -1] \cup [5، 6]$

الاقتران $ق(س)$ تناقص $[-1، 5]$

إشارة $ق'(س)$: $+++$ (-2) $---$ (-1) $---$ (5) $+++$ (6)

سلوك $ق(س)$: ↑ معكوس ↓ معكوس ↑

للاقتران $ق(س)$ قيمة قصوى صغرى عندما $س = -2$ وقيمتها $ق(-2) = -2$

للاقتران $ق(س)$ قيمة قصوى عظمى محلية ومطلقة عندما $س = -1$ وقيمتها $ق(-1) = 8$

للاقتران $ق(س)$ قيمة قصوى صغرى محلية ومطلقة عندما $س = 5$ وقيمتها $ق(5) = -100$

للاقتران $ق(س)$ قيمة قصوى عظمى عندما $س = 6$ وقيمتها $ق(6) = -90$

أ. معتصم ريحان 00972598709519

---

2019 / اذا كان $ق(س)$ اقتراناً معرفاً في $[-1، 1]$ وكان $ق(1) = 2$ ، $\lim_{س \to 1^{-}} ق(س) = 1$

حاول أن تحل بنفسك فما العبارة الصحيحة فيما يأتي :-

أ) $ق(1)$ قيمة صغرى محلية

ب) $ق(1)$ قيمة صغرى مطلقة

ج) $ق(1)$ قيمة عظمى محلية

د) $ق(1) = صفر$

أ. معتصم ريحان متفوق أدبه لا يسمح بالغش متميز على الزوم 00972598709519



Camscanner

2021 / اذا كان $م(س) = -2ب س^3 + 6 س^2 + ك$ حيث $ب، ك \in ح$
وكان للمنحنى $م(س)$ قيمة حدى محلية وأخرى مطلقة محلية احداهما تكون عند $(س = -2)$ فأوجد: ① قيم الثابت $ب$.

② قيم الثابت $ك$ علماً بأن مجموع القيمتين العظمى والصغرى يساوي $-12$

الحل / $م'(س) = -6ب س^2 + 12 س = 0 \Leftarrow ب س^2 - 2س = 0$

$\Leftarrow س(ب س - 2) = 0 \Leftarrow$ **$س = 0$** أو **$س = \frac{2}{ب}$**

بما أنه قال في السؤال احدى القيم القصوى تساوي $(-2)$

$\therefore \frac{2}{ب} = -2 \Leftarrow -2ب = 2 \Leftarrow$ **$ب = -1$** #

أ. مقصم ريحان

* يوجد قيمة حدى صغرى محلية عندما $س = 0$
وقيمتها $م(0) =$ لـ $ك$ القيمة الصغرى




* يوجد قيمة عظمى محلية عندما $س = -2$
وقيمتها $م(-2) = -2ب(-2)^3 + 6(-2)^2 + ك = 16ب + 24 + ك$ لـ $ك$ القيمة العظمى

* بما أن مجموع القيمتين العظمى والصغرى يساوي $(-12)$

$\therefore ك + 16ب + 24 + ك = -12$

$2ك + 16ب = -12 - 24 \Leftarrow 2ك + 16ب = -36$

$\Leftarrow$ **$ك + 8ب = -18$** ①

$\Leftarrow ك + 8 \times (-1) = -18$

**$ك = -18 + 8 = -10$** #

أ. مقصم ريحان
توجيهي على 2022
تابعني على الفيس واليوتيوب

خارجي / اثبت أنه $م(س) = س^4 - 4س^3 + 30$ موجب دائماً

هامش: انه تحل بنفسك

أ. مقصم ريحان


CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

2021 دور ثاني / إذا كان $م(س)=\frac{س^2+3}{س-1}$ ، $س \neq 1$. فأوجد القيم العظمى المحلية للاقتران $م(س)$.

لاحظ أنه $س=1$ لا تنتمي للمجال

الحل $م'(س)=\frac{(س-1)(2س)-(س^2+3)(1)}{(س-1)^2}$ = صفر

أ. معتصم ريحان

$م'(س)=\frac{2س^2-2س-س^2-3}{(س-1)^2}$ = صفر $\Leftarrow$ $\frac{س^2-2س-3}{(س-1)^2}$ = صفر

نساوي البسط بصفر $\Leftarrow س^2-2س-3=0 \Leftarrow (س-3)(س+1)=0$

$\Leftarrow س=3$ أو $س=-1$

نساوي المقام بصفر $(س-1)^2=0 \Leftarrow س=1 \notin$ المجال $م(س)$

أ. معتصم ريحان




$م(-1)=-2$ عظمى محلية

$م(3)=6$ صغرى محلية

لا يوجد قيم مطلقة للاقتران $م(س)$ لأنه امتد لانهاية وطلعت عليها.

تحديد الوسطى

جد أكبر وأصغر قيمة للاقتران $م(س)=جاس+جتاس$ ، $س \in [0, 2\pi]$

$م'(س)=2(جاس)(جتاس)-جاس=0$

$م'(س)=جاس(2جتاس-1)=0$

$جاس=0$ أو $2جتاس-1=0$ صفر

$جتاس=\frac{1}{2}$

$س=0$ $\quad$ $س=\frac{\pi}{3}$ $\quad$ $س=2\pi \notin [0, 2\pi[$

$\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{180}\times 60 \in [0, 2\pi[$

| | $(0)$ | | $(\frac{\pi}{3})$ | | $(2\pi)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| جتا جا | $(0,1)$ | | $(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$ | | $(1,0)$ |
| | $(0,-1)$ | | | | |

أكبر قيمة للاقتران هي عندما $س=\frac{\pi}{3}$ وقيمتها $م(\frac{\pi}{3})=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

وأصغر قيمة للاقتران هي عندما $س=\pi$ وقيمتها $م(\pi)=-1$

يوجد قيمة صغرى عندما $س=$ صفر وقيمتها $م($صفر$)=1$




أ. معتصم ريحان


CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

2020 تجريبي شمال غزة

اذا كانت $م(س) = س(٢-س)^{٣}$ ، $س \in [-٢، ٣]$

جد مايلي ① فترات التزايد والتناقص للاقتران م(س)

② القيم القصوى المحلية مبينا نوعها

الحل $م(س)$ متصل وقابل للاشتقاق لأنه كثير حدود

$م'(س) = س \times ٣(٢-س)^{٢}(-١) + (٢-س)^{٣}$

$م'(س) = -٣س(٢-س)^{٢} + (٢-س)^{٣} = صفر$

$(٢-س)^{٢}\left(-٣س + (٢-س)\right) = صفر$

$(٢-س)^{٢}(-٤س + ٢) = صفر$

أ. مقصم ريحان

حصص خاصة مجانية لا ينقصها ميزة

إما $(٢-س)^{٢} = صفر$ أو $-٤س + ٢ = صفر$

$٢ - س = ٠$ أو $-٤س = -٢$

$س = ٢$ أو $س = \frac{١}{٢}$




م(س) متزايد $[-٢، \frac{١}{٢}]$

متناقص $[\frac{١}{٢}، ٣]$

يوجد قيمة صغرى محلية عند $س = -٢$ وقيمتها $م(-٢) = ١٢٨$ وهي مطلقة.

يوجد قيمة عظمى محلية عند $س = \frac{١}{٢}$ وقيمتها $م(\frac{١}{٢}) = \frac{٢٧}{٢}$ وهي مطلقة أيضا

يوجد قيمة صغرى محلية عند $س = ٣$ وقيمتها $م(٣) = -٣$

لاحظ عند $س = ٢$ لا يوجد قيم قصوى لأنه الاقتران لم يغير من سلوكه عندها.



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

**خارجي** / اذا كان $ه(س)$ كثير حدود معرف على $ح$ وله قيمة عظمى محلية عند $س = أ$ وقيمة صغرى محلية عند $س = ب$، وبتطبيق نظرية رول على $ه(س)$، فاثبت وجود $جـ \in ]أ، ب[$ بحيث $ه'(جـ) = صفر$

**الحل** $ه'(أ) = صفر$ لأنه عند $أ$ يوجد قيمة عظمى محلية
$ه'(ب) = صفر$ لأنه عند $ب$ يوجد قيمة صغرى محلية.

استتبع القائمة ما تعرض

الآن نطبق شروط رول الثلاثة :.

① $ه(س)$ متصل على $[أ، ب]$ لأنه كثير حدود.

② $ه(س)$ قابل للاشتقاق في $]أ، ب[$ لأنه كثير حدود.

③ $ه(أ) = ه(ب)$

∴ يوجد $جـ \in ]أ، ب[$ بحيث أنه $ه'(جـ) = صفر$

أ. معتصم ريحان
تابعنا على الفيس واليوتيوب
ملخص خاص أونه لاينه ميزة.

**خارجي** / يمثل الشكل المجاور منحنى المشتقة الأولى للاقترانه $ه$ المتصل على $[-٣، ٣]$ فجد




① النقط الحرجة للاقترانه $ه(س)$

② فترات التزايد والتناقص للاقترانه $ه(س)$

③ القيم العظمى والصغرى المحلية للاقترانه $ه(س)$

**الحل** ① من الرسم عندما $س = ٢$ أو $س = ٠$ أو $س = -٢$
المشتقة الأولى تساوي صفر

∴ النقط الحرجة هي $(٢، ه(٢))$ ، $(٠، ه(٠))$ ، $(-٢، ه(-٢))$

ومن الرسم أطراف الفترة عندما $س = ٣$ أو $س = -٣$ والمشتقة عندهم غير موجودة.

∴ النقط الحرجة بسبب انتماءهم هي $(٣، ه(٣))$ ، $(-٣، ه(-٣))$




② من خط الأعداد المجاور

$ه(س)$ متزايد $[-٢، ٠]$ و $[٢، ٣]$

$ه(س)$ متناقص $[-٣، -٢]$ ، $[٠، ٢]$

أ. معتصم ريحان

③ للاقترانه $ه(س)$ قيمة صغرى محلية عندما $س = -٣$ وقيمتها $ه(-٣)$
للاقترانه $ه(س)$ " " عظمى محلية عندما $س = صفر$ وقيمتها $ه(٠)$
للاقترانه $ه(س)$ " " صغرى محلية عندما $س = -٢$ وقيمتها $ه(-٢)$
للاقترانه $ه(س)$ " " صغرى محلية عندما $س = ٢$ وقيمتها $ه(٢)$

أ. معتصم ريحان تابعنا على الفيس واليوتيوب
0597259870951 9



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خارجي جد مجالات التقعر للأعلى وللأسفل للاقتران م(س) = ٢ جاس جتاس في [٠، ٢π]

الحل م(س) = $\frac{٣}{٢}$ × ٢ جاس جتاس ← لا متطابقة

∴ م(س) = $\frac{٣}{٢}$ × جا٢س

⇐ م'(س) = $\frac{٣}{٢}$ × جتا٢س × ٢

⇐ م'(س) = ٣ جتا٢س

⇐ م''(س) = ٣ × -جا٢س × ٢

⇐ م''(س) = -٦ جا٢س = صفر ⇐ جا٢س = صفر

٢س = صفر ⇐ س = ٠

٢س = π ⇐ س = $\frac{π}{٢}$

٢س = ٢π ⇐ س = π

مقعر للأسفل في [٠، $\frac{π}{٢}$]

مقعر للأعلى في [$\frac{π}{٢}$، π]




فرضنا المقدار ر ≠ ٠ عادي لا يساوي صفر

أ. مقصح ريحان

حصص خاصة أونلاين مميزة

00972598709519

أ. مقصح ريحان تابعنا على الفيس واليوتيوب

خارجي مهم اذا كان م(س) اقتران كثير حدود من الدرجة الثانية ويمر منحناه بنقطة الأصل ويحقق الاقتران شروط نظرية رول على الفترة [٠، ٤] اذا كانت العمق الصغرى للاقتران في هذه الفترة يساوي -٤ فجد قاعدة الاقتران م(س)

الحل م(س) = ٢س + ب س + جـ ← فرضنا الاقتران كثير حدود من الدرجة الثانية بصورة عامة

م'(س) = ٢٢س + ب = ٠

⇐ س = $\frac{-ب}{٢٢}$

قال في السؤال أنه للاقتران نهاية صغرى




م(س) يحقق رول ∴ الثلاث شروط تتحقق

ومنها م(٠) = م(٤) ← الشرط الثالث لرول

٠ = ١٦٢ + ٤ب + جـ

جـ = -١٦٢ - ٤ب

صفر = ١٦٢ + ٤ب

صفر = ٢ + ٤ب

صفر = ب(ب + ٤) ⇐ ب = ٠ مرفوضة ، ب = -٤

نرجع نعوض لنجد قيمة ٢

م($\frac{-ب}{٢٢}$) = ٢($\frac{-ب}{٢٢}$)$^{٢}$ + ب($\frac{-ب}{٢٢}$) + جـ

$\frac{١٦٢}{١٦}$ = $\frac{ب^{٢}}{١٦}$ - $\frac{ب^{٢}}{٢٢}$ = -٤ ⇐ ٢ = ١

ب$^{٢}$ = ١٦٢ ← (١)

م(س) = س$^{٢}$ - ٤س

قال في السؤال أنه م(س) يمر (٠،٠) ∴ جـ = صفر



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

حصة رقم 36
توجيهي علمي 2022
أ. مقصم ريحان

# الدرس الرابع: التقعر ونقط الانعطاف

✱ تعريف: يقال لمنحنى الاقتران م(س) أنه مقعر للأعلى في الفترة ]أ، ب[ ، إذا كان واقعاً فوق جميع مماساته في الفترة ]أ، ب[ وأنه مقعر للأسفل في الفترة ]أ، ب[ إذا كان واقعاً تحت جميع مماساته في الفترة ]أ، ب[ .




✱ اختبار التقعر باستخدام المشتقة الثانية :

إذا كان م(س) اقتراناً متصلاً في الفترة ]أ، ب[ ، وكان مَ(س) موجوداً في الفترة ]أ، ب[ فإن منحنى م(س) يكون :-

1. مقعراً للأعلى في الفترة ]أ، ب[ ، إذا كانت مَ(س) > صفر لجميع قيم س ∈ ]أ، ب[ .
2. مقعراً للأسفل في الفترة ]أ، ب[ ، إذا كانت مَ(س) < صفر لجميع قيم س ∈ ]أ، ب[ .
3. غير مقعر للأعلى أو للأسفل في الفترة ]أ، ب[ إذا كانت مَ(س) = صفر لجميع قيم س ∈ ]أ، ب[

✱ سيتم التعامل مع الفترات مفتوحة.

أ. مقصم ريحان

---

**مثال ①** ص 76: جد مجالات التقعر للأعلى وللأسفل لمنحنى الاقتران م(س) = ٣س٤ - س٣ ، س ∈ ]-٢، ٥[

**الحل**

م(س) متصل على ]-٢، ٥[ لأنه كثير حدود

مَ(س) = ٦س - ٣س٢ ⇐ مَّ(س) = ٦ - ٦س = صفر ⇐ س = ١




منحنى م(س) مقعر للأعلى في الفترة ]-٢، ١[

منحنى م(س) مقعر للأسفل في الفترة ]١، ٥[

أ. مقصم ريحان تابعني على الفيس واليوتيوب

---

**مثال ②** ص 76: جد مجالات التقعر للأعلى وللأسفل لمنحنى الاقتران م(س) = س + ١/س ، س ≠ ٠

م(س) متصل على مجاله

**الحل**

م(س) = س + ١/س ⇐ مَ(س) = ١ - ١/س٢

⇐ مَّ(س) = ٢/س٣ ≠ ٠

منحنى م(س) مقعر للأسفل في الفترة ]-∞، ٠[

منحنى م(س) مقعر للأعلى في الفترة ]٠، ∞[

أ. مقصم ريحان

تابعني على الفيس واليوتيوب

حل



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال (3) ص 76 / الحل

اثبت أن منحنى الاقتران م(س) = لو جتاس ، س ∈ ]٠ ، π/٣[ مقعر للأسفل.

م(س) متصل في ]٠ ، π/٣[ لأن الجتا في الربع الأول موجب

فبالتالي سيكون ما داخل اللوغاريتم موجب

م(س) = لو جتاس ⇐ م'(س) = −ظاس ⇐ م''(س) = −قا²س = −١/جتا²س

جتاس = ٠ ⇐ جتاس = ١ ⇐ س = ٠ ∉ ]٠ ، π/٣[

س = π/٢ ∉ ]٠ ، π/٣[




∴ معقم ريمان

م(س) مقعر للأسفل ]ص ف ، π/٣[ حيث أن ص ف لا ينتمي لمجال الاقتران فهي نهاية ولا تساوي صفر.

## تعريف

أ. معقم ريمان

(1) تسمى النقطة (جـ ، م(جـ)) نقطة انعطاف للاقتران م(س) إذا كان:

- م(س) اقتراناً متصلاً عند س = جـ
- يغير الاقتران اتجاه تقعره عند س = جـ من الأعلى إلى الأسفل أم العكس

(2) زاوية الإنعطاف: هي زاوية ميل المماس المرسوم لمنحنى م(س) عند نقطة الإنعطاف

(3) اذا كانت (جـ ، م(جـ)) نقطة انعطاف وكانت م''(جـ) = صفر فتسمى النقطة (جـ ، م(جـ)) نقطة انعطاف أفقي. أ. معقم ريمان

مثال (4) ص 77 / الحل

جد نقاط الانعطاف (إنه وجد) للاقتران م(س) = ٣ جاس جتاس ، س ∈ ]٠ ، π[

م(س) = ٣/٢ جا٢س

أ. معقم ريمان

يجد الاشارات نعوض في الأعداد من م''

م''(س) = −٣ جا٢س + ٣ جتا٢س = ٠

م''(س) = ٣ جتا٢س ، س ∈ ]٠ ، π[

م''(س) = −٦ جا٢س = صفر

جا٢س = صفر ⇐ ٢س = صفر ⇐ س = صفر ∉ ]٠ ، π[

٢س = ١٨٠ ⇐ س = ٩٠ ∈ ]٠ ، π[




أ. معقم ريمان

النقطة (π/٤ ، م(π/٤)) = (π/٤ ، صفر) نقطة إنعطاف

هل النقطة (π/٢ ، صفر) نقطة انعطاف أفقي؟!

م'(π/٢) = ٣ جتا٢ × π/٢ = ٣ × −١ = −٣ ≠ صفر ∴ (π/٢ ، صفر) ليست نقطة إنعطاف أفقي.



CamScanner

**مثال 5** ص 77 / بين أنه لا يوجد للاقترانه م(س) = $\sqrt{9-س^2}$ نقطة انطفاف في الفترة ]-٣، ٣[

**الحل** م(س) = $\sqrt{9-س^2}$ متصل في الفترة ]-٣، ٣[

م'(س) = $\frac{-2س}{2\sqrt{9-س^2}}$ ⟸ م'(س) = $\frac{-س}{\sqrt{9-س^2}}$

⟸ م''(س) = $\frac{\sqrt{9-س^2} \times -1 - (-س) \times \frac{-2س}{2\sqrt{9-س^2}}}{(\sqrt{9-س^2})^2}$

⟸ م''(س) = $\frac{-\sqrt{9-س^2} - \frac{س^2}{\sqrt{9-س^2}}}{9-س^2}$ = $\frac{\frac{-(9-س^2)-س^2}{\sqrt{9-س^2}}}{9-س^2}$

⟸ م''(س) = $\frac{-9}{\sqrt{9-س^2}} \times \frac{1}{9-س^2}$ ⟸ م''(س) = $\frac{-9}{\sqrt{(9-س^2)^3}}$ ≠ صفر

∀ س ∈ ]-٣، ٣[ ولكن م''(س) < صفر دائماً

ومنها يكون منحنى م(س) مقعراً للأسفل في ]-٣، ٣[

وبما أن م(س) لا يغير من اتجاه تقعره فلا يوجد نقاط إنطفاف للاقترانه م(س) في ]-٣، ٣[




أ. معتصم ريحان
00972598709519
حصص خاصة أونلاين وزووم.

**مثال 6** ص 78 / إذا كان م(س) = $س^4 - ٢س^3$ ، س ∈ ح فجد فترات التقعر للأعلى وللأسفل للاقترانه م(س)، ثم جد نقط وزوايا الإنطفاف إن وجدت.

**الحل** م(س) متصل لأن م'(س) = $٤س^3 - ٦س^2$ ⟸ م''(س) = $١٢س^2 - ١٢س$ = صفر

⟸ س = ٠ أو س = ١




م(س) مقعر للأعلى ]-∞، صفر[ ∪ ]١، ∞[

م(س) مقعر للأسفل ]٠، ١[

∴ (٠،٠) نقطة انطفاف لأنه عندها الاقترانه غير من سلوكه (غير من تقعره)

∴ (١،-١) نقطة انطفاف لأنه عندها الاقترانه غير من سلوكه (غير من تقعره)

**لإيجاد زوايا الانطفاف** هـ١ زاوية الانطفاف عند النقطة (٠،٠)

ظا هـ١ = م'(٠) = صفر ⟸ هـ١ = صفر

هـ٢ زاوية الانطفاف عند (١،-١) ⟸ ظا هـ٢ = م'(١) = -٢ ⟸ هـ٢ = ظا^-١(-٢)


CamScanner

مثال (7) صـ 78

عيّن مجالات التقعر للأعلى وللأسفل لمنحنى الاقتران

$$هـ(س) = \begin{cases} س^3 ، & 0 < س < 2 \\ س^2 ، & 2 < س < 4 \end{cases}$$

الحل

هـ(س) غير متصل عند س = 2 ومشتقته هـ'(2) غير موجودة.

$$هـ'(س) = \begin{cases} 3س^2 ، & 0 < س < 2 \\ 2س ، & 2 < س < 4 \end{cases} \Rightarrow هـ''(س) = \begin{cases} 6س ، & 0 < س < 2 \\ 2 ، & 2 < س < 4 \end{cases}$$

① $هـ''(س) = 0$ عندما $0 < س < 2$

$\therefore 6س = 0 \Leftarrow س = 0 \notin ]0، 2[$

② $هـ''(س) = 0$ عندما $2 < س < 4$

$\therefore 2 \neq$ صفر أبداً

منحنى هـ(س) مقعر للأعلى في $]0، 2[$ وكذلك في $]2، 4[$




أ. مقصم ريحان تابعنا على الفيس والبريستيج

مثال 8 صـ 79

الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران هـ(س) معتمداً عليه جد كلاً مما يأتي:




① فترات التزايد والتناقص للاقتران هـ(س).

② القيم القصوى المحلية للاقتران هـ(س).

③ مجالات التقعر للأعلى وللأسفل لمنحنى الاقتران هـ(س).

④ قيم س التي يكون عندها نقاط الإنعطاف (إن وجدت).

الحل نمثل إشارة هـ'(س) على خط الأعداد




① منحنى هـ(س) متزايد في $[-3، 0]$ ، $[3، \infty[$

منحنى هـ(س) متناقص في $]-\infty، -3]$ ، $[حرج، 3]$

② هـ(-3) قيمة حرجة محلية

هـ(0) قيمة عظمى محلية

هـ(3) قيمة حرجة محلية

③ هـ(س) مقعر للأعلى في $]-\infty، -1[$ ، $]1، \infty[$

ومقعر للأسفل في $]-1، 1[$

④ نقاط الانعطاف تكون عند $(س = -1)$ ، $(س = 1)$ لأنه الاقتران يغير فيها سلوكه وتقعره عندها.

أ. مقصم ريحان

مقصم خاصة أونلاين

00972598709519

حل



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(*) ملاحظة: اذا كان م(س) كثير حدود وكانت (س، م(س)) نقطة انعطاف للاقتران م(س)، فإنه م''(س) = صفر

أ. معصم ريحاني

نشاط (2) صـ 80 منهم

اذا كان م(س) كثير حدود من الدرجة الثالثة وكان منحناه يمر بالنقطة (٠، ٥) وله نقطة انعطاف أفقي عند النقطة (٢، ١) أوجد قاعدة الاقتران م(س)

الحل نفرض أن م(س) = أ س^٣ + ب س^٢ + جـ س + د ، حيث أ، ب، جـ، د ∈ ح، أ ≠ صفر

بما أن م(٠) = ٥ ∴ د = ٥ #

وبما أن (٢، ١) نقطة انعطاف أفقي فإن م(٢) = ١ ، م'(٢) = صفر ، م''(٢) = صفر

وبما أن م(٢) = ١ ⟸ ٨أ + ٤ب + ٢جـ + ٥ = ١ ⟸ ٨أ + ٤ب + ٢جـ = -٤ ... (1)

⟸ م'(س) = ٣ أ س^٢ + ٢ ب س + جـ

وبما أن م'(٢) = صفر ⟸ صفر = ١٢ أ + ٤ب + جـ ... (2)

حل معادلة (1) مع (2)

٨أ + ٤ب + ٢جـ = -٤

١٢أ + ٤ب + جـ = صفر

بالطرح

-٤أ + جـ = -٤ ... (3)

(*) حل معادلة (2) مع (3)

١٢أ + ٤ب + جـ = صفر

-٤أ + صفر + جـ = -٤

بالطرح

١٦أ + ٤ب = ٤ ... (4)

أ. معصم ريحاني

⟸ م'(س) = ٦ أ س + ٢ ب

⟸ م'(٢) = ٦ × أ × ٢ + ٢ب = صفر

١٢ أ + ٢ب = صفر ... (5)

حل معادلة (4) مع (5)

١٦ أ + ٤ب = ٤ ... (4)

١٢ أ + ٢ب = صفر ... (5) × -٢

١٦ أ + ٤ب = ٤

-٢٤ أ - ٤ب = صفر

-٨أ = ٤

أ = -١/٢ #

أرجع بالتعويض في معادلة (3) لإيجاد جـ

-٤ × -١/٢ + جـ = -٤

جـ = -٦ #

ب = ٣ #

∴ م(س) = -١/٢ س^٣ + ٣ س^٢ - ٦ س + ٥

أ. معصم ريحاني

(ص ٤٥)



CamScanner بـ حه صوتيا

## (*) اختبار المشتقة الثانية في تعيين القيم القصوى

**نظرية:** اذا كان $م(س)$ اقترانًا قابلاً للاشتقاق في فترة مفتوحة تحتوي $جـ$ وكان $م'(جـ) = صفر$ فإنه:

① $م(جـ)$ قيمة عظمى محلية، اذا كانت $م''(جـ) < صفر$

② $م(جـ)$ قيمة صغرى محلية، اذا كانت $م''(جـ) > صفر$

③ يفشل تطبيق الاختبار اذا كانت $م''(جـ) = 0$ أو $م''(جـ)$ غير موجودة.

(يعني بالعكس)

أ. معتصم رحال

---

**مثال (٩) ص٨٥** جد القيم العظمى والصغرى المحلية للاقتران $م(س) = ٣س^٤ - ٨س^٣ + ٦س^٢$ باستخدام اختبار المشتقة الثانية (إن أمكنه)

**الحل** $م(س)$ متصل وقابل للاشتقاق في ح لأنه كثير حدود

$م'(س) = 0 \Leftarrow ١٢س^٣ - ٢٤س^٢ + ١٢س = 0$

$\Leftarrow ١٢س(س^٢ - ٢س + ١) = 0 \Leftarrow ١٢س(س-١)^٢ = 0$

$\therefore س = 0$ أو $س = ١$ ⟸ أصفار المشتقة الأول

$م''(س) = ٣٦س^٢ - ٤٨س + ١٢$

$م''(0) = ١٢ > 0$ اذاً $م(0)$ = قيمة صغرى محلية

بما أن $م''(١) = 0$ ∴ يفشل اختبار المشتقة الثانية ونعود للأولى

| | صفر | | ١ | |
|---|---|---|---|---|
| إشارة $م'(س)$ | − | + | + | + |
| سلوك $م(س)$ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ |

∴ لا يوجد قيمة قصوى عند $س = ١$

لأن الاقتران لم يغير فيه سلوكه.

أ. معتصم رحال

تابعنا على الفيس بوك



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

## ⊛ حل تمارين ومسائل درس التقعر ونقط الانعطاف ص 81+82

**س1/ ص 81** عين فترات التقعر للأعلى وللأسفل لمنحنى الاقتران ق(س) في الحالات الآتية:

أ. معتصم ريحان
توضيحي على 2022

**أ** ق(س) = (س² − 3س − 4)(س + 2) ، س ∈ ح

**الحل** ق(س) = (س² − 3س − 4)(س + 2) = صفر

إما س² − 3س − 4 = صفر أو س + 2 = 0 ⟸ س = −2

(س − 4)(س + 1) = صفر

س = 4 ، س = −1

إشارة ق(س) ++ −2 −− −1 ++ 4 ++ ∞

سلوك ق(س) ∩ ∪ ∩ ∪

ق(س) مقعر للأعلى ]−∞، −1[ ، ]4، ∞[

ق(س) مقعر للأسفل ]−1، 4[

أ. معتصم ريحان

**ب** ق(س) = جاس − س ، س ∈ ]−π/2، π/2[

**الحل** ق(س) = جتاس − 1 = صفر ⟸ جتاس = 1 ⟸ س = صفر

إشارة ق(س) −−− −−− −−− π/2 صفر −π/2

سلوك ق(س) ∩ ∩

ق(س) مقعر للأسفل في ]−π/2، صفر[ ، ]0، π/2[

أ. معتصم ريحان / تابعنا على الفيس والبيوتيوب

**ج** ق(س) = 4س³ − س⁴ + س ، س ∈ ]0، 4[

**الحل** ق(س) = 12س² − 4س³ + 1 ⟸ ق(س) = 24س − 12س² = صفر

س = 0 ⟸ ∉ ]0، 4[

س = 2 ⟸ ∈ ]0، 4[

إشارة ق(س) +++ 0 +++ 2 −−− 4

سلوك ق(س) ∪ ∩

ق(س) مقعر للأعلى في ]0، 2[

ق(س) مقعر للأسفل في ]2، 4[

أ. معتصم ريحان
00972598709519
تابعنا على الفيس والبيوتيوب
صفحتنا خاصة اون لاين
Zoom



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

سؤال تابع / [5] $م(س) = (س-3)^{\frac{3}{2}}$ ، $س > 3$

الحل $م'(س) = \frac{3}{2}(س-3)^{\frac{1}{2}} \Leftarrow ق'(س) = \frac{3}{4}(س-3)^{\frac{1}{2}}$

$\Leftarrow \frac{3}{4(س-3)^{\frac{1}{2}}} \neq$ صفر




م(س) متقعر للأعلى ∀ $س \in ]3, \infty[$

أ. معتصم ريحان

---

[6] $م(س) = جا^{\frac{1}{2}}س$ ، $س \in ]0, 2\pi[$

الحل $م'(س) = \frac{1}{2}جتا^{\frac{1}{2}}س \Leftarrow ق'(س) = -\frac{1}{4}جا^{\frac{1}{2}}س = 0 \Leftarrow جا^{\frac{1}{2}}س =$ صفر

$\therefore$ إما $\frac{1}{2}س =$ صفر $\Leftarrow س = 0 \notin ]0, 2\pi[$

أو $\frac{1}{2}س = \pi \Leftarrow س = 2\pi \notin ]0, 2\pi[$




م(س) متقعر للأسفل ∀ $س \in ]0, 2\pi[$

أ. معتصم ريحان / حصص خاصة أونلاين

---

[7] $م(س) = ق^{\frac{1}{2}}جتاس$ ، $س \in ]0, 2\pi[$

الحل $م'(س) = ق^{\frac{1}{2}} \times -جاس + جتاس \times ق^{\frac{1}{2}}$

$ق'(س) = ق^{\frac{1}{2}} \times -جتاس + -جاس \times ق^{\frac{1}{2}} \times جتاس + ق^{\frac{1}{2}} \times -جاس =$ صفر

$ق'(س) = -2ق^{\frac{1}{2}}جاس =$ صفر $\Leftarrow$ $ق^{\frac{1}{2}}$ جاس = صفر $\Leftarrow$ جاس = صفر

$ق^{\frac{1}{2}}$ لا يساوي صفر

$\therefore س = \pi \in ]0, 2\pi[$

$س =$ صفر $\notin ]0, 2\pi[$

م(س) متقعر للأسفل في $]0, \pi[$

م(س) متقعر للأعلى في $]\pi, 2\pi[$

أ. معتصم ريحان حصص أونلاين مميزة.

00972598709519

---

[8] $م(س) = \begin{cases} [\frac{1}{2}س - 1] & ، 1 \leq س \leq 3 \\ س^3 & ، 3 < س < 5 \end{cases}$

الحل نعيد تعريف الصحيح

$[\frac{1}{2}س - 1] = \begin{cases} -1 & ، 1 \leq س < 3 \\ صفر & ، س = 3 \\ 1 & ، 3 < س < 6 \end{cases}$

$\therefore م(س) = \begin{cases} -1 & ، 1 \leq س < 3 \\ صفر & ، س = 3 \\ س^3 & ، 3 < س < 5 \end{cases}$

طول الدرجة $= \frac{1}{|\frac{1}{3}|} = 3$

الفترة المطلوبة

حذف الفترة المطلوبة

مع اضافة سطر جديد لادخال رقم 3 مثل الفترة المطلوبة

اذا أردت أنه تضيف سيادين لازم تفتح سطر جديد

صفر



CamScanner

تابع حل سؤال فرعي [أ]

ص 81

$$م(س)=\begin{cases} -1 & ، 1<س<3 \\ \text{صفر} & ، س=3 \\ س^3 & ، 3<س<5 \end{cases}$$

لاحظ أنه م(س) غير متصل عند س=3

∴ قَ(3) = غ.م

$$قَ(س)=\begin{cases} \text{صفر} & ، 1<س<2 \\ 3س^2 & ، 3<س<5 \end{cases} \Rightarrow قَ(س)=\begin{cases} \text{صفر} & ، 1<س<3 \\ 6س & ، 3<س<5 \end{cases}$$

قَ(س) = 6س = صفر ⟸ س = صفر ∉ ]3، 5[

م(س) متزايد للأعلى ]3، 5[

م(س) ثابت ]1، 3[




أ. معتصم رحيمات / دبلوم العين والبوتوكس

ص 81 ج 2 حدد نقاط الإنعطاف لمنحنى الاقتران م(س) في الحالات الآتية (إنه وجدت):

أ. معتصم رحيمات
00972598709519

(أ) م(س) = س³ + س

الحل م(س) متصل على ح لأنه كثير حدود.

قَ(س) = 3س² + 1 ⟸ قَ(س) = 6س = صفر ⟸ س = صفر

∴ (صفر، م(صفر)) = (صفر، صفر) نقطة انعطاف

لأنه تحقق الشروط ① م(س) متصل عند س = صفر
② قَ(صفر) = صفر
③ الاقتران يغير فيه سلوكه عندها.




أ. معتصم رحيمات
حصص خاصة أونلاين

(ب) م(س) = جتاس ، س ∈ ]صفر، 2π[

الحل م(س) متصل على [صفر، 2π]

قَ(س) = −جاس ⟸ قَ(س) = صفر ⟸ −جتاس = صفر ⟸ جتاس = صفر

س = π/2 ∈ ]صفر، 2π[

س = 3π/2 ∈ ]صفر، 2π[

∴ (π/2، م(π/2)) = (π/2، صفر) نقطة انعطاف لتحقق الشروط السابقة

∴ (3π/2، م(3π/2)) = (3π/2، صفر) نقطة انعطاف م(س) متصل عند س = π/2، 3π/2

أ. معتصم رحيمات
00972598709519
حصص أونلاين

قَ(π/2) = صفر

قَ(3π/2) = صفر

الاقتران يغير فيه سلوكه عندهما

ص 9



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أ. معتصم رحيل
00972598709519
حصص خاصة أونلاين
مميزة زووم

ج) $م(س) = \sqrt[3]{٥ - س}$

الحل/ $م(س) = (٥ - س)^{\frac{1}{3}}$ ⟸ $م(س)$ متصل ∀ ح

⟸ $م'(س) = \frac{1}{3}(٥ - س)^{-\frac{2}{3}} \times -١$

⟸ $م''(س) = -\frac{2}{9}(٥ - س)^{-\frac{5}{3}} = \frac{-2}{9\sqrt[3]{(٥-س)^5}} \neq$ صفر ∀ س ∈ ح

$م''(س)$ غ.م عند أصفار المقام ⟸ $٥ - س = ٠$ ⟸ $س = ٥$ ← جذر مقام

∴ $(٥، م(٥)) = (٥، ٠)$ نقطة انعطاف

لأنها تحقق الثلاث شروط.

| | | |
|---|---|---|
| إشارة $م''(س)$ | + + + | − − − |
| سلوك $م(س)$ | ∪ | ∩ |

٥

أ. معتصم رحيل تابعني على العنب واليوتيوب

* تابعني على قناتي على اليوتيوب وصفحتي الرسمية على الفيسبوك باسم (( معتصم رحيل رياضيات توجيهي ))
* تابعني على مجموعات الواتس والتليجرام .
* للتسجيل معي في الدروس الخصوصية أونلاين على الزووم راسلني واتس 00972598709519
* كل التلخيص موجود بالكامل مع شكل فيديوهات مسجلة اذا أردتها راسلني واتس (( الفيديوهات غير مجانية )).
* تلخيص كل وحدة موجود بشكل منفصل مع شكل ملف pdf التلخيص عامل ومجاني لكل طلاب فلسطين

وما تنسونا من دعواتكم الطيبة

أ. معتصم بسام رحيل - فلسطين - غزة .


ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

## ⑯ تابع حل أسئلة تمارين ومسائل درسا التقعر ونقط الانعطاف ص 81+82

**س3/ ص82** جد القيم القصوى المحلية لكل من الاقترانات الآتية وحدد نوع كل منها باستخدام اختبار المشتقة الثانية (إن أمكن ذلك طبيعيا) وفي حالة عدم إمكانية ذلك طبيعيا استخدم اختبار المشتقة الأولى:

**P** $م(س) = س^3 + 6س^2$ م(س) متصل على ح لأن ك.ث ح.

**الحل** $م'(س) = 3س^2 + 12س \Leftarrow م'(س) = 0 \Leftarrow 3س^2 + 12س = 0$

$س = 0$ $س = -4$

الآن نستخدم اختبار المشتقة الثانية

نجد $م''(س) = 6س + 12 = ص$

$م''(0) = 6 \times 0 + 12 = 12 > 0$ ص

$\therefore$ عند $س = 0$ يوجد صغرى محلية

$م''(-4) = 6 \times -4 + 12 = -12 < 0$ ص

$\therefore$ عند $س = -4$ يوجد عظمى محلية.

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس واليوتيوب
وحصص خاصة أونلاين مميزة

**ب** $م(س) = |س + 6|$ أوجد بتغيير تعريف المطلق.

**الحل** $م(س) = \begin{cases} س + 6 & ، س \geq -6 \\ -س - 6 & ، س < -6 \end{cases}$

م(س) متصل على ح

$س + 6 = 0 \Leftarrow س = -6$

| | $-6$ | |
|---|---|---|
| $(س+6)$ | − | + |
| $-6(س+6)$ | + | − |

نجد $م'(س) = \begin{cases} 1 & ، س > -6 \\ -1 & ، س < -6 \end{cases}$

$م'(-6) \Leftarrow$ غ.م

$\therefore م'(-6)$ = غ.م

يفشل اختبار المشتقة الثانية ونعود لاختبار المشتقة الأولى

| | $-6$ | |
|---|---|---|
| إشارة $م'(س)$ | − | + |
| سلوك $م(س)$ | ↘ | ↗ |

$\therefore (-6، م(-6)) = (-6، 0)$ نقطة صغرى محلية وحيدة ومطلقة.

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس واليوتيوب
وحصص خاصة أونلاين مميزة.
00972598709519


ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

س٦ / ص82 / إذا كان للاقتران ق(س) = $ps^3 + s^2$ نقطة إنعطاف عند س = -١ ، فجد قيمة/قيم الثابت p .

الحل / بما أن للاقتران ق(س) نقطة إنعطاف عند س = -١ يعني ق''(-١) = صفر

$\Leftarrow$ ق(س) = $ps^3 + s^2$ $\Leftarrow$ ق'(س) = $3ps^2 + 2s$

الآن عوض $\Leftarrow$ ق''(-١) = $6p + 2(-1)$

$\Leftarrow$ صفر = $6p - 2$ $\Leftarrow$ $p = 3$ #

أ. معتصم ريحان

---

س٥ / ص82 / الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران ق'(س) إذا علمت أن ق(٠) = ق(٦) = صفر ، جد كلاً مما يأتي :-




(أ) فترات التقعر ونقاط الانعطاف لمنحنى الاقتران ق(س)

(ب) القيم القصوى المحلية للاقتران ق(س)

(ج) فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران ق(س)

الحل / (*) لاحظ من الشكل أن ق'(٣) = صفر لأنها تقطع محور السينات

(*) الآن نرسم خط الأعداد ونضع عليه شكل التقعرات للأعلى وللأسفل

(*) من الشكل الجزء الموجود لما يسار س = ٢ موجب

والجزء الموجود لما يسار س = ٣ سالب

أ. معتصم ريحان / حصص خاصة أونلاين

حل (أ) ق(س) مقعر للأعلى ن ]٣ ، ∞[ ومقعر للأسفل ن ]-∞ ، ٣[

النقطة (٣ ، ق(٣)) هي نقطة انعطاف لأنها حققت الشروط الثلاثة

متصل عند س = ٣ ، ق'(٣) = ٠ ، يغير الاقتران منه سلوكه عندها

حل (ب) لاحظ من السؤال أنه معطينا ق'(٠) = ق(٦) = صفر $\Leftarrow$ س = ٠ ، س = ٦

من الشكل المعطى ق''(٦) = > صفر ، ق''(٠) < صفر




ق(٠) = عظمى محلية حل آخر لـ (ب)

ق(٦) = صغرى محلية لا

(*) ويمكن إيجاد القيم القصوى من اختبار المشتقة الثانية كذا !

ق''(٠) = سالب $\Leftarrow$ من رسمة الشكل المعطى في السؤال

ق''(٦) = موجب

∴ عند س = ٠ عظمى محلية

وعند س = ٦ صغرى محلية

المطلوب (ج) ق(س) تزايد ]-∞ ، صفر] ، [٦ ، ∞[

ق(س) تناقص [صفر ، ٦]

أ. معتصم ريحان / تابعين على العين واليوتيوب





ه صوتيا بـ CamScanner

أ. مقصم ريحان / تابعني على الفيس واليوتيوب

مهم جداً ص 82 س 6

إذا كان $ق(س)$ اقتران كثير حدود من الدرجة الثالثة يمر منحناه بالنقطة $(0,1)$ وله نقطة انعطاف عند $س = 2$ حيث إن معادلة المماس عند نقطة الانعطاف هي $3س + ص = 7$ ، فجد قاعدة الاقتران $ق(س)$

الحل / نفرض أن الاقتران $ق(س) = أ س^3 + ب س^2 + جـ س + د$ ... (1)

(*) لاحظ أنه قال في السؤال أن الاقتران $ق(س)$ يمر بالنقطة $(0,1)$ يعني $ق(0) = 1$

الآن نعوض في المعادلة رقم (1) ينتج التالي ← $د = 1$ ... (2)

(*) ولاحظ أيضاً أنه قال في السؤال أنه للاقتران نقطة انعطاف عند معادلة المماس $3س + ص = 7$ عندما $س = 2$ ، إذاً نعوض عندما $س = 2$ بمعادلة المماس

$3(2) + ص = 7 \Leftarrow ص = 1$ ∴ نستنتج أن $ق(2) = 1$ ... (3) هذه تمثل نقطة الانعطاف

الآن نعوض المعطى $ق(2) = 1$ في معادلة رقم (1) ينتج $8أ + 4ب + 2جـ + د = 1$ ... (3)

أ. مقصم ريحان

الآن سنحل معادلة (2) مع (3) بالحذف بالطرح

$أ + ب + جـ + د = 0$ ... (2)

$8أ + 4ب + 2جـ + د = 1$ ... (3)

$-7أ - 3ب - جـ = -1$ ... (4) معادلة

الحل النهائي

$ق(س) = -س^3 + 6س^2 - 10س + 10$

أ. مقصم ريحان

(*) الآن سنجد ميل المماس عن طريق معادلة المماس $3س + ص = 7$

$م = \frac{-معامل\ س}{معامل\ ص} \Leftarrow م = \frac{-3}{1} = -3$ ← هذا هو ميل المماس عندما $س = 2$

∴ $ق'(2) = -3$

أ. مقصم ريحان

(*) الآن نشتق الاقتران $ق(س)$ ونعوض بـ (2) ونساوي بـ (-3)

$ق(س) = 3أ س^2 + 2ب س + جـ$

$ق'(2) = 12أ + 4ب + جـ = -3$ ... (5) معادلة

هنا خصص خاصة أونة لأنه Zoom

الآن سنحل معادلة (4) مع (5) بالحذف

$-7أ - 3ب - جـ = 4$

$12أ + 4ب + جـ = -3$ أجمع

$5أ + ب = -1$ ... (6)

نحل معادلة (6) مع (7) بالحذف ينتج

$5أ + ب = -1$

$6أ + ب = صفر$ أطرح

$أ = -1$ ← أرجع عوض في كل المعادلات تجد باقي الأجوبة

(*) بما أن الاقتران $ق(س)$ نقطة انعطاف عندما $س = 2$ إذاً $ق'(2) = صفر$

$ق'(س) = 6أ س + 2ب$

$ق'(2) = 12أ + 2ب = صفر$

$6أ + ب = صفر$ ... (7)

$ب = 6$

$جـ = -10$

$د = 10$

∴ $ق(س) = -س^3 + 6س^2 - 10س + 10$

ص 3



حوله صوتيا بـ CamScanner

أ. معتصم ريحان

س 7 ص 82 | إذا كان للاقترانة كثير الحدود $م(س) = س^4 - 4س^3 + ك(س)$ نقطة إنعطاف أفقي هما $(1، 2)$ وكان $ع(س) = ك^2(س)$ أحسب $ع''(1)$

الحل بما أنه قال في السؤال أنه النقطة $(1، 2)$ هي نقطة انعطاف أفقي

إذاً أستنتج الآتي $م(1) = 2$ ، $م'(1) = صفر$ ، $م''(1) = صفر$

الآن سنجد مشتقة الاقترانة $ع(س)$

$\Leftarrow ع'(س) = 2(ك(س)) \times ك'(س) \times 1$ ← استخدمنا مشتقة القوس

$\Leftarrow ع''(س) = 2 \times (ك'(س) \times ك'(س) + ك(س) \times ك''(س))$ خلينا رقم ② لحالها في الخارج واستخدمنا قاعدة الضرب

$\Leftarrow ع''(س) = 2ك(س) \times ك''(س) + 2(ك'(س))^2$

المطلوب $ع''(1) = 2ك(1) \times ك''(1) + 2(ك'(1))^2$ ——— ①

أ. معتصم ريحان

* الآن سنذهب في رحلة لإيجاد قيمة $ك(1)$ و $ك'(1)$ و $ك''(1)$ ثم نعود لمعادلة ① ونعوض فيها

عوض النقطة $(1، 2)$ في الاقترانة $م(س)$

$\Leftarrow 2 = (1)^4 - 4(1)^3 + ك(1) \Leftarrow ك(1) = 5$ #.

* الآن سنجد المشتقة الأولى ونعوض عندما $س = 1$ ونساوي بصفر لأن $م'(1) = صفر$

$م'(س) = 4س^3 - 12س^2 + ك'(س)$

$صفر = 4(1)^3 - 12(1)^2 + ك'(1) \Leftarrow ك'(1) = 8$ #.

أ. معتصم ريحان

* الآن سنجد المشتقة الثانية ونعوض عندما $س = 1$ ونساويها بصفر أ. معتصم ريحان

$م''(س) = 12س^2 - 24س + ك''(س)$

$صفر = 12(1)^2 - 24(1) + ك''(1) \Leftarrow ك''(1) = 12$ #.

* الآن سنعود إلى معادلة رقم ① حبيبتنا ونعوض فيها لأنها هي المطلوب.

$ع''(1) = 2 \times 5 \times 12 + 2(8)^2$

$ع''(1) = 120 + 128$

$\therefore ع''(1) = 248$

وهو المطلوب

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس واليوتيوب
مجموعة خاصة أونلاين Zoom
00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

س 8 ص 82 / اذا كان م(س) اقتراناً متصلاً في الفترة [-٣، ٢] ويحقق الشروط الآتية:

م(٠) = صفر ، م(١) = صفر ، م(-٢) = صفر ، م'(س) > صفر

عندما س > صفر ، م'(س) < صفر عندما س < صفر

أ. معتصم ريحان
تابعونا على الفيس واليوتيوب

اعتمد على هذه المعلومات للإجابة عن الأسئلة الآتية:

(أ) حدد فترات التزايد والتناقص لمختلف الاقتران م(س).

(ب) ما قيمة/قيم س التي يكون للاقتران م(س) عندها قيم قصوى؟؟ وما نوعي كل منها؟؟

(ج) ما قيمة/قيم س التي يكون للاقتران م(س) عندها نقطة انعطاف؟؟

الحل / النقاط الحرجة من معطيات السؤال هي: عندما س = {-٣، ٢} لأنها نقاط طرفية
عندما س = {١، -٢} لأنه المشتقة عندها تساوي صفر

أ. معتصم ريحان

المطلوب (ب)

لو لاحظنا من اختبار المشتقة الثانية ⟸ م'(١) < صفر ومنها م(١) قيمة عظمى محلية.

وأيضاً ⟸ م'(-٢) > صفر ومنها م(-٢) قيمة صغرى محلية.

(*) لاحظ لو استخدمنا اختبار المشتقة الثانية في أطراف الفترة [-٣، ٢] سيفشل لأنه اختبار المشتقة الثانية سيفشل عندما م'(س) = صفر

(*) من معطيات السؤال

المطلوب (ب)

الاقتران م(س) متزايد [-٣، -٢] ، [١، ٢]

الاقتران م(س) متناقص [-٢، ١]

أ. معتصم ريحان
معطى خاصة أونه لاينه مميزة
00972598709519

المطلوب (ج)

لاحظ معطى السؤال أنه م(٠) = صفر

وأيضاً معطى أنه م'(س) > صفر عندما س < صفر ⟸ نستنتج منهم أنه الاقتران يغير سلوكه عند النقطة (٠، م(٠)) = (٠، ٠) نقطة انعطاف




أ. معتصم ريحان

∴ النقطة (٠، م(٠)) = (٠، ٠) نقطة انعطاف

لأنه الاقتران عند هذه النقطة يحقق الشروط الثلاثة:

- متصل عندما س = صفر
- م'(٠) = صفر
- الاقتران غير سلوكه شكل تقعره عندما س = صفر



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

# ⊛ حل أسئلة امتحانات سابقة لدرس التقعر ونقط الانعطاف ⊛

**2007 دورة أولى** | يقع الاقتران فوق جميع مماساته عندما يكون الاقتران

(أ) متقعراً للأعلى (ب) متقعراً للأسفل (ج) متزايداً (د) متناقصاً .

أ. معتصم ريحان

**2007 دورة ثانية** | اذا كان $م(س)$ اقتران كثير حدود من الدرجة الثانية فإن الاقتران $م$

(أ) لا توجد له نقطة انعطاف (ب) توجد له نقطة انعطاف واحدة فقط

(ج) يوجد له نقطتي إنعطاف (د) توجد له نقطة انعطاف واحدة على الأقل

الحل $م(س) = أ س^2 + ب س + ج$ ← الشكل العام لكثير الحدود من الدرجة الثانية

$م'(س) = 2أ س + ب$

$م''(س) = 2أ = صفر$ ← لا يوجد قيم لسينه اذاً لا يوجد للاقتران $م$ نقط انعطاف

أ. معتصم ريحان

**2007** | اذا كان $م(س) = س|س|$ فإن

(أ) $م'(0)$ غير موجودة (ب) $م(0)$ قيمة عظمى

(ج) $م(0)$ قيمة صغرى محلية (د) $(0, م(0))$ نقطة إنعطاف .

الحل $|س| = \begin{cases} س ، س \geq صفر \\ -س ، س < صفر \end{cases}$

$\Leftarrow م(س) = \begin{cases} س^2 ، س \geq صفر \\ -س^2 ، س < صفر \end{cases}$

$\Leftarrow م'(س) = \begin{cases} 2س ، س > صفر \\ -2س ، س < صفر \end{cases}$

$م'(0^+) = م'(0^-)$

$صفر = صفر$

$م'(0)$ = صفر

$\Leftarrow م''(س) = \begin{cases} 2 ، س > صفر \\ -2 ، س < صفر \end{cases}$

$م''(0^+) = م''(0^-)$

$2 \neq -2$

$م''(0)$ = غ.م




اذاً عند $(0, م(0))$ نقطة انعطاف

أ. معتصم ريحان

تابعنا على الفيس واليوتيوب

أ. معتصم ريحان

مرحبا خاصة أونلاين Zoom

00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2006 إكمال / اذا كانت النقطة (١، ٢) نقطة إنعطاف لمنحنى الاقتران مه(س) وكان قـ(س) = ٤س$^{٣}$ - ل س$^{٢}$ حيث ل ثابت فإن ل تساوي
(أ) ٤ (ب) ٦ (ج) ١٢ (د) ٢٤

الحل / (١، ٢) نقطة انعطاف ∴ منها قـ(١) = صفر وأيضاً مه(١) = ٢

قـ(س) = ١٢س - ٢ل س
قـ(١) = ١٢ (١) - ٢ل (١)
صفر = ١٢ - ٢ل ⇐ ل = ٦

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس والبوتيوب
00972598709519

2008 شتوي / اذا كان مه(س) معرفاً على [-١، ١] ، قـ(س) = موجودة في ]-١، ١[
ويوجد عند س = صفر نقطة انعطاف فإنه إحدى العبارات التالية صحيحة دائماً
(أ) منحنى مه مقعر للأعلى في [-١، ٠] ومقعر للأسفل في [٠، ١] (ب) مه له نقطة حرجة في ]-١، ١[
(ج) قـ له نقطة حرجة في ]-١، ١[ (د) قـ له نقطة حرجة في ]-١، ١[

الحل / بما أنه قال في السؤال يوجد نقطة انعطاف عندما س = صفر ∴ قـ(٠) = صفر
ومنها نستنتج أنه قـ له نقطة حرجة في ]-١، ١[ ⇐ زود شرطة

أ. معتصم ريحان

2010 شتوي / اذا كانت للاقترانة مه(س) قيمة عظمى واحدة وكانت قـ(١) = صفر ، قـ(١) = -٣
وكان مه(س) يمر بالنقطة (١، -٢) فإن تلك القيمة العظمى هي:
(أ) -٣ (ب) -٢ (ج) صفر (د) ١

سؤال عنه القيمة ولا سؤال عند س

الحل / معطيات السؤال أنه قـ(١) = -٣ < صفر
∴ عند س = ١ يوجد قيمة عظمى محلية
ولكنه يريد ايجاد قيمتها ، وهذا السؤال معطانا النقطة (١، -٢)
∴ القيمة العظمى عند س = ١ وقيمتها (-٢) #

أ. معتصم ريحان

2011 شتوي / اذا كانت قـ(-١) = قـ(٣) = صفر وكانت قـ(س) > صفر في الفترة ]-٢، ٢[ فإن
(أ) مه(-١) عظمى محلية (ب) مه(-١) هو محلي (ج) مه(٣) عظمى محلية (د) مه(٣) هو محلي.

الحل / معطيات السؤال قـ(س) > صفر ∴ حسب اختبار المشتقة الثانية اذاً لازم يكون هو محلي
س = ٣ تقع خارج الفترة ]-٢، ٢[
بما أنه محلي قـ(-١) = صفر وأيضاً قـ(-١) > صفر
∴ عند س = -١ لها هو محلي محلية
∴ مه(-١) هو محلي محلية

أ. معتصم ريحان
معتصم خاطر الله الأحد

أ. معتصم ريحان


CamScanner

2011 حـ / إذا كان للاقتران $م(س) = أ س^3 + س^2 + س$ نقطة انعطاف عند $س = -1$

فإن قيمة $أ$ تساوي (أ) $-2$ (ب) $\frac{3}{2}$ (جـ) $\frac{3}{2}$ (د) $3$ ✓

الحل $م'(س) = 3أ س^2 + 2س + 1$

$م''(س) = 6أ س + 2$

$م''(-1) = 0$ (اختبار المشتقة الثانية)

$\Leftarrow 0 = -6أ + 2$

$\Leftarrow 6أ = 2$

$\Leftarrow أ = 3$ ✓

أ. معتصم رحال

---

2016 حـ / إذا كان $م(س)$ متصلاً على $[1, 3]$ وكانت $م'(س) < 0$ لكل $س \in ]1, 3[$، وكان $م(س)$ له ثلاث نقاط حرجة فقط في $[1, 3]$ وكان $م(2) = 0$ فإن

(أ) $م(2.5) > 0$ (ب) $م(2.5) > م(2)$

(جـ) $م(2.5) = م(2)$ (د) $م(2.5) < م(2)$ ✓

أ. معتصم رحال

تابعني على الفيس والبوتيوب

الحل النقطة الحرجة للاقتران $م(س)$ هي عند $س = 1$، $س = 3$ لأنهم أطراف فترة.

وأيضاً هناك نقطة حرجة عند $س = 2$ لأنه قال في السؤال $م'(2) = 0$




معطينا في السؤال $م'(س) < 0$ لكل $س$ بحيث $س \in ]1, 3[$

$\therefore$ عند $س = 2$ يوجد قيمة عظمى محلية

من الرسمة نلاحظ أنه $م(2.5) < م(2)$ لأنه $م(2)$ هي العظمى المطلقة من الشكل

أ. معتصم رحال

---

2016 حـ / إذا كان الشكل المجاور يمثل منحنى $م'(س)$ فإن نقطة انعطاف منحنى $م(س)$ هي

(أ) $(-2, 1)$ (ب) $(1, م(1))$ ✓ (جـ) $(0, 3)$ (د) $(-1, 0)$




أ. معتصم رحال



أ. معتصم رحال

إذا كان الاقتران طالع إذاً $م' > 0$

" " " م نازل إذاً $م' < 0$

" " " م' طالع إذاً $م'' > 0$.

" " " م' نازل إذاً $م'' < 0$.



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2016 / الكمال

النقطة (١،٠) هي نقطة انطفاف لإحدى الاقترانات الآتية:

(أ) $م(س) = س^٤ + ١$ (ب) $ه(س) = ١ - س^٤$ (جـ) $و(س) = س^٤ + ١$ (د) $ك(س) = س^٣ + ١$

الحل

$م(٠) = ٠^٤ + ١$ | $ه(٠) = ١ - ٠^٤$ | $و(٠) = ٠^٤ + ١$ | $ك(٠) = ٠^٣ + ١$

$م(٠) = ١$ | $ه(٠) = ١$ | $و(٠) = ١$ | $ك(٠) = ١$

$مَ(س) = ٤س^٣$ | $هَ(س) = -٤س^٣$ | $وَ(س) = ٤س^٣$ | $كَ(س) = ٣س^٢$

$مَ(س) = ٤س^٣$ | $هَ(س) = -١٢س^٢$ | $وَ(س) = ١٢س^٢$ | $كَ(س) = ٦س$

$مَ(٠) = ٤(٠)^٣$ | $هَ(٠) = -١٢(٠)^٢$ | $وَ(٠) = ١٢(٠)^٢$ | $كَ(٠) = ٦(٠)$

$مَ(٠) = ٠$ | $هَ(٠) = ٠$ | $وَ(٠) = ٠$ | $كَ(٠) = ٠$

(-) ٠ (+) | (+) ٠ (-) | (-) ٠ (+) | (-) ٠ (+)

$\cap$ هـ $\cup$ | $\cup$ هـ $\cap$ | $\cap$ هـ $\cup$ | $\cup$ هـ $\cap$

× | × | تغير عند ٠ السلوك

أ. مقصم ريحاني

تابعنا على الفيس واليوتيوب

حصص خاصة أونلاين

---

2015 / 2020 / دور ثاني

إذا كان لمنحنى الاقتران $م(س) = س^٣ + م س^٢ - ٩س$ نقطة انطفاف عند $س = ١$ فإن ميل المماس الثابت م يساوي:

(أ) ٣ (ب) ٦ (جـ) -٣ (د) -٤

الحل

$مَ(س) = ٣س^٢ - ٢م س - ٩$

$مَ(١) = هـ$ ← مستبعدها

$هـ = ٦(١) - ٢م$

$هـ = ٦ - ٢م$

$٠ = ٦ - ٢م \Leftarrow م = ٣$ #

أ. مقصم ريحاني

---

2015

الشكل المجاور يمثل منحنى $مَ(س)$، إذا مجموعة حل المتباينة $مَ(س) > هـ(س)$ هي

(أ) $]١،٣[$ (ب) $]٢،\infty[$ (جـ) $]-\infty،٢[$ (د) $]-\infty،١[ \cup ]٣،\infty[$







$]-\infty، ٢[$

أ. مقصم ريحاني

تابعنا على الفيس واليوتيوب

حصص خاصة أونلاين مميزة

---

2016

بالاعتماد على الشكل المجاور والذي يمثل منحنى $م(س)$ فإن النقطة التي يكون عندها $مَ$، $وَ$ موجبتين هي:

(أ) م (ب) ن (جـ) هـ (د) و

الحل

م نقطة تحول للتقعر

ن نقطة تحول للتزايد والتناقص

و نقطة تحول للتقعر

لاظ عند هـ $مَ$ موجبة

$وَ$ موجبة




أ. مقصم ريحاني

00972598709519



تم تحويه صوتيا بـ CamScanner

خاص جدا / اذا كانه $م(س) = س^{٣}(٢-س)$ $س \in [-١، ٤]$ نجد مجالات التزايد والتناقص للاقترانه $م(س)$ والقيم القصوى المحلية للاقترانه $م(س)$ وحدد المطلقة منها وجد مجالات التقعر للاعلى للمنحنى $م(س)$

قاعدة الضرب

الحل $م'(س) = (س) \times (٣(٢-س)^{٢} \times (-١)) + ((٢-س)^{٣} \times (١))$

$م'(س) = -٣س(٢-س)^{٢} + (٢-س)^{٣}$ سنأخذ $(٢-س)^{٢}$ عامل مشترك

$م'(س) = (٢-س)^{٢}(-٣س + (٢-س))$

$م'(س) = (٢-س)^{٢}(٢-٤س) = ص$

$ص = ٢-٤س$

$٢-س = ٠$ أو $٤س = ١$

$س = ٢$ $\Leftarrow$ $س = \frac{١}{٤} \in ]-١، ٤[$

$\therefore$ $م'(س)$ تتزايد $[-١، \frac{١}{٤}]$

$م(س)$ تتناقص $[\frac{١}{٤}، ٢]$ ، $[٢، ٤]$

$م(-١)$ صغرى محلية $= ٨١$

$م(\frac{١}{٤})$ عظمى محلية $= ٥$ ومطلقة.

$م(٤)$ صغرى محلية $= -٣٢$ ومطلقة

(*) الآن نجد $م''(س)$ ونساويها بصفر

$م''(س) = ((٢-س)^{٢}) \times (-٤) + (٢-٤س) \times (٢(٢-س) \times (-١)) = ص$

قاعدة الضرب

$م''(س) = -٤(٢-س)^{٢} + (٢-٤س) \times (-٢(٢-س)) = ص$

أخذنا $(٢-س)$ عامل مشترك

$م''(س) = (٢-س)(-٤(٢-س) + (-٢)(٢-٤س)) = ص$

$م''(س) = (٢-س)(-١٢ + ١٢س) = ص$

اما $س = ٢$ أو $س = ١$

$م''(س)$ سلوك $م(س)$

$م(س)$ مقعر للأعلى $]١، ٢[$

$م(س)$ مقعر للأسفل $]-١، ١[$ و $]٢، ٤[$

أ. مقصم ريحان
تابعين لنا الفيس واليوتيوب
مقصم خاصة أونه لاينيم ميزة
٠٥٩٧٢٥٩٨٧٠٩٥١٩



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

بداية صفحة رقم 38

2016 اذا كانه ق(س) = ½ س + جتاس معرفاً على [0، 2π] فإنه فترة ق(س) يكون

أ) [-π، π] ب) [0، π/2] ج) [π/2، π] د) [0، π/2] مقعر للأسفل في:

الحل ق(س) = ½ - جاس

ق''(س) = - جتاس = صفر

جتاس = صفر ⇐ س = π/2 ∈ ]0، 2π[

س = 3π/2 ∉ ]0، 2π[ مرفوضة

إشارة ق''(س)

---- +++++

صفر π/2 π

سلوك ق(س) ∩ ∪

أ. معتصم ريحان / تابعني في الفيس واليوتيوب

2016 اذا كانه ق كثير حدود وكانه الشكل المجاور يبين إشارة ق''(س) وكانت ق'(3) = صفر

فإن العبارة الصحيحة دائماً هي:

+++ صفر --- ⟵

4

أ) ق''(3) = صفر ب) ق(4) = صفر ج) ق'(3) صفر حرج محلي د) ق(3) قيمة عظمى محلية.

الحل نعطي أنه ق'(3) = صفر ومنه الرسم ق''(3) < صفر

∴ ق(3) قيمة حرج محلية

أ. معتصم ريحان

2017 اذا كانه ق(س) = جتاس معرفاً على [0، π/2] فإن قيمة س التي يكون

عندها نقطة انعطاف ص تساوي:

صفر

--- +++

π/4

أ) π/2 ب) π/4 ج) π/3 د) π/6

الحل ق(س) = (2 جتاس × -جاس) ← متطابقة ضعف الزاوية

ق''(س) = - جا2س

ق''(س) = -2 جا2س = صفر ⇐ جتا2س = 0

2س = π/2 ⇐ س = π/4

2س = 3π/2 ⇐ س = 3π/4 مرفوضة

أ. معتصم ريحان

2017 الشكل المجاور هو ق'(س) على [-3، 5] فإنه ق(س) يكون

أ) مقعر للأسفل في [0، 5] ب) مقعر للأسفل في [-3، 3]

ج) متناقص [0، 5] د) متناقص [0، 3]

ق'(س)

4

-3 3 5

إشارة ق'(س)

+++ صفر --- صفر ---

-3 3 5

سلوك ق(س)

قيمة الرسم

إصلاح

أ. معتصم ريحان

تابعني في الفيس واليوتيوب

إشارة ق''(س)

---- صفر ----

5 -3

سلوك ق(س) ∩ صفر نهاية -3



CamScanner

دور ثاني 2017

الشكل المجاور هو مـ(س) نقطة الإنطلاق لمنحنى م(س) حيث

(أ) (١، م(١)) (ب) (٥، م(٥)) (جـ) (٢، م(٢)) (د) لايوجد نقطة انطلاق

أ. معتصم ريحان







عندما نرى الاقترانة مـ(س) طالع في فترة معطاة اذاً مـ(س) متزايد موجب

وعندما نرى الاقترانة مـ(س) نازل في فترة معينة اذاً مـ(س) متناقص سالب

أ. معتصم ريحان / تابعني على الفيس والبوتيوب

دور ثاني 2017

اذا كان م(س) كثير حدود وكانت زاوية ميل المماس لمنحنى مـ(س) عند أي نقطة عليه في الفترة ]٢، ٥[ هي زاوية منفرجة فإن العبارة الصحيحة هي:

(أ) م(س) متناقص في الفترة [٢، ٥] (ب) م(س) متزايد في الفترة [٢، ٥]

(جـ) م(س) مقعر للأعلى في الفترة [٢، ٥] (د) م(س) مقعر للأسفل في الفترة [٢، ٥].

الحل لاحظ معي جيدا تعريف زاويتا الانطلاق في الكتاب الوزاري ص 77.

**زاويتا الإنطلاق** هي زاوية ميل المماس المرسوم لمنحنى م(س) عند نقطة الإنطلاق

ومنها ظا θ = مـ(س)

(*) لكنه لاحظ في هذا السؤال قال لمنحنى مـ(س) اذاً ⟸ ظا θ = مـ(س)

وذكر في السؤال انه الزاوية منفرجة ∴ ⟸ ٩٠ < θ < ١٨٠

والظل في الربع الثاني يكون سالب ∴ مـ(س) < صفر سالبة

أ. معتصم ريحان تابعنا على الفيس والبوتيوب 0597259870951 9

دور ثاني 2017

اذا كان م(س) = $\frac{1}{3}$ س$^3$ + س$^2$ - ٢س فإن منحنى م(س) يقع فوق جميع مماساته على الفترة

(أ) ]-١، ∞[ (ب) ]١، ∞[ (جـ) ]-∞، -١[ (د) ]-∞، ١[

الحل مـ(س) = س$^2$ + ٢س - ٢

مـ(س) = ٢س + ٢ = صفر

⟸ س = -١

(*) يكون الاقترانة مقعر للأعلى اذا وقع فوق جميع مماساته

(*) يكون الاقترانة مقعر للأسفل اذا وقع تحت جميع مماساته

أ. معتصم ريحان



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2018 س/ إذا كانت النقطتان $(0, م(1))$ ، $(\frac{1}{2}, م(\frac{1}{2}))$ هما نقطتا إنعطاف لمنحنى $م(س)$، وكانت $مـ(س) = 4س^3 - ك$ س، فإن قيمة الثابت ك هي

(أ) $-3$ (ب) 2 (ج) 3 (د) 6

الحل/ $مـ(0) = صفر$ ، $مـ(\frac{1}{2}) = صفر$ لأنها نقط إنعطاف

$مـ(س) = 12س^2 - 2ك س$

$مـ(صفر) = 12(0) - 2ك(0)$

$مـ(0) = صفر - صفر$

$صفر = صفر$

$مـ(\frac{1}{2}) = 12(\frac{1}{2})^2 - 2ك \times \frac{1}{2}$

$صفر = 3 - ك$

$ك = 3$

أ. مقصم ريحاني
حصص أونلاين خاصة
مميزة

2018 س/ الشكل المجاور يمثل $مـ(س)$، حيث $م(س)$ كثير حدود، $مـ(3) = صفر$ فإن العبارة الصحيحة هي:

(أ) $م(3)$ قيمة حرجة

(ب) $م(س)$ مقعر لأعلى في $[0, 1]$

(ج) $م(س)$ مقعر لأعلى في $[0, 4]$

(د) $مـ(س)$ متناقص في $[0, 4]$



أ. مقصم ريحاني تابعني على الفيس بوك

2019 س/ إذا كان $م(س)$ اقترانًا متصلًا في $[1, 4]$ وكان $مـ(س) > صفر$ لجميع $س \in ]1, 4[$ وكان للاقتران $م(س)$ ثلاث نقاط حرجة فقط بحيث $مـ(3) = صفر$ فما العبارة الصحيحة مما يأتي:

(أ) $م(3) > صفر$ (ب) $م(1) = م(4)$ (ج) $م(3) < م(2)$ (د) $م(3) > م(2)$

أ. مقصم ريحاني

نعطل من السؤال أنه $مـ(س) > صفر$ ومنها $مـ(3) > صفر$ ∴ عندما س = 3 يوجد قيمة صغرى محلية حسب اختبار المشتقة الثاني

عندما س = 3 صغرى إذا أصغر وحدة نسيم ∴ $م(3) < م(2)$

أ. مقصم ريحاني
حصص أونلاين خاصة
مميزة على الزوم
0097259870951 9

(ج)



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2019 صيفي / اذا كانت $م(س) = س^3 - 3س^2$ ، $س \in [-2, 2]$ ما احداثيات نقطة الانعطاف لمنحنى الاقتران $م(س)$

(أ) $(-1, 4)$ (ب) $(1, -2)$ (ج) $(2, -4)$ (د) $(0, 0)$

الحل $م(س) = 3س^2 - 6س$

$م''(س) = 6س - 6 = صفر$

$س = 1$

$(1, م(1))$

$م(1) = (1)^3 - 3(1)^2 = -2$

∴ احداثيات نقطة الانعطاف هي $(1, -2)$

أ. مقصم ريحان

تابعني على الفيس واليوتيوب

2019 دور ثاني / اذا كانت $م''(س) = (س^4 + 5)(3 - س)^5 (س - 4)^2$ فما مجموعة قيم $س$ التي يكون عندها نقطة إنعطاف للاقتران $م(س)$

(أ) $\{3, 4\}$ (ب) $\{3, -5\}$ (ج) $\{3\}$ (د) $\{3, 4, -5\}$

الحل $م''(س) = (س^4 + 5)(3 - س)^5 (س - 4)^2 = صفر$

اما $س^4 + 5 = 0$ او $(3 - س)^5 = صفر$ او $(س - 4)^2 = صفر$

$س^4 = -5$ لا يوجد قيم لـ $س$ تحقق $س = 3$ $س = 4$

لاحظ عندما $س = 3$ فقط نقطة انعطاف

وعندما $س = 4$ لا يوجد نقطة انعطاف لانه الاقتران لم يغير منه سلوكه عندها.

أ. مقصم ريحان / قصص خاصة أونة لاينة

2019 دور ثاني / اذا كانت $م(س) = س^3 + ك س^2 - 9س$ ، $ك \in ح$ اقترانا له نقطة إنعطاف عندما $س = -1$ فما ظل زاوية الإنعطاف.

(أ) $-12$ (ب) صفر (ج) 3 (د) 12

الحل ظاهـ = م(س)

$م(س) = 3س^2 + 2ك س - 9$

$م''(س) = 6س + 2ك$

$م''(-1) = 6(-1) + 2ك$

صفر $= -6 + 2ك$

$ك = 3$

$م(-1) = 3(-1)^2 + 2 \times 3 (-1) - 9$

$م(-1) = 3 - 6 - 9$

$م(-1) = -12$

∴ ظاهـ $= -12$

أ. مقصم ريحان

قصص خاصة أونة لاينة سيزة



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2020 س / اذا كانت $م(س) = \sqrt[3]{6 - 2س} + 2$ فما قياس زاوية الانطفاء لمنحنى الاقتران $م(س)$ إن وجدت

(أ) صفر (ب) $\frac{\pi}{2}$ (ج) $\pi$ (د) لا توجد زاوية انطفاء

الحل $م'(س) = \frac{1}{3}(6 - 2س)^{-\frac{2}{3}} \times (-2)$

$م''(س) = -\frac{2}{3} \times -\frac{2}{3} \times (6 - 2س)^{-\frac{5}{3}} \times -2$

$م''(س) = -\frac{8}{9}(6 - 2س)^{-\frac{5}{3}}$ = صفر

$6 - 2س$ = صفر $\Leftarrow$ $س = 3$

السؤال طلب زاوية الانطفاء لمنحنى $م(س)$

$\therefore$ ظا$\theta$ = $م'(3)$

$\Leftarrow م'(3) = \frac{1}{3}(6 - 2 \times 3)^{-\frac{2}{3}} \times -2 = \frac{-2}{3(6-6)^{\frac{2}{3}}} = \frac{-2}{0}$ غير معرف

$\therefore م'(3)$ غير معرف عندما $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \ldots$

$\rightarrow$ هذه الزوايا يكون ظاها غير معرف

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\pi$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{6}$ |
| غير معرف | 1 | 0 | |

أ. معتصم ريحان
حصص خاصة أونلاين
بزودكم بميزة

2020 س / اذا كان منحنى الاقتران $م(س) = جا س + ب س^2$ نقطة انطفاء عندما $س = \frac{\pi}{2}$ فما قيمة ب

(أ) 4 (ب) $-4$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $\frac{1}{4}$

الحل نستنتج أنه $م'(\frac{\pi}{2}) = 0$ لأنه قال عندها نقطة انطفاء

$م(س) = جتا س + 2ب س$

$م'(س) = -جا س + 2ب \Leftarrow م'(\frac{\pi}{2}) = -جا\frac{\pi}{2} + 2ب$

صفر $= -1 + 2ب \Leftarrow ب = \frac{1}{4}$

أ. معتصم ريحان تابعني على اليوتيوب

2020 س / اذا كان $م(س) = 18 - 6س - جا س$ فأي من الخيارات التالية تتحقق فرضية منحنى $م(س)$ $\forall س \in ح$

(أ) متزايد (ب) متناقص (ج) مقعر لأعلى (د) مقعر لأسفل

الحل $م'(س) = -6 - 2جتا س$ = صفر

$\Leftarrow -2جتا س = 6$

$\Leftarrow جتا س = -3$

لا يوجد قيم لـ س لأنه $-1 \leq جتا س \leq 1$

إشارة $م'(س)$: $---$ ($-\infty$) $+++$ ($\infty$)

سلوك $م(س)$: متناقص



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مجـ ٢٠٢٥ / معتمداً على الشكل المجاور والذي يمثل منحنى الاقتران $ق(س)$ ما المجال الذي يقع فيه منحنى الاقتران $م(س)$ تحت جميع مماسات $ق$

أ) $]٣،١[$ ب) $]٢،\infty-[$ ج) $]\infty-،١[ \cup ]٣،\infty[$ د) $]\infty،٢[$




الحل

أ. مقصم ريحان
تابعني على الفيس واليوتيوب
حصص خاصة أونلاين Zoom ميزة.


دور ثاني مجـ / اذا كان $م(س)$ اقتران متصل على $ح$ وكان $ق(س) = (٢س-١)^{\frac{١}{٢}} - ١$ فإن قياس زاوية الإنطلاق لمنحنى الاقتران $م(س)$

أ) صفر ب) $\frac{\pi}{٤}$ ج) $\frac{\pi ٣}{٤}$ د) $\pi$ هـ) $\frac{\pi ٢}{٤}$

الحل $ق'(س) = \frac{١}{٢}(٢س-١)^{-\frac{١}{٢}} \times (٢) = $ صفر

$\Leftarrow (٢س-١)^{-\frac{١}{٢}} = $ صفر $\Leftarrow ٢س-١ = ٠ \Leftarrow س = \frac{١}{٢}$

زاوية الإنطفاء $=$ ظاهـ $= ق'(\frac{١}{٢}) \Leftarrow (٢ \times \frac{١}{٢} - ١)^{-\frac{١}{٢}} = -١$

$\therefore$ ظاهـ $= -١$ $\therefore$ الزاوية $\theta = \frac{\pi ٣}{٤}$ والظل يكون سالب في الربع الثاني والرابع

$\therefore$ الزاوية $\frac{\pi ٣}{٤}$ نريد أنه نجد زاوية أحد أسنادها التي تقع في الربع الثاني والرابع لأنه الظل عندها سالب

في الربع الثاني $\pi - \frac{\pi}{٤} = \frac{\pi ٣}{٤}$ موجودة في الخيارات ب

في الربع الرابع $٢\pi - \frac{\pi}{٤} = \frac{\pi ٧}{٤}$ غير موجودة في الخيارات.


أ. مقصم ريحان
00972598709519


دور ثاني مجـ / بالاعتماد على الشكل المجاور الذي يمثل منحنى $م(س)$ في النقطة/النقط التي يكون عندها $ق(س) =$ صفر ، $ق'(س)$ سالبة




أ) هـ ، م ب) ن ج) ل د) و

الحل $ق'(س) = ٠ \Leftarrow$ س $= ن$ أو س $= ل$

ل ، ن هما أصفار المشتقة الأولى


أ. مقصم ريحان
حصص خاصة أونلاين ميزة
00972598709519





$ق'(ن)$ سالبة

$ق'(ل)$ موجبة

$\therefore$ النقطة التي يكون عندها $ق(س) =$ صفر ، $ق'(س)$ سالبة هي ن # ل



CamScanner

2020 دور ثاني / يمثل الشكل المجاور منحنى قـ(س) اذا كانت مـ(س) = جـ(س) فماذا تمثل النقطة (٢، مـ(٢))

أ) عظمى محلية ب) جـ حرجة ملحق مـ(س) ج) ليست حرجة ملحق مـ(س) د) نقطة إنعطاف




الحل




← اختبار المشتقة الثانية

س = ٢ تقع في الفترة ]١، ∞[

∴ قـ(٢) < جـ ∴ مـ(٢) عظمى محلية.

أ. مقصم ريحان

---

2020 تجريبي طولكرم / اذا كانت مـ(س) كثيرة حدود معرف على ح وكانت مـ(١) = جـ ، قـ(١) × قـ(٣) > جـ

وكانت مـ(س) متناقصة في [٢، ٤] فإن النقطة (١، مـ(١)) هي :-

أ) عظمى محلية للاقتران مـ ب) حرجة محلية للاقتران مـ أ. مقصم ريحان

ج) حرجة مطلقة للاقتران مـ د) نقطة انعطاف للاقتران مـ.

الحل معطى في السؤال أن مـ(س) متناقصة في [٢، ٤] ∴ قـ(س) < جـ سالبة في [٢، ٤]

معطى في السؤال أن قـ(١) × قـ(٣) > جـ ∈ [٢، ٤]

∴ قـ(١) × (سالبة) > جـ

∴ لازم تكون قـ(١) سالبة وبمانه قـ(١) < جـ ∴ مـ(١) عظمى محلية حسب اختبار المشتقة الثانية

أ. مقصم ريحان

---

2020 تجريبي نابلس / اذا كانت مـ(س) = س |س| فإن العبارة الصحيحة فيما يلي

أ) مـ(١) غير موجودة ب) مـ(٠) عظمى محلية. أ. مقصم ريحان

ج) مـ(٠) حرجة محلية د) (٠، مـ(٠)) نقطة إنعطاف.

الحل $|س| = \begin{cases} س ، س \geq 0 \\ -س ، س < 0 \end{cases}$

قـ(س) $= \begin{cases} ٢ ، س > 0 \\ -٢ ، س < 0 \end{cases}$ قـ(٠) = غ.م

مـ(س) $= \begin{cases} س^٢ ، س \geq 0 \\ -س^٢ ، س < 0 \end{cases}$




∴ (٠، مـ(٠)) نقطة انعطاف

متصل عند س = جـ

قـ(س) $= \begin{cases} ٢س ، س \geq 0 \\ -٢س ، س < 0 \end{cases}$

قـ(٠) موجودة ومساوي جـ

أ. مقصم ريحان تابعين على الفيس واليوتيوب.




← يوجد عظمى أو جـ عندها.



CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

2019 تجريبي رام الله والبيرة

إذا كانت للإقترانة $f(x)$ كثير حدود وكانت $g(x) < 0$ عندما $x > 3$ وكانت $g(x) > 0$ عندما $x < 3$ وكانت $f'(1) = 0$ فما العبارة الصحيحة دائماً من العبارات الآتية :

أ. معتصم ريحان

أ) $g(1) = 0$ ب) $f'(3) = 0$ ج) $f(1)$ عظمى محلية د) $f(1)$ صغرى محلية .

| $x$ | $2^-$ | $2$ | $2^+$ |
|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| سلوك $f(x)$ | ∩ | | ∪ |

$\therefore f(1)$ عظمى محلية

حسب إختبار المشتقة الثانية

$f'(1) = 0$ معطى

$\therefore g(1) \neq 0$ لأن $g(x) < 0$ سالبة


أ. معتصم ريحان
تأسيس على العشر والبوتوس
حصص خاصة أونلاين مميزة
00972598709519


---

2020 تجريبي خانيونس

إذا كان المستقيم $ص + ٣س + ٢ = 0$ مماساً لمنحنى $f(x)$ عند نقطة الإنطاف $(-1, 1)$ فما قياس زاوية الانطاف عند هذه النقطة .

أ) $-3$ ب) $-1$ ج) صفر د) $1$

الحل م المماس $= -\frac{\text{معامل } س}{\text{معامل } ص} = -\frac{3}{1} = -3$

$\therefore f'(-1) = -3$

ظل زاوية الانطاف $= ظا\theta = f'(-1) = -3$

ملاحظة

$ظا\theta = f'(x)$ ← زاوية الانطاف لمنحنى $f(x)$

$ظا\theta = g'(x)$ ← زاوية الانطاف لمنحنى $g(x)$

أ. معتصم ريحان
حصص خاصة أونلاين
مميزة جداً

---

2020 الدورة الاستكمالية

ليكن $f(x) = جاس - 3\sqrt{2}$ جتاس ، $س \in [0, 2\pi]$ فما الإحداثي السيني لنقطة الإنطاف للإقترانة $f(x)$

أ) $\frac{\pi}{2}$ ب) $\frac{\pi}{4}$ ج) $\frac{\pi}{3}$ د) $\frac{\pi}{2}$

الحل $f'(x) = جتاس - 3\sqrt{2} \times -جاس$

$f'(x) = جتاس + 3\sqrt{2}$ جاس

بقسمة الكل على جتاس

$\frac{f'(x)}{جتاس} = \frac{جاس}{جتاس} + \frac{3\sqrt{2}\ جتاس}{جتاس}$

$-ظاس + 3\sqrt{2} = 0$

$-ظاس = -3\sqrt{2}$

$ظاس = 3\sqrt{2}$

$\therefore س = \frac{\pi}{3}$ أو $س = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3} \notin [0, 2\pi[$ مرفوضة

| $س$ | $\frac{\pi}{3}^-$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{3}^+$ |
|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | $0$ | $-$ |
| سلوك $f(x)$ | ∪ | نقطة انطاف | ∩ |

أ. معتصم ريحان



صورة صوبت بـ CamScanner

2019 سلفية / اذا كانت المستقيم ص = ١ - ٤ س مماساً للاقتران م(س) عند نقطة الإنطاف (١، -٣) فإن ظل زاوية الإنطاف

أ ١ ب -٣ ج صفر د -٤

الحل معادلة المستقيم ص + ٤ س = ١

م = -معامل س / معامل ص = -٤/١ = ظا(-٤)

الميل = م'(١) = -٤

∴ ظا = -٤

ظل زاوية الإنطاف = -٤

أ. معتصم ريحاني
حصص خاصة أونلاين
ممزوجة Zoom

---

2019 سلفية / اذا كان للاقتران م(س) = $P س^2 + س^3$ نقطة إنطاف عند س = -١ فإن P =

أ -٣ ب ٣/٢ ج ٣ د ٣/٢

نستنتج أن م'(-١) = صفر

م'(س) = ٢P س + ٣ س^٢

م'(-١) = -٢P + ٣ = صفر

-٢P = -٣

P = ٣ #

أ. معتصم ريحاني
تابعني على الفيس واليوتيوب علشان تستفيد.

---

2019 تجريبي الخليل / اذا كان م(س) = ٣ (P-٢) س^٢ + ٨ س + ٥ فما مجموعة الثابت P التي تجعل م(س) مقعراً للأسفل

أ P ≥ ٢ ب P > ٢ ج P < ١٢ د P > ١٢

الحل م'(س) = ٦ (P-٢) س + ٨

م'(س) = ٦P - ١٢ < صفر

٦P < ١٢

P < ٢

أ. معتصم ريحاني
تابعني على مجموعات التواصل مع والتطبيقات للفائدة أكثر.

---

2019 تجريبي الخليل / اذا كان م(س) اقتران يحقق شروط نظرية رول في الفترة [-١، ٢] وكانت جـ التي تحققها النظرية هي جـ = ١ وكان م'(١) = -٣ فإن إحدى العبارات الآتية صحيحة.

أ م(١) صغرى محلية للاقتران ب (١، م(١)) نقطة انطاف

ج م(١) عظمى محلية للاقتران د م(-١) ≠ م(٢)

أ. معتصم ريحاني

نستنتج من معطيات السؤال أن م'(١) = صفر ← نتيجة رول.

ومعطى م'(١) = -٣ (سالبة)

∴ م(١) عظمى محلية حسب اختبار المشتقة الثانية.

(ص٩)



Camscanner بـ صوتيا

تجريبي الخليل 69 / اذا كانت $س_1$ ، $س_2 \in [P، ب]$ وكانت $ه'(س_1) - ه'(س_2) > 0$ حيث $\forall س_1 > س_2$ فأي العبارات التالية صحيحة دائماً ؟ أ. مقصم ريحان

(أ) منحنى $ه(س)$ متزايد في $[P، ب]$ (ب) منحنى $ه(س)$ متناقص في $[P، ب]$

(ج) منحنى $ه(س)$ مقعر لأعلى في $[P، ب]$ (د) منحنى $ه(س)$ مقعر لأسفل في $[P، ب]$

الحل لو فرضنا رسمة توضيحي




$ه'(س_1) - ه'(س_2) > 0$ حيث $س_1 > س_2$ انتبه قال في السؤال

$\therefore ه'(س_1) > ه'(س_2)$ أكبر ستكون فوق في الرسمة

$\therefore ه(س)$ مقعر لأعلى في $[P، ب]$




أ. مقصم ريحان

---

تجريبي الخليل 2019 / اذا كانت النقطة $(٥، ٢)$ نقطة انعطاف لمنحنى الاقتران $ه(س)$ بحيث $ه'(٥) = ١$ ، $ه'(٢) = -١$ فما قياس زاوية الانعطاف.

(أ) $\frac{\pi}{4}$ (ب) $\frac{\pi}{2}$ (ج) $\frac{3\pi}{4}$ (د) $\pi$

الحل ظاهر = $ه'(س)$

مقعر $ه'(٥) =$ صفر ، $ه'(٥) = ١$

$\therefore$ ظاهر = $ه'(٥) = ١$

$\therefore \theta = \frac{\pi}{4}$ أو $\theta = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$

---

تجريبي 2019 / اذا كانت $ه(س)$ كثير حدود من الدرجة الثالثة فما أكبر عدد ممكن من نقاط الانعطاف لمنحنى $ه'(س)$

(أ) ١ (ب) صفر (ج) ٢ (د) ٣

الحل للحصول على نقاط انعطاف للاقتران $ه(س)$ لازم نخد $ه''(س)$

$ه(س) \leftarrow ه'(س) \leftarrow ه''(س) \leftarrow ه'''(س)$

من الدرجة ٣ ٢ ١ صفر / عدد ثابت لا يوجد نقط انعطاف كما في الرسم

---

الخليل 2019 / اذا كانت $ه(س)$ كثير حدود وكانت $ه'(١) =$ صفر ، وكانت $ه''(١) \times ه''(٢) <$ صفر وكانت $ه''(٢) >$ صفر فإنه

(أ) $ه(١)$ قيمة عظمى محلية (ب) $ه(٢)$ قيمة عظمى محلية.

(ج) $ه(١)$ قيمة صغرى محلية (د) $(٢، ه(٢))$ نقطة إنعطاف.

أ. مقصم ريحان حصص خاصة أونلاين ميزة

الحل مقصم $ه''(١) \times ه''(٢) <$ صفر

لازم يكون $\leftarrow$ (+) $\times$ (−) $<$ صفر

بما أنه $ه''(١) <$ صفر موجب $\therefore ه(١)$ صغرى محلية

أ. مقصم ريحان / تابعني على الفيس واليوتيوب. حسب اختبار المشتقة الثانية



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2021 س / اذا كانه م(س) = س³ - ب س + ٤ وكانت النقطة (-١، ب) نقطة إنعطاف لمنحنى م(س) فما هي قيمة الثابت ب

أ) -٣ ب) ٢ ج) ٢ د) ٤

الحل / مَ(-١) = ٠ ، م(-١) = ب

م(س) = ٣س² - ٢ب س

مَ(س) = ٦س - ٢ب

مَ(-١) = ٦(-١) - ٢ب = ٠ ⇐ -٢ب = ٦ ⇐ ب = -٣

م(-١) = (-١)³ - -٣(-١)²

ب = -١ + ٣ ⇐ ب = ٢

أ. معتصم ريحان / تابعني على اليوتيوب
00972598709519

همس خاصة أو نهاية نزوم .

2021 س / اذا كانت م(س) اقترانا متصلا على الفترة [١، ٦] وكانت مَ(س) > صفر لجميع قيم س ∈ ]١، ٦[ وكانت للاقترانة ثلاث نقط حرجة في ]١، ٦[ فإذا علمت أن مَ(٤) = صفر فما العبارة الصحيحة فيما يلي:

أ) م(٤) > صفر ب) م(٤) > م(٣) ج) م(٤) < م(٣) د) م(٤) = م(٣)

الحل




∵ قال مَ(س) > صفر ∀ س ∈ ]١، ٦[

∴ مَ(٤) > صفر

∴ م(٤) صغرى عظمى محلية حسب اختبار المشتقة الثانية

∴ م(٤) > م(٣)

أ. معتصم ريحان تابعني على الفيس واليوتيوب

2021 دور ثاني س / ما العبارة الصحيحة دائما من العبارات الآتية:

أ) اذا كانه م(س) كثير حدود من الدرجة الثانية فإنه له نقطة حرجة واحدة فقط.

ب) اذا كانه م(س) كثير حدود بحيث م(٢) = ٥ فإنه مَ(٢) = صفر

ج) الاقترانة م(س) = (١ - س)⁴ يكون مقعرا للأسفل على ح .

د) اذا كانه مَ(أ) ≠ صفر حيث أ ∈ لمجال م(س) ، فلا يوجد قيم قصوى محلية عندما س = أ .

أ. معتصم ريحان
همس خاصة أو نهاية على الزوم
00972598709519

صـ ١١



ه صوتيا بـ CamScanner

# ✱ المسألة المقالية لدرس التقعر ونقط الانعطاف ✱

## مسألة امتحانات سابقة

حصة رقم 39

توضيحي على 2022

أ. معتصم ريحان

2019 ش / اذا كانت للاقترانة م(س) = س⁴ − ٤س³ + ك(س)

نقطة إنعطاف أفقي هي النقطة (١، ٢) وكانت ع(س) = ك²(س) إجب ع(١)

الحل (١، ٢) نقطة انعطاف أفقي ∴ م(١) = ٢ ، م′(١) = صفر ، م″(١) = صفر

نقطة — أفقي — انعطاف

أ. معتصم ريحان

م(١) = (١)⁴ − ٤(١)³ + ك(١)

٢ = −٣ + ك(١) ⇐ ك(١) = ٥ #

م′(س) = ٤س³ − ١٢س² + ك′(س)

م′(١) = −٨ + ك′(١)

صفر = −٨ + ك′(١)

ك′(١) = +٨ #

ع(س) = ٢ (ك(س)) × ك′(س)

ع′(س) = ٢ (ك(س) × ك′(س) + ك′(س) × ك′(س))

ع′(١) = ٢ (ك(١) × ك″(١) + ك′(١) × ك′(١))

ع′(١) = ٢ (٥ × ١٢ + ٨ × ٨)

ع′(١) = ٢ (١٢٤) = ٢٤٨ # . أ. معتصم ريحان / حصص خاصة أونلاين

ك″(س) = ١٢س² − ٢٢س + ك″(س)

ك″(١) = −١٢ + ك″(١)

صفر = −١٢ + ك″(١)

ك″(١) = +١٢ #

2019 ش دورثاني / اذا كانت م(س) = س³ − ٣س² − ٩س + ٥ ، س ∈ [−٢، ٦] أوجد كلاً مما يأتي:

① مجالات التزايد والتناقص للاقترانة م(س) ② القيم القصوى المحلية للاقترانة م(س)

③ مجالات التقعر للأعلى وللأسفل لاقترانة م(س).

الحل م′(س) = ٣س² − ٦س − ٩ = ٠ ⇐ س² − ٢س − ٣ = ٠ ⇐ س = ٣ أو س = −١

ك′(س) = ٦س − ٦ = صفر ⇐ س = ١ #

إشارة م′(س): + + + | − − − | + + +

سلوك م(س): −٢ ، ١ ، ٦

م(س) متزايد في [−٢، ١] ∪ [٣، ٦]

م(س) متناقص [١، ٣]

للاقترانة م(س) قيمة قصوى عظمى محلية عند س = ١

وقيمتها م(١) = ١ (١، ١) عظمى محلية

للاقترانة م(س) قيمة قصوى صغرى محلية عند س = ٣

وقيمتها م(٣) = −٢٢ (٣، −٢٢) صغرى محلية

للاقترانة م(س) نقطة انعطاف عند (١، −٦)

للاقترانة م(س) تقعر للأسفل في ]−٢، ١[

م(س) تقعر للأعلى في ]١، ٦[

للاقترانة م(س) قيمة صغرى محلية عند (٣، −٢٢)

للاقترانة م(س) قيمة عظمى محلية عند (١، ٥)

إشارة م″(س): − − − | + + +

سلوك م(س): −٢ ، ١ ، ٦

م(س) متزايد [−٢، −١] ∪ [٣، ٦] — عند س = −١ عظمى محلية، عند س = ٣ صغرى محلية

م(س) متناقص [−١، ٣]

للاقترانة م(س) نقطة انعطاف عند (١، ٥)

للاقترانة م(س) تقعر للأعلى في ]−∞، ١[

للاقترانة م(س) تقعر للأسفل في ]١، ∞[

أ. معتصم ريحان / تابعنا على الفيس والبرنامج

حصص خاصة أونلاين Zoom

00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2019 دور ثاني / اذا كان $م(س) = س^3 + ب س^2 + جـ س + د$ ، $ب، جـ، د \in ح$

بحيث $م(0) = 4$ وكان للاقتران $م(س)$ نقطة انعطاف عند $س = 1$

ومعادلة المماس لمنحنى $م(س)$ عند نقطة الانعطاف هي $2س + هـ - 5 = 0$ جد أوجد قاعدة الاقتران

الحل $م(0) = (0)^3 + ب(0)^2 + جـ(0) + د$

$\therefore د = 4$ #

$قـ(1) =$ صفر ← لانه عندها انعطاف

$قـ(س) = 3س^2 + 2ب س + جـ$

$قـ(س) = 6س + 2ب$

$قـ(1) = 6(1) + 2ب$

صفر $= 6 + 2ب$

$\therefore ب = -3$ #

الميل = ظاهـ = $قـ(1) =$ معامل س / معامل هـ

$\therefore قـ(1) = \frac{-2}{1} = -2$

$قـ(1) = 3(1)^2 + 2ب(1) + جـ$

$-2 = 3 + 2 \times -3 + جـ$

$-2 + 3 = جـ$

$\therefore جـ = 1$ #

أ. معتصم ريحان

$\therefore م(س) = س^3 - 3س^2 + س + 4$ ← قاعدة الاقتران

أ. معتصم ريحان / حصص خاصة الكترونية مميزة أونلاين 0097259870951 9

---

صحي / اذا كانت $م(س) = \frac{1}{2}$ جاس $+ \frac{1}{4}$ جتا $2س + \frac{3}{4}$ ، $س \in ]0، \pi[$ أوجد :-

① مجالات التقعر للأعلى وللأسفل للاقتران ② نقط الانعطاف ③ زاوية الانعطاف.

الحل $م(س) = \frac{1}{2}$ جاس $+ \frac{1}{4}(1 - 2$ جاس$^2) + \frac{3}{4}$

نستخدم متطابقة جتا ضعف الزاوية

جتا $2س = 1 - 2$ جاس$^2$

قبل ما نشتق نسهل.

$م(س) = \frac{1}{2}$ جاس $+ \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ جاس$^2 + \frac{3}{4}$

$م(س) = -$ جاس$^2 +$ جاس $+ 1$

$قـ(س) = -2$ (جاس) × جتاس

$قـ(س) = -$ جتا $2س$ (بالمطابقة)

$قـ(س) = -$ جتا $2س \times 2 =$ صفر

جتا $2س =$ صفر

$2س = \frac{\pi}{2} \Leftarrow س = \frac{\pi}{4} \in ]0، \pi[$

$2س = \frac{3\pi}{2} \Leftarrow س = \frac{3\pi}{4} \in ]0، \pi[$

إشارة $قـ(س)$

--- | +++ | --- | صفر سلوك $م(س)$

$\frac{\pi}{4}$ ∩ $\frac{3\pi}{4}$ ∪ $\pi$

$م(س)$ مقعر لأسفل $]$ صفر، $\frac{\pi}{4}[$ ، $]\frac{3\pi}{4}، \pi[$

$م(س)$ مقعر للأعلى $]\frac{\pi}{4}، \frac{3\pi}{4}[$

② نقطة انعطاف $(\frac{\pi}{4}، 1)$

④ نقطة انعطاف $(\frac{3\pi}{4}، 1)$

لتحقق الشروط الثلاثة

③ زوايا الانعطاف

ظاهـ $= قـ(\frac{3\pi}{4}) = (-1) \Leftarrow \theta = \frac{3\pi}{4}$

ظاهـ $= قـ(\frac{\pi}{4}) = (1) \Leftarrow \theta = \frac{\pi}{4}$

أ. معتصم ريحان

حصص خاصة أونلاين



CamScanner بـ ممسوحة ضوئيا

أ. مقصم ريحان
قابعين في العين والبيوتيوب

دورة ثاني 2020

اذا كانت $م(س) = \frac{1}{3}س^3 + ٢$ أوجد : ① مجالات التقعر للأعلى وللأسفل ② نقط الانعطاف ③ زوايا الإنعطاف .

الحل $م(س) = \frac{1}{3}س^3 + ٢$

$م'(س) = \frac{1}{3} \times ٣س^2 = س^2$ ⟸ $م''(س) = ٢س = ٠$ ⟸ $س = ٠$ = صفر

رجع شكلك لأجلك ضروري

المقام $\neq$ صفر البسط $\neq$ صفر عندما $س = ٠$ ∴ $م''(٠) = ٠$ غ.م

$م(س)$ مقعر لأعلى $] -\infty ، ٠ [$ ①

$م(س)$ مقعر لأسفل $] ٠ ، \infty [$ ②

| | $-\infty$ | | ٠ | | $\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| إشارة $م''(س)$ | + + + | | غ.م | - - - - | |
| سلوك $م(س)$ | ∪ | | صفر | ∩ | |

$(٠ ، م(٠))$ نقطة انعطاف لأنها حققت الشروط الثلاثة . أ. مقصم ريحان

$(٠ ، ٢)$ ⟸ $م(س)$ متصل عند $س = ٠$ ، $م'(٠)$ = غير موجودة (نقطة حرجة) ⟸ الاقتران غير قابل للاشتقاق عند $س = ٠$

ضروري ترجع الاقتران لأجله اذا كانت المشتقة سالبة

③ زاوية الانعطاف = ظاهـ = $م'(٠) = \frac{1}{٣(٠)^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{٠}$ = غير موجودة

∴ الزوايا التي الظل عندها غير موجود هي $\theta = \frac{\pi}{2} ، \frac{٣\pi}{2} ، \frac{٥\pi}{2} ، \dots$

أ. مقصم ريحان / حصص خاصة أونلاين 00972598709519

---

دورة ثاني 2020 / يمثل الشكل المجاور منحنى $م'(س)$ لكثير حدود $م(س)$ من الدرجة الثالثة أوجد معادلة الاقتران إذا علمت أن منحناه يمر بنقطة الأصل




كثير حدود من الدرجة الثالثة

الحل / $م(٠) = صفر$ لأنه يمر بنقطة الأصل

$م(س) = أس^3 + بس^2 + جس + د$

$م(٠) = د$ ⟸ $د = صفر$ ∴ #

من الشكل نستنتج أن $م'(١) = ٠$ ، $م'(صفر) = ٣$

$م'(س) = ٣أس^2 + ٢بس + جـ$

$م'(٠) = جـ$ ⟸ $جـ = ٣$ #

| | $-\infty$ | | ١ | | $\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| إشارة $م'(س)$ | - - - | | ٠ | + + + | |
| سلوك $م(س)$ | ∩ | | صفر | ∪ | |

نستنتج $م'(١) = ٠$

أ. مقصم ريحان

$م'(س) = ٦أس + ٢ب$

$م'(١) = ٦أ(١) + ٢ب$

$صفر = ٦أ + ٢ب$ ①

$م'(١) = ٣أ(١)^2 + ٢ب(١) + ٣$

$-٣ = ٣أ + ٢ب$ ②

مساحة الاقتران

$\therefore م(س) = س^3 - ٣س^2 + ٣س$

صفر

نحل معادلة ① مع ② بالحذف ينتج $أ = ١$ ، $ب = -٣$



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

بداية ← الجزء الثاني من الحصة رقم 39 #

الدورة الثانية 2020

اذا كانت للاقترانية $م(س) = س^3 + ب س^2 + ب س + جـ$ نقطة انعطاف عند $(-1، 8)$ وكانت ميل زاوية الانعطاف عند نقطة الانعطاف تلك يساوي $\frac{3\pi}{4}$ أوجد قيم الثوابت $ب، ب، جـ$

أ. معتصم ريحاني

الحل نستنتج من معطيات السؤال أن: $م(-1) = 8$ و $م''(-1) = صفر$

* ظل زاوية الانعطاف $= م''(-1) = ظا(\frac{3\pi}{4}) \Leftarrow م''(-1) = -1$

$م(-1) = (-1)^3 + ب(-1)^2 + ب(-1) + جـ$

$8 = -1 + ب - ب + جـ$

$9 = ب - ب + جـ$ ... (1)

$م'(س) = 3س^2 + 2ب س + ب$

$م''(س) = 6س + 2ب$

$م''(-1) = 6(-1) + 2ب$

$صفر = -6 + 2ب$

$ب = 3$ #

لاحظ $ظا\frac{3\pi}{4} = -1$

$م'(-1) = 3(-1)^2 + 2ب(-1) + ب$

$-1 = 3 - 2ب + ب$

$-1 = 3 - 2 \times 3 + ب$

$ب = -1 + 6$

$ب = 5$ # الآن نعوض في المعادلة (1)

$9 = ب - ب + جـ$

$9 = 3 - 5 + جـ$

$جـ = 11$ #

أ. معتصم ريحاني / تابعني على الفيس واليوتيوب

الثاني اذا كانت $م(س) = 12 + س^2 + 2$ لو $(س-1)$ ، $س \neq 1$ فجد:

① مجالات التقعر للأعلى وللأسفل ② نقطة الانعطاف (إن وجدت) ب.

الحل $م(س) = 2س + 2 \times \frac{1}{س-1}$

$م'(س) = 2 + \frac{-2 \times (1)}{(س-1)^2} = صفر$

$(س-1)^2 = 1 \Leftarrow 2 \neq 0$

$\Leftarrow \frac{2}{(س-1)^2} = 2$

$\Leftarrow س - 1 = \pm 1$

$س = 2$ ومرفوضة $\neq 1$

$س = صفر$

إشارة $م''(س)$: + + + | ∄ | − − − | 0 | + + +

سلوك $م(س)$: ∪ | 2 | ∩ | 1 | ∪

$م(س)$ مقعر للأسفل $]1، 2[$

$م(س)$ مقعر للأعلى $]2، \infty[$

الفترات دائماً مفتوحة في التقعر.

$(2، 16)$ نقطة انعطاف لتحقق شروطها الثلاثة

ص 6

أ. معتصم ريحاني
دروس خاصة أونلاين وحضورية
0097259870951
تابعني على الفيس واليوتيوب



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2021 س / اذا كانت $م(س) = س^2 + \frac{ب}{س}$ ، $س \neq$ صفر $ب \in ح$ باستخدام اختبار المشتقة الثانية بين أن منحنى الاقتران $م(س)$ لا يأخذ أي قيمة عظمى محلية من مجاله

الحل $م'(س) = 2س + \frac{-ب}{س^2}$ $\Leftarrow$ صفر $\Leftarrow 2س^3 - ب = 0 \Leftarrow س^3 = \frac{ب}{2}$

$\Leftarrow س = \sqrt[3]{\frac{ب}{2}}$

$م''(س) = 2 + \frac{ب \times 2س^2}{س^4}$

$م''(س) = 2 + \frac{2ب}{س^3}$ $\Leftarrow$ $م''\left(\sqrt[3]{\frac{ب}{2}}\right) = 2 + \frac{2ب}{\left(\sqrt[3]{\frac{ب}{2}}\right)^3}$

$\Leftarrow م''\left(\sqrt[3]{\frac{ب}{2}}\right) = 2 + \frac{2ب}{\frac{ب}{2}} = 2 + 2 \times 2 = 2 + 4 = 6$

$\because م''\left(\sqrt[3]{\frac{ب}{2}}\right) = 6 > 0$ صفر $\therefore م\left(\sqrt[3]{\frac{ب}{2}}\right)$ قيمة صغرى محلية

$\therefore$ ه $\overset{\text{إشارة } م''(س)}{\underset{\text{سلوك } م(س)}{\overset{+ + + +}{\underset{\searrow}{\overset{- - - -}{\underset{\sqrt[3]{\frac{ب}{2}}}{\overset{+ + + +}{\underset{\nearrow}{}}}}}}}}$

$\therefore$ الاقتران $م(س)$ لا يأخذ قيمة عظمى محلية في مجاله

أ. معتصم ريحان

2021 س / اذا كان $م(س) = ب س^3 + 3س^2 + 2ب$ حيث $ب \in ح$ وكان لمنحنى $م(س)$ قيمة عظمى محلية تساوي ٨ وله نقطة انعطاف عندما $س = 1$ فأوجد قيمتي الثابتين $ب$

الحل حامد تحل بفك يا بطل

أ. معتصم ريحان

00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

دورة أكتوبر 2021 / الشكل المجاور يبين منحنيا كل من الاقترانين هـ(س)، م(س) حيث الفترة [٢، ٦] بحيث ك(س) = $\frac{\text{هـ}(س)}{\text{م}(س)}$، بين أنه الاقتران ك(س) متقعر لأعلى في الفترة ]٢، ٦[




الحل نفرض ك(س) = $\frac{\text{هـ}(س)}{\text{م}(س)}$

أ. مقصم ريحان / تابعين لي النبي واليوشعون

$\Leftarrow$ ك(س) = $\left(\frac{\text{هـ}(س)}{\text{م}(س)}\right)^{\text{هـ}(س)\times\text{م}(س)}$ = هـ^ز

حيث ز = هـ(س) × م(ق)(س) + م(س) × هـ(ق)(س)

أ. مقصم ريحان

∴ هـ(س) × م(ق)(س) + (م(س))^٢ = ز

∴ ⊖ × ⊖ + (+)^٢ =

= ⊕ + ⊕ = ⊕

∴ ز موجب على ]٢، ٦[

∴ ك(س) = هـ^ز موجب على ]٢، ٦[

∴ ك(س) متقعر لأعلى في ]٢، ٦[

الاقتران الأسي الطبيعي لا يساوي صفر أبدا لأنه دائما موجب

* لاحظ من الرسم أن :-

م(س) سالب في [٢، ٦] لأنه يقع تحت محور السينات .

هـ(س) سالب في [٢، ٦] لأنه يقع تحت محور السينات .

م(س) متزايد ∴ $\Leftarrow$ م(ق)(س) ⊕ في ]٢، ٦[

م(س) متقعر لأسفل ∴ $\Leftarrow$ م(ق)(س) ⊖ في ]٢، ٦[

هـ(س) متزايد ∴ $\Leftarrow$ هـ(ق)(س) ⊕ في ]٢، ٦[

هـ(س) متقعر لأعلى ∴ هـ(ق)(س) ⊕ في ]٢، ٦[

#

أ. مقصم ريحان
حصص خاصة أونلاين مميزة
00972598709519





ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خارجي / اذا كانه مَ (-١) = مَ (٢) = صفر ، مَ(س) = -٣س أوجد
① نقط القيم القصوى ونوعها ② فترات التزايد والتناقص ③ فترات التقعر للأعلى وللأسفل ونقط الإنعطاف.

الحل ١. معصم ريحان

مشتق مَ(س) = -٣س

مَ(-١) = -٣×-١ = ٣ > صفر

∴ يوجد عند س = -١ نهاية قصوى صغرى محلية

مَ(٢) = -٣×٢ = -٦ < صفر

∴ يوجد عند س = ٢ نهاية قصوى عظمى محلية

(-١، مَ(-١)) نهاية صغرى محلية

(٢، مَ(٢)) نهاية عظمى محلية

أصفار المشتقة الأولى

(*) مَ(س) متناقص ]-∞، -١[ ، ]٢، ∞[

مَ(س) متزايد ]-١، ٢[

(*) مَ(س) = -٣س = صفر

∴ س = صفر

مَ(س) مقعر للأعلى ]-∞، صفر[ ، مَ(س) مقعر للأسفل ]صفر، ∞[

إشارة مَ(س)

إشارة مَ(س)

١. معصم ريحان حصص خاصة أونلاين مميزة.

تجريبي نابلس

اذا كانه للإقتران مَ(س) = ٣ جا س + ل(س) نقطة إنعطاف أفقي هي $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ وكانه لَـ(س) = (ل(س)+٢)² ، فجد لَـ($\frac{\pi}{2}$)

الحل

| مَ($\frac{\pi}{2}$) = $\frac{3\pi}{2}$ | مَ($\frac{3\pi}{2}$) = صفر | مَ($\frac{\pi}{2}$) = صفر |
|---|---|---|
| نقطة | أفقي | إنعطاف |

١. معصم ريحان

لَـ(س) = ٢ (ل(س)+٢) × لَ(س)

لَـ(س) = (٢ل(س)+٤) × لَ(س)

لَـ(س) = (٢ل(س)+٤) × لَ(س) + لَ(س) × (٢لَ(س))

لَـ($\frac{\pi}{2}$) = (٢ل($\frac{\pi}{2}$)+٤) × لَ($\frac{\pi}{2}$) + لَ($\frac{\pi}{2}$) × ٢لَ($\frac{\pi}{2}$) ——— (*)

لَـ($\frac{\pi}{2}$) = (٢×$\frac{3\pi}{2}$+٤) × صفر + ٦ × ٢ × ٦ = ٧٢ #

أ. معصم ريحان 0097259870951 حصص خاصة أونلاين مميزة.

١. معصم ريحان

مَ($\frac{\pi}{2}$) = ٣ جا$\frac{\pi}{2}$ + ل($\frac{\pi}{2}$) ⇐ ل($\frac{\pi}{2}$) = $\frac{3\pi}{2}$ ①

مَ(س) = ٣ جتا س × ٢ + لَ(س) ⇐ مَ($\frac{\pi}{2}$) = ٦ جا$\frac{\pi}{2}$ + لَ($\frac{\pi}{2}$) ⇐ لَ($\frac{\pi}{2}$) = ٦ ②

مَـ(س) = ٦× -جا س × ٢ + لَـ(س) ⇐ مَـ($\frac{\pi}{2}$) = -١٢ جا$\frac{\pi}{2}$ + لَـ($\frac{\pi}{2}$) ⇐ لَـ($\frac{\pi}{2}$) = صفر ③

الآن نأخذ معادلة ① مع ② مع ③ ونعوضهم في معادلة (*)



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

السلام عليكم ورحمة الله

هذا التلخيص المميز جداً هدية جارية مني وعن أهلي وأموات وجميع موتى المسلمين .

* هذا التلخيص موجود بالكامل فيديوهات مصورة وهي عبارة عنه حصص خاصة مميزة على الزووم ، اذا أردت التسجيلات كاملة رسلني على الواتس 00972598 709519 أ. معتصم ريحان

* فيديوهات هذا التلخيص بنفس ترتيب التلخيص وهذا هو الشرح المميز جداً والذي لا يوجد في فلسطين مثله . بفضل الله .

* بعض هذه الفيديوهات موجودة بشكل عام للكل على قناتي على اليوتيوب باسم (( معتصم ريحان رياضيات توجيهي )) وباقي الفيديوهات موجودة بروابط خاصة ملنه يطلبها واتس .

* اعتمد بشكل كامل في هذا التلخيص وبإذن الله ستحصل على العلامة الكاملة .

* لا تنسى أن تتابع صفحتي الرسمية على الفيس بوك وقناتي على اليوتيوب وكلاهما باسم (( معتصم ريحان رياضيات توجيهي ))

* بشرى سارة لكل طلاب فلسطين هذا التلخيص شامل ومجاني بالكامل لكل طلاب فلسطين وبإمكانك ارساله لمنه تحب لكنه فيديوهات هذا التلخيص غير مجانية وانا أردت الحصول عليها رسلني واتس .

أ. معتصم سلام ريحان
00972598 709519

تابعني على مجموعات الواتس والتليجرام ضروري .



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الوحدة الثانية

الدرس الخامس: (( تطبيقات القيم القصوى ))

الحصة رقم 40

توجيهي علمي 2022

حصص خاصة أونلاين

أ. معتصم ريحان

(*) قبل البدء في الدرس سيلزمك قوانين مهمة جداً .

1) المستطيل
- محيط المستطيل = ٢ × ( الطول + العرض )
- مساحة المستطيل = الطول × العرض

2) المربع
- محيط المربع = ٤ × طول الضلع
- مساحة المربع = طول الضلع × نفسه = (طول الضلع)$^2$

أ. معتصم ريحان

3) المثلث
- محيط المثلث = مجموع أطوال المثلث الثلاثة .
- مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ × طول القاعدة × الارتفاع
- أو مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ × حاصل ضرب أي ضلعين × جيب الزاوية المحصورة بينهما

4) الدائرة
- محيط الدائرة = ٢ π نق
- مساحة الدائرة = π نق$^2$

أ. معتصم ريحان

حصص خاصة أونلاين مميزة

00972598709519

تابعني على الفيس واليوتيوب

5) الكرة
- مساحة سطح الكرة = ٤ π نق$^2$
- حجم الكرة = $\frac{4}{3}$ π نق$^3$

6) المخروط
- المساحة الجانبية = π نق × ل
- المساحة الكلية = π نق ل + π نق$^2$
- حجم المخروط = $\frac{1}{3}$ × π نق$^2$ ع

7) الاسطوانة
- المساحة الجانبية = ٢ π نق ع
- المساحة الكلية = ٢ π نق ع + ٢ π نق$^2$
- حجم الاسطوانة = π نق$^2$ ع

أ. معتصم ريحان

8) شبه المنحرف
- محيط شبه المنحرف = مجموع أطوال أضلاعه .
- مساحة شبه المنحرف = $\frac{1}{2}$ × ( مجموع القاعدتين المتوازيتين ) × الارتفاع

(ص ل)



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

[9] المكعب

المساحة الجانبية للمكعب = ٤ × (الضلع)$^{٢}$

المساحة الكلية للمكعب = ٦ × (الضلع)$^{٢}$

حجم المكعب = (الضلع)$^{٣}$

أ. معتصم ريحان

تابعني على الفيس واليوتيوب.

[10] متوازي المستطيلات

المساحة الجانبية = (الطول + العرض) × ٢ × الإرتفاع

المساحة الكلية = المساحة الجانبية + (٢ × مساحة القاعدة)

حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الإرتفاع

أ. معتصم ريحان

[11] قانون المسافة بين نقطتين

$$ف = \sqrt{(س_٢ - س_١)^{٢} + (ص_٢ - ص_١)^{٢}}$$

[12] قانون منتصف قطعة مستقيمة

$$س = \frac{س_١ + س_٢}{٢} \quad ، \quad ص = \frac{ص_١ + ص_٢}{٢}$$

أ. معتصم ريحان 00972598709519

[13] الهرم الرباعي المنتظم

المساحة الجانبية = ٢ × طول القاعدة × الارتفاع الجانبي للهرم

المساحة الكلية = ٢ × القاعدة × الارتفاع الجانبي + (طول ضلع القاعدة)

حجم الهرم الرباعي المنتظم = $\frac{١}{٣}$ × مساحة القاعدة × الارتفاع الرأسي.

[14] إذا تشابه مثلثان فإن زواياهم متساوية وأطوال أضلاعهم المتناظرة أطوالها متناسبة

الأضلاع متناسبة

$$\frac{ب ج}{ع ص} = \frac{أ ج}{ع ل} = \frac{أ ب}{ل ص}$$

[15] النقطة (أ، ب)

أ هو المقطع السيني وهو بعد العدد أ عن محور الصادات.

ب هو المقطع الصادي وهو بعد العدد ب عن محور السينات.




أ. معتصم ريحان / تابعني على الفيس واليوتيوب / معتصم فاضل أونه لا يفهم مميزة



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

## ⊛ خطوات حل أي سؤال تطبيقات على القيم القصوى :-

1) أرسم أولاً حسب معطيات السؤال وركز في الرسم يا فنان .
2) حدد المعادلة الأساسية وحدد المعادلة المساعدة .

لمعرفة المعادلة أيّ العلاقة الأساسية يكون موجود فيها أكبر أو أقل أو أي كلمة على وزن أفعل تدل على أكبر شيء أو أصغر شيء .

أ. مقصم ريحان
00972598709519

3) وحد الرموز في المعادلة الأساسية .
4) اشتق وساوي بصفر .
5) افحص النقطة الناتجة هل هي عظمى أم صغرى وهنا السؤال بيغشش .

أ. مقصم ريحان
تابعنا على الفيس واليوتيوب
مقصم خاطف أونة الأسير

6) جد المطلوب منه السؤال .
7) صلى على النبي .

⊛ إذا بدك كل الخطوات بمقولة وحدة على شانه تسهل عليك الحفظ انتفضل يا حبيبي . ولا

**ارسم علاقتين برموز موحدة واشتق وصفر**

أ. مقصم ريحان
وافحص
وجد المطلوب .

**مثال ①** / ص 86 / عددان موجبان مجموعهما ٦٠ ، جد العددين إذا كان حاصل ضربهما أكبر ما يمكن .

الحل / نفرض العددين س ، ص

أ. مقصم ريحان

بدنا علاقتين

الأساسية: م = س × ص ← حاصل ضربهما

المساعدة: س + ص = ٦٠ ← ص = ٦٠ − س

وهنا نوحد الرموز

م = س × (٦٠ − س)

م = ٦٠س − س²

م' = ٦٠ − ٢س = صفر

∴ س = ٣٠ ← أرجع نوضح موجب

ص = ٣٠ ← العدد الثاني

⊛ ماشي تتحقق إما باختبار المشتقة الأولى أو الثانية

عند س = ٣٠ مرة بتقل

م' (+ + + | ٣٠ | − − − −)

العددان هما (٣٠) ، (٣٠)



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال (2) ص 84

يُراد صنع صندوق هدايا قاعدته مربعة الشكل من الكرتون المقوى حجمه ٨ دسم$^3$، جد أبعاده بحيث تكون تكلفة تصنيعه أقل ما يمكن (١ جـ للمتر المربع)

نريد علاقتين

للتكلفة

التكلفة أقل ما يمكن

نريد أولاً أن نجد كمية الكرتون المطلوبة وذلك تجد المساحة الكلية للصندوق

= مساحة الجوانب + مساحة القاعدتين

$ت = ٤ \times (س \times ص) + ٢ س^2$

قاعدة

الحجم = الطول × العرض × الارتفاع

$٨ = س \times س \times ص$

$٨ = س^2 ص$

$ص = \frac{٨}{س^2}$

يلا نروح لمجهول واحد

$ت = ٤ \times (س \times \frac{٨}{س^2}) + ٢ س^2$

$ت = \frac{٣٢}{س} + ٢ س^2$ ⟸ بلا اشتقاق جزء $ت = \frac{-٣٢}{س^2} + ٤ س$

⟸ $٤ س = \frac{٣٢}{س^2}$ ⟸ $س^3 = ٨$ ⟸ $س = ٢$ دسم

ت: − − − | + + + ، عند $س = ٢$ (مهمة حفري محلية ومطلقة عند $س = ٢$)

القاعدة مربعة

الشكل له ٤ جوانب وقاعدتين ربعتين

ص

س

س

(*) التكلفة تكون أقل ما يمكن عندما تكون قاعدة الصندوق مربعة طول ضلعها ٢ دسم وارتفاع الصندوق ٢ دسم يعني يصبح الشكل مكعب منتظم

(*) عندما ترى أي سؤال في الامتحان عن تطبيقات القيم القصوى اقرأ السؤال جيداً وأمزقه أولاً.

(*) وإذا بدك تعرف السؤال أنه عن درس تطبيقات القيم القصوى ستجد مثل كلمة عن وزنه أفعل مثل (أكبر أو أصغر أو أقل ما يمكن أو أكبر ما يمكن)

أ. معتصم ريحاني / حصص خاصة أونلاين ميزة Zoom
00972598709519

ص ٦



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال (3) ص 85

جد أقصر مسافة بين النقطة ك (٠،٢) ومنحنى العلاقة $ص^2 - س = 8$




أرسم علاقتين بمتغيرين موجبة واشتق

الحل

نريد علاقتين

للاشتقاق

أ. معتصم ريحان

مساعدة

نعطر منحنى العلاقة

$ص^2 - س = 8$

$\Leftarrow ص^2 = 8 + س$

يلا نروح نوحد الرموز

أقصر مسافة بين نقطتين

(٠،٢) ، (س، ص)

$ف = \sqrt{(س_2 - س_1)^2 + (ص_2 - ص_1)^2}$

$ف = \sqrt{(س - ٠)^2 + (ص - ٢)^2}$

$ف = \sqrt{س^2 + (ص - ٢)^2}$

$ف = \sqrt{8 + س^2 + (ص - ٢)^2}$

$ف = \sqrt{8 + س^2 + ص^2 - ٤ص + ٤}$

$ف = \sqrt{٢س^2 - ٤ص + ١٢}$

شايف المعادلة صارت ما أحلاها
يلا اشتق وحل

$ف' = \frac{٤س - ٤}{٢\sqrt{٢س^2 - ٤ص + ١٢}} = صفر \Leftarrow ٤س - ٤ = ٠ \Leftarrow س = ١$ #

الآن بنرجع نعوض لإيجاد ص $\Leftarrow ص = \sqrt{8 + س^2} \Leftarrow ص^2 = 9$

$\Leftarrow ص = \pm ٣$ #

أ. معتصم ريحان / تابعين على الفيس واليوتيوب

الآن المطلوب أقصر مسافة يعني بنرجع نعوض في قانون المسافة

$ف = \sqrt{(س - ٢)^2 + ص^2} \Leftarrow ف = \sqrt{(١-٢)^2 + (٣)^2} \Leftarrow ف = \sqrt{١٠}$ وحدة #

أ. معتصم ريحان

خطوة الفحص باختبار المشتقة الأولى أو إذا بدك الثانية ضروري

$ف'(س)$ سالب | صفر | موجب

عند $س = ١$ صار عندي قيمة صغرى مطلقة

أ. معتصم ريحان


أ. معتصم ريحان
مواضيع خاصة أونلاينية
مميزة على الزووم
00972598709519
تابعين على الفيس واليوتيوب




تم المسح ضوئيا بـ CamScanner

مثال (٩) ص 86 / سلك طوله ٥٦ سم قُسِّم إلى جزئين ثُنِّي أحدهما على شكل مربع، والجزء الآخر على شكل دائرة، ما أبعاد كل منه المربع والدائرة ليكون مجموع مساحتيهما أقل ما يمكن ؟؟

أ. معتصم رحال

الحل






نريد علاقتين

مساعدة

أ. معتصم رحال
0097259870951 9

أساسية

مجموع مساحة الدائرة ومساحة المربع أقل ما يمكن

محيط المربع = ٤ × طول الضلع

محيط الدائرة = ٢ نق π

مساحة المربع = (الضلع)٢

مساحة الدائرة = π نق٢

٥٦ - س = ٤ ص

س = ٢ نق π

ص = (٥٦ - س) / ٤

نق = س / ٢π

ص = ١٤ - ¼ س

مساحة الدائرة = س٢ / ٤π

م = π نق٢ + ص٢

يلا نزوح توحيد المقام

م = π × س٢ / ٤π + (١٤ - ¼ س)٢

م = س٢ / ٤π + (١٤ - ¼ س)٢ ← يلا نشتق لأنه المعادلة أحلوت يا حلوين.

أ. معتصم رحال

م' = ٢س / ٤π + ٢ (١٤ - ¼ س) × (-¼) = صفر

م' = س / ٢π + ٢ - ½ س = صفر

م' = (½ + ١/٢π) س - ٧ = صفر ⇐ س = ٧ / (½ + ١/٢π) = (٨ + ٢π) / π

| س | ٠ | (٥٦π)/(٤+π) | ٥٦/٤ |
|---|---|---|---|
| م'(س) | - | ٠ | + |
| م(س) | ↓ | صغرى مطلقة | ↑ |

⇐ س = (٧ × ١٦π) / (٨ + ٢π) = ١١٢π / ٢(٤+π) = (٥٦π)/(٤+π) #

الآن نرجع نعوض لإيجاد نق ⇐ نق٢ = ((٥٦π)/(٤+π))٢ / ٤π ⇐ نق = (٥٦π)/(٤+π) / ٢π

نق = (٥٦π)/(٤+π) × ١/٢π = ٥٦/(٨ + ٢π) = ٢٨/(٤ + π)

ص = ١٤ - ¼ × س ⇐ ص = ١٤ - ¼ × (٥٦π)/(٤+π) = ١٤ - (١٤π)/(٤+π) = (١٤(٤+π) - ١٤π)/(٤+π) = ٥٦/(٤+π)

أ. معتصم رحال

ص ←



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال 5 / ص 86 أوجد أقل محيط ممكن لمستطيل مساحته ١٦ سم² .

نريد علاقتين

مسألة: أقل محيط ممكن لمستطيل

مساعدة: معطينا مساحة المستطيل




فرضنا طول المستطيل س
وعرض المستطيل ص

مساحة المستطيل = س × ص

محيط المستطيل = ٢ (س + ص)

مساحة المستطيل = س × ص

١٦ = س × ص

ص = ١٦ / س

وجدنا المجهول

م = ٢ (س + ص)

م = ٢ (س + ١٦/س)

م = ٢س + ٣٢/س

طبعاً السالب مرفوض لأننا نتكلم عن طول

س = ±٤ ⇐ س² = ١٦ ⇐ ٢س² = ٣٢ ⇐ م = ٠ ⇐ م = ٢ − ٣٢/س²

بالافتراض ونجيب ص = ١٦/س ⇐ ص = ١٦/٤ = ٤ (١)

م: − − − | + + +  (٤)

م معرفة عند س = ٤ وتأخذ قيمة صغرى مطلقة

∴ أقل محيط ص ١٦ سم

أ. معتصم ريحان تابعني لكل الفيس والبوتيوب

نشاط ٢ / ص 83 فكرة السؤال هي :

جد مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه في الربع الأول حيث يقع رأس على المستقيم ص = ٢س والرأس الآخر على المستقيم ص = ٤٢ − س ، والرأسان المتبقيان على محور السينات فجد مساحة المستطيل بحيث تكون مساحته أكبر ما يمكن




أ. معتصم ريحان

نريد علاقتين

مساعدة

مساحة المنتزه أكبر ما يمكن

م = الطول × العرض

م = (س − ك) × (٢٠ك)

محط ص = ٢٠ك

محط ص = ٤٢ − س

∴ ٢٠ك = ٤٢ − س

س = ٤٢ − ٢٠ك

م = ٢٠ك س − ٢٠ك²

م = ٢٠ك (٤٢ − ٢٠ك) − ٢٠ك²

م = ٨٤٠ك − ٤٠٠ك² − ٢٠ك²

م = − ٤٢٠ك² + ٨٤٠ك

م = − ٨٤٠ك + ٨٤٠ = ٠

ك = ١

أرجع لمجهول

م: + + + | − − −  (١)

عظمى عند ١

∴ س = ٤٢ − ٢٠ × ١

س = ٢٢

مساحة المنتزه = ٢٠ × ١ × ٢٢ − ٢٠ × ١²

= ٤٢٠ − ٢٠

= ٤٢٠ متر مربع




ص 7



تم مسحه ضوئيا بـ CamScanner

## ((حل أسئلة درس تطبيقات القيم القصوى))

تمارين ومسائل ك-٥ ص ٨٧ (2020 دورة ثانية)

س١/ يريد رجل عمل حديقة مستطيلة الشكل من أرضه وذلك بإحاطتها بسياج فإذا كان لديه ٨٠ متراً من الأسلاك، فما مساحة أكبر حديقة يمكن للرجل إحاطتها.

أ. معتصم ريحان

نريد علاقتان

الحديقة المجاورة

س، ص

المساعدة: محيط المستطيل = ٨٠

٢(س + ص) = ٨٠

س + ص = ٤٠

س = ٤٠ - ص

المسألة: مساحة أكبر حديقة

م = الطول × العرض

م = س × ص

م = (٤٠ - ص) × ص

م = ٤٠ ص - ص²

يلا نزوح نوحد الاسم

خطوة الفحص والتأكد

م' = ٤٠ - ٢ ص = صفر ⇐ ص = ٢٠

أرجع عوض في العلاقة المساعدة لايجاد س

∴ س = ٤٠ - ٢٠ = ٢٠

المطلوب المساحة الحديقة ⇐ م = س × ص ⇐ م = ٢٠ × ٢٠ = ٤٠٠ م²

(*) حصص خاصة أونة لاينه ميزة.

أ. معتصم ريحان

س٢/ ص ٨٧ ف ٢

مقلمة على شكل أسطوانة دائرية قائمة مفتوحة من أعلى سعتها ١٩٢ π سم³، فإذا علمت أن سعر كل ١ سم³ من البلاستيك المستخدم لصنع القاعدة، يعادل ثلاث أمثال سعر ١ سم³ من البلاستيك المستخدم في صنع الجوانب، جد أبعاد المقلمة ذات الأقل تكلفة.

نريد علاقتان

المسألة: مقلمة ذات تكلفة أقل

لاحظ أن تكلفة الجوانب تختلف عن تكلفة القاعدة.

بفرض لو فرضنا تكلفة ١ سم³ من بلاستيك الجوانب = س، فإن تكلفة ١ سم³ من بلاستيك القاعدة = ٣ س.

المساعدة: حجم الأسطوانة = π × نق² × ع

١٩٢ π = π نق² ع

ع = ١٩٢ / نق²

نكمل في الصفحة القادمة

أ. معتصم ريحان
حصص خاصة أونة لاينه ميزة
00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تابع حل سؤال 87 ص

نريد علاقتان

مساعدة ← أ. معتصم ريحان ← أساسية

ع = ١٩٢ / نق٢

تكلفة ١سم٢ من بلاستيك الجوانب = س

تكلفة ١سم٢ من بلاستيك القاعدة = ٣س

التكلفة الكلية = (تكلفة الجوانب) + (تكلفة القاعدة)

سعر تكلفة ١سم٢ من الجوانب ← س ، سعر تكلفة ١سم٢ من القاعدة ← ٣س

التكلفة الكلية = (س × محيط القاعدة × الارتفاع) + (٣س × مساحة الدائرة)

يلا نوحد الرموز

التكلفة الكلية = (س × ٢ π نق × ع) + (٣س × π نق٢)

أ. معتصم ريحان

التكلفة الكلية = (س × ٢π نق × ١٩٢/نق٢) + (٣س × π نق٢)

سنشتق بالنسبة لـ نق ← التكلفة الكلية = ٣٨٤س π / نق + ٣س × π نق٢

س ، π ثوابت

ت'ك = -٣٨٤س π / نق٢ + ٦س × π نق = صفر

* ظطرة التأكد

ت'ك = ٣٨٤س π / نق٢ = ٦س π نق ⇐ نق = ٦٤ / نق٢

-- ٤ ++

جذر مطلقة يساوي نق = ٤

أرجع لفرض من المسألة المساعدة للحصول على ارتفاع المقلمة

⇐ نق٣ = ٦٤ ⇐ نق = ٤

∴ ع = ١٩٢/نق٢ ⇐ ع = ١٩٢/(٤)٢ = ١٢

أ. معتصم ريحان

* المطلوب أبعاد المقلمة التي تجعل تكلفتها أقل ما يمكن وهي

نق = ٤
ع = ١٢

أ. معتصم ريحان
تابعنا على الفيس واليوتيوب
حصص خاصة أونلاين مميزة
00972598709519

ص ٢



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

س 3 / ص 87

لطريق منحنٍ معادلته في المستوى الديكارتي ص = م(س) = ٢س - ١
النقطة م (٠،٣) تمثل موقع مستشفى، يُراد شق شارع فرعي مستقيم من النقطة (و) إلى موقع المستشفى (م) عيّن إحداثيات النقطة (و) ليكون طول الشارع (وم) أقل ما يمكن. (انظر إلى الشكل المجاور)




نريد ملاقاته
أي معتصم ريحان

قانون المسافة بين نقطتين

المسألة
المسافة بين النقطتين (و)، (م) أقل ما يمكن

مساعدة
لطريق منحنٍ معادلته
ص = ٢س - ١
ربع الطرفين
ص² = ٢س - ١

ف = √(ص - ص١)² + (س - س١)²

ف = √(ص - ٠)² + (س - ٣)²

ف = √ص² + س² - ٦س + ٩

ف = √٢س - ١ + س² - ٦س + ٩

⇐ ف = √س² - ٤س + ٨

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس مايوستيوب
حصص خاصة أونلاين

بلا زد ح نوجد المعوز

ف' = (٢س - ٤) / (٢√س² - ٤س + ٨) = صفر ⇐ ٢س - ٤ = ٠ ⇐ س = ٢

خطوة الفحص في ف'

- - - - | + + +
٢

قيمة حرجة محلية ومطلقة.

نجمع الآن على العلاقة المساعدة لإيجاد قيمة ص

ص² = ٢ × س - ١
ص² = ٢ × ٢ - ١ ... ③
∴ ص = ٣

السالب مرفوض لأننا نتعامل مع أطوال

أ. معتصم ريحان

المطلوب: إحداثيات النقطة و هي (٢، ٣)
وعندها سيكون طول الشارع (وم) أقل ما يمكن.

أ. معتصم ريحان
00972598709519

ص 3


ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

جسم يسير في خط مستقيم بحيث إن بعده ف بالأمتار بعد ن ثانية يُعطى بالعلاقة ف = أ جتا $\frac{\pi}{4}$ ن + ب جا $\frac{\pi}{4}$ ن
فإذا كانت السرعة المتوسطة للجسم في الفترة الزمنية [٠، ٢] تساوي ١٠ م/ث
وكانت سرعة الجسم أقل ما يمكن عندما ن = ١ ث أوجد الثابتين أ ، ب .

نريد علامتان

أ. معتصم ريحان

مساعدة .

السرعة المتوسطة = $\frac{\Delta ف}{\Delta ن}$ = $\frac{ف(ن_٢) - ف(ن_١)}{ن_٢ - ن_١}$

$\Leftarrow \frac{\Delta ف}{\Delta ن} = \frac{ف(٢) - ف(٠)}{٢ - ٠}$ = ١٠ م/ث

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس واليوتيوب

المسألة

سرعة الجسم أقل ما يمكن عندما ن = ١ ث
السرعة هي مشتقة المسافة
ف = أ جتا $\frac{\pi}{4}$ ن + ب جا $\frac{\pi}{4}$ ن
نشتق لإيجاد معادلة السرعة

ف' = ع = أ × (- جا $\frac{\pi}{4}$ ن) × ($\frac{\pi}{4}$) + ب × (جتا $\frac{\pi}{4}$ ن) × $\frac{\pi}{4}$

ف' = ع = $-\frac{\pi}{4}$ أ جا $\frac{\pi}{4}$ ن + $\frac{\pi}{4}$ ب جتا $\frac{\pi}{4}$ ن (تبسيط)

لاحظ هنا الرموز موحدة لأنه $\frac{\pi}{4}$ ، أ تواب
بلا تشتق وتساوي صفر

ف'' = ع' = ت = $-\frac{\pi^٢}{١٦}$ أ جتا $\frac{\pi}{4}$ ن + $\frac{\pi^٢}{١٦}$ ب جا $\frac{\pi}{4}$ ن

نعلم في السؤال أن سرعة الجسم أقل ما يمكن
عندما ن = ١ ∴ يلا نعوض مكانه كل ن في (١)

∴ ع(١) = $-\frac{\pi^٢}{١٦}$ أ جتا $\frac{\pi}{4}$ − $\frac{\pi^٢}{١٦}$ ب جا $\frac{\pi}{4}$ = صفر

$\frac{١}{\sqrt{٢}} \times \frac{\pi^٢}{١٦}$ ب = $\frac{١}{\sqrt{٢}} \times \frac{\pi^٢}{١٦}$ أ

ب = أ

ونعلم أن ⟸ أ + ب = صفر ... (١)

أ. معتصم ريحان
تابعني على الفيس واليوتيوب

= $\frac{(\text{أ جتا}\frac{\pi}{4} + \text{ب جا}\frac{\pi}{4}) - (\text{أ جتا}(٠) + \text{ب جا}(٠))}{٢}$ = ١٠

= $\frac{(\text{صفر} + \text{ب}) - (\text{أ} + \text{صفر})}{٢}$ = ١٠

⟸ ب − أ = ٢٠ ... (٢) #

أ. معتصم ريحان
حصص خاصة أونلاين مميزة
0097259870951 9

نحل معادلة (١) مع (٢) بالحذف

ب − أ = ٢٠
ب + أ = صفر (أجمع مباشرة)

٢ب = ٢٠

ب = ١٠ ومنها أ = −١٠ #



Camscanner

س 5 / ص 87 في الساعة الثانية عشرة ظهراً كانت الباخرة ب على بعد ٣٠ كم شمال الباخرة P وتسير غرباً بسرعة ١٠ كم/ساعة، فإذا كانت P تسير شمالاً بسرعة ٢٠ كم في الساعة فمتى تكون المسافة بين الباخرتين أقل ما يمكنه.

نريد علاقتان




أ. معتصم ريحان

المساعدة

ⓐ الباخرة P تسير شمالاً بسرعة ٢٠ كم/ساعة

ⓑ الباخرة ب تسير غرباً بسرعة ١٠ كم/ساعة

قانون المسافة = السرعة × الزمن

∴ المسافة التي تسيرها الباخرة ب = ١٠ن × ن

∴ المسافة التي تسيرها الباخرة P = ٢٠ × ن

∴ س = ١٠ن
∴ ص = ٢٠ن

بلا نوحد الرموز

الزمن

أ. معتصم ريحان

الحل

المسافة بين الباخرتين أقل ما يمكنه.

حسب فيثاغورس

$ف^2 = (٣٠ - ص)^2 + (س)^2$

$ف^2 = (٣٠ - ٢٠ن)^2 + (١٠ن)^2$

$ف^2 = ٩٠٠ - ١٢٠٠ن + ٤٠٠ن^2 + ١٠٠ن^2$

$ف^2 = ٥٠٠ن^2 - ١٢٠٠ن + ٩٠٠$

الآن نشتق ونساوي بصفر

$2ف \frac{ف}{ن} = ١٠٠٠ن - ١٢٠٠$

صفر $= ١٠٠٠ن - ١٢٠٠$

$ن = \frac{١٢٠٠}{١٠٠٠}$ ⟸ $ن = ١٫٢$

اشتقينا بالنسبة للزمن (ن)

أ. معتصم ريحان

∴ المسافة بين الباخرتين أقل ما يمكنه بعد تحركهما بمقدار (١٫٢) ساعة

∴ المسافة بين الباخرتين أقل ما يمكنه الساعة الواحدة و ١٢ دقيقة.

---

س 6 / ص 87 جد حجم أكبر اسطوانة دائرية قائمة يمكنها رضعها داخل مخروط دائري قائم ارتفاعه ١٢ سم ونصف قطر قاعدته ٤ سم

نريد علاقتان




أ. معتصم ريحان

المساعدة

مخروط قائم ارتفاعه ١٢ سم ونقـ ٤ سم

بلا نوحد الرموز

الحل

جد حجم أكبر اسطوانة

حجم الاسطوانة = $\pi$ نقـ$^2$ ع

حجم الاسطوانة = $\pi$ نقـ$^2$ × (١٢ - ٣نقـ)

حجم الاسطوانة = ١٢ $\pi$ نقـ$^2$ - ٣ $\pi$ نقـ$^3$

$\frac{ح}{ح} = ٢٤\pi$ نقـ - ٩ $\pi$ نقـ$^2$ = ٠

٣ $\pi$ نقـ (٨ - ٣نقـ) = ٠

نقـ = ٠ أو نقـ = $\frac{٨}{٣}$

مرفوض

$\frac{نقـ}{٤} = \frac{١٢ - ع}{١٢}$

١٢ نقـ = ٤٨ - ٤ع

ع = ١٢ - ٣نقـ

∴ حجم الاسطوانة = $\frac{٨}{٣}\pi ٣ - (\frac{٨}{٣})^2$ = $\frac{٢٥٦\pi}{٩}$ سم$^3$

ص 5

أ. معتصم ريحان 00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ص ٨٧ / ٧ / ٥ شبه منحرف فيه ٣ أضلاع متساوية في الطول وطول كل منها ٦ سم ، جد أكبر مساحة ممكنة لشبه المنحرف

الحل




نزيد علامتان

لحساب مساحة أكبر مساحة لشبه المنحرف

حسب نظرية فيثاغورس

فإنه $ع^2 = ٣٦ - س^2$

مساحة شبه المنحرف $= \frac{1}{2} \times$ (مجموع القاعدتين المتوازيتين) $\times$ ع

$م = \frac{1}{2} \times (٦ + ٦ + س + س) \times ع$

$م = (٦ + س) \times ع$

$م = (٦ + س) \times \sqrt{٣٦ - س^2}$

بداية حصة رقم (٩١) الجزء الثاني

يلاحظ وجود الرموز

أ. معتصم رحال

تابعني على الفيس والبيوتيوب

00972598709519

يلاحظ تشابه ومساواة جذر

$م' = (٦ + س) \times \frac{-٢س}{٢\sqrt{٣٦ - س^2}} + \sqrt{٣٦ - س^2} \times (١) =$ جذر

خذ بناظر في المعادلة من $\sqrt{٣٦ - س^2}$

$م' = -س(٦ + س) + (٣٦ - س^2) =$ جذر

$م' = -٦س - س^2 + ٣٦ - س^2 =$ جذر

$م' = -٢س^2 - ٦س + ٣٦ = ٠$

$م' = س^2 + ٣س - ١٨ =$ جذر

$س = -٦$ أو $س = ٣$ مرفوض




$\therefore$ المساحة $= (٦ + ٣) \times \sqrt{٣٦ - ٣^2}$

$= ٩ \times \sqrt{٢٧} = ٣\sqrt{٢٧} = ٣\sqrt{٣ \times ٩} = ٩\sqrt{٣}$ سم$^2$ #

أ. معتصم رحال

مصمم خاصة أونر لاين مميزة

تابعني على الفيس والبيوتيوب



camscanner

س 8 / ص 87 | أ ب ج د مستطيل عرضه أ ب = ٨ سم وطوله ب ج = ١٠ سم، م نقطة على الضلع أ ب بحيث أ م = س سم، ن نقطة على الضلع ب ج بحيث ن ج = $\frac{3}{2}$ س سم جد قيمة س بحيث تكون مساحة المثلث م ن ج أكبر ما يمكن




نريد علاقة

لا نهائية — مساعدة

مساحة المثلث أكبر ما يمكن

مساحة Δ = $\frac{1}{2}$ × القاعدة × ع

مساحة Δ = $\frac{1}{2}$ × (ن ج) × (م ب)

م Δ = $\frac{1}{2}$ × ($\frac{3}{2}$ س) × (٨ − س)

م Δ = $\frac{3}{4}$ س × (٨ − س) ⟸ م Δ = ٦ س − $\frac{3}{4}$ س²

نظل

م ++++ ---- ٤

⟸ م = ٦ − $\frac{6}{4}$ س = ٠ ⟸ س = ٤

∴ س = ٤ التي تجعل مساحة المثلث أكبر ما يمكن ⟸ س = ٤

ومساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ × ($\frac{3}{2}$ × ٤) × (٨ − ٤) = ١٢ سم² #

أ. معتصم ريحان

ص 13 / جد مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه بحيث يقع رأساه منه رؤوسه على محور السينات والرأسان الآخران على منحنى الاقتران م(س) = ٨ − $\frac{1}{2}$ س²




الحل

نريد علاقة

لا نهائية — مساعدة

مساحة أكبر مستطيل

م = ٢ س × ص

منحنى الاقتران م(س) = ٨ − $\frac{1}{2}$ س²

بالتعويض ∴ ص = ٨ − $\frac{1}{2}$ س²

م = ٢ س × (٨ − $\frac{1}{2}$ س²)

م = ١٦ س − $\frac{1}{2}$ س³

م' = ١٦ − ٣ س² = ٠

∴ س = ±٢ (السالب مرفوض لأن س > ٠)

نظل − ++ − ٢

∴ عندما س = ٢ يوجد نهاية عظمى محلية.

مساحة المستطيل = ٢ س × ص

مساحة المستطيل = ٢ × ٢ × (٨ − $\frac{8}{2}$)

٤ × ($\frac{24-8}{2}$)

٤ × $\frac{16}{2}$ = $\frac{64}{2}$

أ. معتصم ريحان

ص 7



CamScanner به صوتيا

2016 س / أوجد باستخدام التفاضل أكبر حجم للشكل الناتج من دوران مستطيل محيطه ٦٠ سم دورة كاملة حول أحد أضلاعه أ. معتصم ريحان تابعنا على الفيس واليوتيوب

نريد علاقتان

المسألة: الشكل الناتج من دوران المستطيل هو اسطوانة.

أكبر حجم للشكل يعني لا

حجم الأسطوانة = مساحة القاعدة × ع

حجم الاسطوانة = ٣٣ نق$^{٢}$ × ع

ح = ٣٣ ص$^{٢}$ × س

ح = ٣٣ ص$^{٢}$ × (٣٠ − ص)

ح = ٣٠ ٣٣ ص$^{٢}$ − ٣٣ ص$^{٣}$

ح$'$ = ٦٠ ٣٣ ص − ٣ ٣٣ ص$^{٢}$ = ٠ ⇐ ٣ ٣٣ ص (٢٠ − ص) = ٠

∴ ص = ٢٠ ومرفوضة

ص = ١٠

المطلوب ⇐ حجم الاسطوانة = ٣٣ ص$^{٢}$ × ع = ٣٣ × (١٠)$^{٢}$ × ٢٠ = ٤٠٠ ٣٣

مساعدة: محيط المستطيل = ٦٠ سم

٢ (الطول + العرض) = ٦٠

٢ (س + ص) = ٦٠

س + ص = ٣٠

س = ٣٠ − ص

يلا نروح نوحد المتغير

(*) عرض المستطيل ص يصبح نصف القطر الاسطوانة

(*) وطول المستطيل س يصبح ارتفاع الاسطوانة






2016 اكمال س / جد أقرب نقطة واقعة على المنحنى ص = ٢ س − ١ إلى النقطة م (٠، ٢)

نريد علاقتان

المسألة: أقرب نقطة واقعة على المنحنى

نفرض ان النقطة هي ب (س، ص)

ف = $\sqrt{(ص_{٢} - ص_{١})^{٢} + (س_{٢} - س_{١})^{٢}}$

ف = $\sqrt{(ص - ٠)^{٢} + (س - ٢)^{٢}}$

ف = $\sqrt{ص^{٢} + س^{٢} - ٤ س + ٤}$

ف = $\sqrt{٢ س - ١ + س^{٢} - ٤ س + ٤}$

ف = $\sqrt{س^{٢} - ٢ س + ٣}$

ف$'$ = $\frac{٢ س - ٢}{٢ \sqrt{س^{٢} - ٢ س + ٣}}$ = صفر

٢ س − ٢ = ٠ ⇐ س = ١

ص = ٢ − ١

ص = ١

∴ النقطة هي (١، ١)

مساعدة: النقطة المطلوبة واقعة على المنحنى

ص = ٢ س − ١

بربع الطرفين

ص$^{٢}$ = س − ١

يلا نروح نوحد المتغير

أ. معتصم ريحان

خصص خاصة أونه لانيه مميزة

تابعنا على الفيس واليوتيوب

00972598709519




المشتقة سالب صفر اذا كانت البسط يساوي صفر

٢ س − ٣ = ٠ ⇐ س = $\frac{٣}{٢}$






CamScanner

2016 / كمالي) سلك طوله ٥٦ سم قُسم إلى جزأين، صنع من احدهما مربع ومن الآخر مستطيل طوله يساوي ٣ أمثال عرضه، ما أبعاد المربع والمستطيل ليكون مجموع مساحتيهما أقل ما يمكن.

أ. معتصم رحال




نريد علاقة بـ
مساحة ∎ + مساحة ∎
المطلوب
ما أبعاد المربع والمستطيل ليكون مجموع مساحتيهما أقل ما يمكن
مجموع مساحتيهما = مساحة المربع + مساحة المستطيل

محيط المربع + المستطيل يساوي طول السلك

نرضنا طول ضلع المربع ص
وعرض المستطيل س
وطوله المستطيل ٣س

$٤ص + ٢(س + ٣س) = ٥٦$

$٤ص + ٨س = ٥٦$

$ص = \frac{٥٦ - ٨س}{٤}$

$ص = ١٤ - ٢س$

$م = ص^٢ + ٣س^٢$

$م = (١٤ - ٢س)^٢ + ٣س^٢$

$م = ١٩٦ - ٥٦س + ٤س^٢ + ٣س^٢$

$م = ٧س^٢ - ٥٦س + ١٩٦$

$م' = ١٤س - ٥٦ = ٠ \Leftarrow س = ٤$

$\therefore ص = ١٤ - ٢ \times ٤ = ٦$

$\therefore$ طول ضلع المربع = ٦ طول المستطيل = ١٢ عرض المستطيل = ٤

أ. معتصم رحال
مصر خامد اونة لاسيمزة
0097259870951

يلا نوحد الرموز

أ. معتصم رحال

نقطة حرجة محلية عندها.

أ. معتصم رحال

2016 / أب جـ مثلث قائم الزاوية في ب إذا كان طول أب = ٢ سم وطول ب جـ = ٣ سم، د نقطة على ب جـ، أوجد طول دجـ بحيث يكون مجموع طول (دجـ) ومثلي طول (أد) أقل ما يمكن.

الحل

نريد علاقة بـ
مساعدة
المطلوب
مجموع طول دجـ ومثلي طول أد أقل ما يمكن.

أب = ٢ سم، ب جـ = ٣ سم

نفرض ب د = س

$\therefore$ دجـ = ٣ - س

مجموع الأطوال = دجـ + ٢(أد)

$ل = (٣ - س) + ٢\sqrt{٤ + س^٢}$

$(أد)^٢ = (أب)^٢ + (ب د)^٢$

$(أد)^٢ = ٤ + س^٢$

$أد = \sqrt{٤ + س^٢}$

$ل' = -١ + ٢ \times \frac{٢س}{٢\sqrt{٤ + س^٢}} = ٠$

$ل' = \frac{٢س}{\sqrt{٤ + س^٢}} = ١$

$٤ + س^٢ = ٤س^٢$

$٣س^٢ = ٤$

$س^٢ = \frac{٤}{٣}$

$س = \frac{٢}{\sqrt{٣}}$

المطلوب طول (دجـ) = $٣ - \frac{٢}{\sqrt{٣}}$

أ. معتصم رحال

ص ٩



Camscanner بـ صوتيا حة

أ. مقصم ريحان

توجيهي علمي 2022

## ⊛ حل أسئلة امتحانات سابقة ⊛

## ⊛ التطبيقات العملية على القيم القصوى ⊛

**2017 ش** / أرض مستطيلة الشكل رؤوسها P ب ج د تتكون منه حديقة مستطيلة الشكل مساحتها ٣٢٠٠ متر مربع محاطة بأرصفة عرض كل من الرصيفين P ب ، ج د يساوي ٤ متر وعرض كل من الرصيفين P د ، ب ج يساوي ٢ متر أوجد أقل مساحة ممكنة لقطعة الأرض .




نريد علاقتان

مساعدة

مساحة الحديقة ٣٢٠٠

$س \times ص = 3200$

$ص = \frac{3200}{س}$

نفرض طول الحديقة س

نفرض عرض الحديقة ص

لا نوحد الرموز

أقل مساحة ممكنة لقطع الأرض

مساحة الأرض = (الطول + ٤ + ٤) × (العرض + ٢ + ٢)

$م = (س + 4 + 4) \times (ص + 2 + 2)$

$م = (س + 8) \times (ص + 4)$

$م = (س + 8) \times \left(\frac{3200}{س} + 4\right)$

$م = (س + 8) \times \left(\frac{3200}{س}\right) + (س + 8) \times (4)$

$م' = (س + 8) \times \left(\frac{-3200}{س^2}\right) + \left(\frac{3200}{س} + 4\right) \times (1)$

$م' = \frac{-3200}{س} - \frac{25600}{س^2} + \frac{3200}{س} + 4 = 0 \Leftarrow$

$\frac{-25600}{س^2} = -4 \Leftarrow س^2 = 6400 \Leftarrow س = 80$

| م' | --- | 0 | +++ |
|---|---|---|---|
| | ↓ | 80 | ↑ |

م

$ص = \frac{3200}{80} = 40$

أ. مقصم ريحان

المطلوب مساحة الأرض = $(س + 8)(ص + 4) = (88)(44) = 3872$ متر مربع

---

**2018 ش** / P ب ج مثلث قائم الزاوية في ب ومتساوي الساقين ، طول P ج = ١٢ سم

ما مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه داخل المثلث بحيث ينطبق أحد أضلاعه على الوتر P ج ، ويقع الرأسان الآخران على ضلعي القائمة .




نريد علاقتان

مساعدة

طول الوتر (P ج) = ١٢ سم

$\therefore ص + س + ص = 12$ سم

$2ص + س = 12$ سم

$س = 12 - 2ص$

لا نوحد الرموز

أ. مقصم ريحان

لبناء

مساحة المستطيل = الطول × العرض

$م = س \times ص$

$م = (12 - 2ص) \times ص$

$م = 12ص - 2ص^2$

$م' = 12 - 4ص = 0 \Leftarrow ص = 3$

خطوة الفحص ضرورية

ومنها $س = 12 - 2 \times 3 = 6$

| م' | +++ | 0 | --- |
|---|---|---|---|
| | ↑ | 3 | ↓ |

م

المطلوب مساحة المستطيل = $س \times ص = 6 \times 3 = 18$ سم²

أ. مقصم ريحان / تابعني على الفيس والبوتيوب /



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2019 تتحرك النقطة (س، ص) على منحنى الاقتران ق(س) بحيث ميل المماس عندها من أي لحظة يساوي ١٢س - ٣س² ، س > ٠ جد أكبر مساحة ممكنة للمثلث أ ب و حيث (و) نقطة الأصل.




نفرض قاعدة المثلث (ب و) (س)

نفرض ارتفاع المثلث (ب م) (ص)

أ. معتصم ريحان

حصص خاصة أونلاين مميزة

توجيهي علمي 2022

تابعني على الفيس واليوتيوب

نريد علاقتانة

أ. معتصم ريحان

مساعدة

ميل المماس = ١٢س - ٣س²

∴ ق(س) = ١٢س - ٣س²

ميل المماس من طريق النقطتين

(٠،٠) ، (س، ص)

م = (ص - ٠)/(س - ٠) = ص/س

نساوي الميلانين ببعضهما

١٢س - ٣س² = ص/س

بلا زوج نوجد الرؤوس

ص = ١٢س² - ٣س³

علاقة أخيرة

أكبر مساحة ممكنة للمثلث أ ب و

مساحة المثلث = ١/٢ × (القاعدة) × الارتفاع

مساحة المثلث = ١/٢ × س × ص

م = ١/٢ × س × (١٢س² - ٣س³)

م = ٦س³ - ٣/٢ س⁴

م' = ١٨س² - ٦س³ = ٠

س² (١٨ - ٦س) = ٠

س = ٠ (مرفوض) ، س = ٣

ومنها ص = ١٢(٣)² - ٣(٣)³ = (٢٧)

∴ عند س = ٣ يحقق عظمى محلية

المطلوب ← مساحة المستطيل = ٦(٣)³ - ٣/٢ (٣)⁴ = ٥٤/٢

| م | + + + | ٣ | - - - |
|---|---|---|---|

أ. معتصم ريحان 00972598709519

2019 دورتان ثني سلك طوله ١٢ سم ليكون مثلث متساوي الساقين جد أطوال أضلاع المثلث والتي تجعل مساحته أكبر ما يمكن

سلك طوله ١٢ سم

أ. معتصم ريحان

نريد علاقتانة

علاقة أخيرة

مساعدة

محيط المثلث = ١٢ سم

∴ ٢س + ٢ص = ١٢

∴ ٢ص = ١٢ - ٢س

∴ ص = ٦ - س

بلا زوج نوجد الرؤوس

مساحة المثلث أكبر ما يمكن

م = ١/٢ × القاعدة × الارتفاع

م = ١/٢ × ٢س × √(ص² - س²)

م = س √((٦ - س)² - س²)

م = س √(٣٦ - ١٢س + س² - س²)

م = س √(٣٦ - ١٢س)

م' = س × (-١٢)/(٢√(٣٦ - ١٢س)) + √(٣٦ - ١٢س) × (١) = صفر

نشتقينا مقامة الضرب

← -٦س + ٣٦ - ١٢س = صفر ← -١٨س = -٣٦ ← س = ٢ ∴ ص = ٤

المطلوب ← أبعاد المستطيل ٤، ٤، ٤

ص ص س س

منه فيثاغورس

ع² = ص² - س²

ع = √(ص² - س²)

| م | + + + | ٢ | - - - |
|---|---|---|---|



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2020 س) أوجد مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه في الربع الأول بحيث يقع أحد رأسيه على محور السينات، أما الرأسان الآخران، فأحدهما يقع على المستقيم ص = ٢٠ - س، والآخر على المستقيم ص = ٤٢ - س

نريد علامتان

أ. معتصم ريحان

المساعدة




منه الرسم :-

* النقطة ب احداثياتها (٤٢، ٠)
* النقطة جـ احداثياتها (٠،٠)
* لإيجاد احداثيات النقطة P مساوي معادلتي المستقيمين

٤٢ - س = ٢٠ - س

٢س = ٤٢ ⇐ س = ٢١

∴ احداثيات P هي (٢١، ٢٠)

أ. معتصم ريحان

منه الرسم طول ب جـ = ٤٢




منه الشكل ارتفاع المثلث P وك يساوي (٤٠ - ص)

المثلث الصغير P وك يشابه المثلث الكبير P ب جـ

لأنه فيهما ∠ P مشتركة

وفيهما ∠ P وك = ∠ P ب جـ

وفيهما ∠ P ك و = ∠ P جـ ب

ينتج من التشابه

ارتفاع المثلث الصغير / ارتفاع المثلث الكبير = (٤٠ - ص) / ٤٠ = س / ٤٢

مساحة أكبر مستطيل

م = س × ص

أ. معتصم ريحان

م = [٤٢ (٤٠ - ص) / ٤٠] × ص

م = [(١٦٨٠ - ٤٢ ص) / ٤٠] × ص

م = ١/٤٠ × (١٦٨٠ ص - ٤٢ ص^٢)

م' = ١/٤٠ × (١٦٨٠ - ٨٤ ص) = ص

م' = ١٦٨٠ - ٨٤ ص = ٠

ص = ١٦٨٠ / ٨٤ = ٢٠

عظمى

* عوض لإيجاد س

س = ٤٢ (٤٠ - ٢٠) / ٤٠

∴ س = ٢١

س = ٤٢ (٤٠ - ص) / ٤٠

بالنسبة لتوحيد الرموز

خطوة الفحص

عظمى

أ. معتصم ريحان

* المطلوب ⇐ مساحة أكبر مستطيل م = س × ص = ٢١ × ٢٠ = ٤٢٠ وحدة مربعة

* من هذا السؤال العلامة المساعدة هي التي كانت الأصعب في الحصول عليها وعلى رأي المثل جبناك يا عبد المعين تعين لقيناك بدك معين.

وحدة الأسئلة التي تكون أصعب في الامتحان ودائماً ركز كيف تحصل م للمعادلة المساعدة.

أ. معتصم ريحان

متعب خاصة أونه لاينه مميزة

تابعني على الفيس واليوتيوب

00972598709519

أحضر ميديو الحصة كمانه مرة حتفهم السؤال جيداً

ص 3



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أوجد مساحة أكبر شبه منحرف متساوي الساقين يمكن رسمه داخل منحنى الاقتران
$م(س) = 16 - س^2$ بحيث أن رؤوسه أحد الاقتران، والرأسين الآخرين
يقعان على منحنى الاقتران $م(س)$ فوق محور السينات

ارسم العلاقتين برمز
موحدة واشتقه وحل

نريد علاقتان

مساحة أكبر شبة منحرف

$م = \frac{1}{2}$ (مجموع القاعدتين المتوازيتين) × الارتفاع

$م = \frac{1}{2}(8 + 2س) \times ص$

$م = (4 + س) \times \sqrt{16 - س^2}$

$م' = (1) \times \frac{-2س}{2\sqrt{16-س^2}} + \sqrt{16-س^2} \times (1)$

$م' = \frac{-س^2 - 4س + 16}{\sqrt{16-س^2}} = 0$

$م' = -س^2 - 4س + 16 = 0$

$م' = س^2 + 4س - 16 = 0$

$(س+4)(س-2) = 0$

$س = -4$ مرفوضة ، $س = 2$

| | | |
|---|---|---|
| $م'$ | + | − |
| $م$ | ↗ عظمى عندما $س = 2$ | ↘ |

المطلوب مساحة أكبر شبة منحرف

$م = (4 + س) \times \sqrt{16 - س^2}$

$م = (4 + 2) \times \sqrt{16 - 2^2}$

$م = 6 \times \sqrt{12}$ #

أ. معصم ريحان
تابعنا على الفيس والبوتيوب
حصص خاصة أونلاين زووم
00972598709519

أ. معصم ريحان
حصص خاصة أونلاين
00972598709519

كيف بدنا نرسم منحنى

$ص = \sqrt{16 - س^2}$

أولاً ربع الطرفين

$ص^2 = 16 - س^2$

$ص^2 + س^2 = 16$

هذه معادلة دائرة مركزها (0،0) ونصف قطرها (4)




خربنا الطرفين في $\sqrt{16-س^2}$

أ. معصم ريحان تابعنا على الفيس واليوتيوب

المطلوب مساحة أكبر شبة منحرف

$م = (4 + س) \times \sqrt{16 - س^2}$

$م = (4 + 2) \times \sqrt{16 - 2^2}$

$م = 6 \times \sqrt{12}$ #

فكرة الدرس وخطوات حله:

أرسم علاقتين برمز موحد واشتقه وحل

ثم جد المطلوب وماتبقى خطوة النحص (ص)



Camscanner

2021 / جد مساحة أكبر مستطيل يمكن وضعه داخل مثلث متساوي الساقين طول قاعدته ١٢ سم وارتفاعه ١٠ سم بحيث ينطبق أحد أضلاعه على قاعدة المثلث ويقع الرأسان الآخران على ساقي المثلث.




الحل

نريد فلاشتان أ. معتصم ريحان

مساعدة

ب ج = ١٢ سم

P و = ١٠ سم

نفرض طول المستطيل = س

عرض المستطيل = ص

اذا كانة P و = ١٠ فإنة ع P = ١٠ - ص

يتشابه Δ P ك م الصغير مع Δ P ب ج الكبير

ومنة التشابه ينتج $\frac{\text{ص}}{١٠} = \frac{\text{س}}{١٢}$ ← ارتفاع الصغير / ارتفاع الكبير

$\Leftarrow$ س = $\frac{١٢(١٠-\text{ص})}{١٠}$

بالانوجد الرموز ⇐ $\boxed{\text{س} = ١٢ - \frac{١٢\text{ص}}{١٠}}$

مساحة المستطيل

م = الطول × العرض

م = س × ص

$\text{م} = \left(١٢ - \frac{١٢\text{ص}}{١٠}\right) \times \text{ص}$

$\text{م} = ١٢\text{ص} - \frac{١٢\text{ص}^2}{١٠}$

$\text{م}' = ١٢ - \frac{١٢\text{ص}}{٥} = \text{صفر}$

$\Leftarrow \frac{١٢\text{ص}}{٥} = ١٢$

$\Leftarrow \boxed{\text{ص} = ٥}$

م عظمى عند ص = ٥

المطلوب

$\text{س} = ١٢ - \frac{١٢ \times ٥}{١٠} = \boxed{٦}$ #

مساحة المستطيل = س × ص = ٦ × ٥ = ٣٠ سم² #

أ. معتصم ريحان
حصص خاصة أونلاين
تابعني على الفيس والواتس
00972598709519

---

2021 / دور ثاني / أوجد حجم أكبر مخروط دائري قائم طول راسمه ١٢√٢ سم

نريد فلاشتان أ. معتصم ريحان

مساعدة

ارتفاع المخروط

حجم أكبر مخروط

حجم المخروط = $\frac{١}{٣}$ (مساحة القاعدة) × الارتفاع

حجم المخروط = $\frac{١}{٣} \times \pi\,\text{نق}^2 \times \text{ع}$

حسب فيثاغورس $\text{ع}^2 = (١٢\sqrt{٢})^2 - \text{نق}^2$

بالانزوح نوجد الرموز ⇐ $\boxed{\text{ع} = \sqrt{٢٨٨ - \text{نق}^2}}$

$\text{ح} = \frac{١}{٣} \times \pi\,\text{نق}^2 \times \sqrt{٢٨٨ - \text{نق}^2}$

$\text{ح}' = \frac{١}{٣}\left(\pi\,\text{نق}^2 \times \frac{-٢\text{نق}}{٢\sqrt{٢٨٨ - \text{نق}^2}} + \sqrt{٢٨٨ - \text{نق}^2} \times (٢\pi\,\text{نق})\right) = \text{صفر}$

نضرب الطرفين في $\sqrt{٢٨٨ - \text{نق}^2}$

$\Leftarrow -\pi\,\text{نق}^3 + (٢٨٨ - \text{نق}^2) \times ٢\pi\,\text{نق} = \text{صفر}$

$-\pi\,\text{نق}^3 + ٥٧٦\pi\,\text{نق} - ٢\pi\,\text{نق}^3 = \text{صفر}$

يتبع في الصفحة القادمة
ص٥



تحويه صوتيا بـ CamScanner

## ⊛ تابع حل 2021 دور ثاني

$-\pi$ نق$^3$ + $24\pi$ نق $- 2\pi$ نق$^3$ = حـ

$-3\pi$ نق$^3$ + $24\pi$ نق = حـ

$-3\pi$ نق (نق$^2$ − 8) = حـ

اما $-3\pi$ نق = حـ ⇐ نق = حـ (مرفوض)

أو نق$^2$ − 8 = 0 ⇐ نق$^2$ = 8 (مرفوض)

المطلوب: حجم المخروط = $\frac{1}{3} \times \pi \times (\sqrt{8})^2 \times 12 - 8$

حجم المخروط = $\frac{8}{3} \pi \times 2$ = $\frac{16\pi}{3}$ #.

⊛ ملاحظة:
العلاقة الأساسية في السؤال نفرضها منه كلما أكبر أو أصغر أو أقل أو أكثر ما يمكن.
وهي التي نشتقها بعد توحيد الرموز.

أ. معتصم ريحان
00972598709519
حصص خاصة أونلاين
مميزة

## 2020 تجريبي غزة

دائرة طول قطرها أب يساوي ٤ سم بدأت النقطة جـ الحركة على الدائرة من ب باتجاه أ جد قياس الزاوية التي تجعل مساحة المثلث أب جـ أكبر ما يمكن

أ. معتصم ريحان




نريد علاقتان

مساعدة: القطر أب = ٤ سم

الإرتفاع حـ م

المطلوب: مساحة المثلث أب جـ أكبر ما يمكن

نفرض طول الضلع أ جـ ← س

نفرض طول الضلع ب جـ ← ص

$س^2 + ص^2 = 4$ ⇐ حسب فيثاغورس

$ص^2 = 4 - س^2$ ⇐ $ص = \sqrt{4 - س^2}$

مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ × (حاصل ضرب أي ضلعين) × جيب الزاوية المحصورة بينهما

بلا توحيد الرموز

$م = \frac{1}{2} \times (س) \times (ص) \times جا(90)$

$م = \frac{1}{2} \times س \times \sqrt{16 - س^2}$

نضرب الطرفين في $\sqrt{16 - س^2}$

$م = \frac{1}{2} \left( س \times \frac{-2س}{\sqrt{16 - س^2}} + \sqrt{16 - س^2} \times (1) \right)$ = حـ

$م = -س^2 + (16 - س^2)$ = حـ ∴ متى الزاوية التي تجعل مساحة المثلث أب جـ أكبر ما يمكن هل $\frac{\pi}{4}$ #.

$-2س^2 = -16$

$س = \sqrt{8}$ (مرفوض)

| | | |
|---|---|---|
| م | + + + | − − − |
| | $\sqrt{8}$ | |

أعظم مساحة عندما $س = \sqrt{8}$

∴ جا θ = $\frac{س}{أب}$ ⇐ جا θ = $\frac{\sqrt{8}}{4}$

shift + sin $x^{-1}$ = θ = $\frac{\pi}{4}$ ∴ ص



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تجريبي ٢٠٢٠

أ. مقدم ريحان

$\triangle ABC$ مثلث قائم الزاوية في ب ، $AB = 4$ ، $BC = 3$ ، د نقطة على $\overline{AB}$ ، هـ نقطة على $\overline{AC}$ ، و نقطة على $\overline{BC}$ حد أبعاد المستطيل هـ و ب د التي يكون عندها مساحة المستطيل أكبر ما يمكنه .




نريد علامتان

مساعدة

مساحة المستطيل أكبر ما يمكنه

$م = س \times ص$

$م = \left(٣ - \frac{٣}{٤} ص\right) \times ص$

$م = ٣ص - \frac{٣}{٤} ص^٢$

$م' = ٣ - \frac{٦}{٤} ص = ٠$

$\frac{٦}{٤} ص = ٣$

$ص = ٢$ #

المطلوب أبعاد المستطيل $ص = ٢$ ، $س = \frac{٣}{٢}$ #

أ. مقدم ريحان

٠٠٩٧٢٥٩٨٧٠٩٥١٩

خارجي جد مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه داخل دائرة طول نصف قطرها ٢٠ سم




نريد علامتان

مساعدة

حسب فيثاغورس

(القطر)$^٢$ = $س^٢ + ص^٢$

$(٤٠)^٢ = س^٢ + ص^٢$

$ص = \sqrt{١٦٠٠ - س^٢}$

الحل

مساحة أكبر مستطيل

$م = س \times ص$

$م = س \times \sqrt{١٦٠٠ - س^٢}$

$م' = س \times \frac{-٢س}{٢\sqrt{١٦٠٠ - س^٢}} + \sqrt{١٦٠٠ - س^٢} \times (١) = ٠$

$م' = \frac{-س^٢ + ١٦٠٠ - س^٢}{\sqrt{١٦٠٠ - س^٢}} = ٠$

$-٢س^٢ = -١٦٠٠$

$س^٢ = ٨٠٠$

$س = ٢\sqrt{٢٠٠}$ #




أ. مقدم ريحان

تابعين على الفيس واليوتيوب

$ص = \sqrt{١٦٠٠ - ٨٠٠}$

$ص = ٢٠٠\sqrt{٢}$

المطلوب $م = س \times ص$

$م = ٢٠٠\sqrt{٢} \times ٢٠٠\sqrt{٢} = ٨٠٠$ سم$^٢$



CamScanner

## (*) مسألة خارجية على درس تطبيقات عملية على القيم القصوى

أ. مقصم ريحان

خارجي/ صاحب مزرعة أغنام لديه ٣٦٠ متر من السلك الشبك يريد عمل حظائر متطابقة الشكل ومتساوية المساحة أوجد أكبر مساحة للحظائر يمكن عملها. نريد علاقتان




مساعدة

من الشكل نستنتج

أن ٩ص + ٨س = ٣٦٠

٨س = ٣٦٠ - ٩ص

$س = \frac{٣٦٠ - ٩ص}{٨}$

يلا نوحد الرموز

الحل+

أكبر مساحة لـ الستة حظائر

مساحة الحظيرة = س × ص

مساحة الحظائر الستة = ٦ × س × ص

$م = ٦ \times ص \times \left(\frac{٣٦٠ - ٩ص}{٨}\right)$

$م = \frac{٢١٦٠ ص - ٥٤ ص^{٢}}{٨}$

$م = ٢٧٠ ص - \frac{٥٤}{٨} ص^{٢} \Leftarrow م' = ٢٧٠ - \frac{١٠٨}{٨} ص = صفر$

$\Leftarrow ص = ٢٧٠ \times \frac{٨}{١٠٨} = ٢٠$

خطوة الفحص

+++ (٢٠) ---

عند ص = ٢٠ يوجد عندها عظمى مطلقة

نعوض لإيجاد س $= \frac{٣٦٠ - ٩ \times ٢٠}{٨} = \frac{١٨٠}{٨} = \frac{٤٥}{٢}$

المطلوب مساحة الحظائر الستة = ٦ × س × ص

$= ٦ \times \frac{٤٥}{٢} \times ٢٠ =$ (٢٧٠٠ م$^{٢}$) #

أ. مقصم ريحان
تابعين على الفيس والبوتيوب

(*) تابعين على صفحتي الرسمية وقناتي على اليوتيوب باسم (مقصم ريحان رياضيات توجيهي)

(*) للتسجيل معي في الدروس الخصوصية المميزة أونلاين وسنتر وأسئلة وامتحانات.

(*) شرح مميز، سيجعلك تحب الرياضيات

أ. مقصم ريحان 00972598709519

أ. مقصم ريحان
حصص خاصة أونلاين
مميزة
00972598709519



CamScanner

أ. معتصم ريحان

تجريبي الوسطى 2020

جد حجم أكبر مخروط دائري قائم يمكن رسمه داخل مخروط دائري قائم نصف قطر قاعدته ٤ سم وارتفاعه ١٢ سم حيث يقع رأس المخروط الداخلي على مركز قاعدة المخروط الخارجي




الحل

نريد فلاقتان أ. معتصم ريحان مساعدة

لسنة

حجم أكبر مخروط دائري قائم (المخروط الداخلي)

ارتفاع المخروط الداخلي الصغير

$م = \frac{1}{3}$ (مساحة القاعدة) × الارتفاع

$م = \frac{1}{3}(\pi نق^2) \times (12-س)$

وزع

$م = \frac{1}{3}\pi نق^2 \times (12 - 3نق)$

$م = 4\pi نق^2 - \pi نق^3$

$م' = 8\pi نق - 3\pi نق^2 = ه$

$\pi نق(8 - 3نق) = ه$

إما $\pi نق = 0$ أو $8 - 3نق = ه$

$نق = ه$ أو $نق = \frac{8}{3}$ مرفوض

نعوض الآن لنجد س

$\therefore س = 3نق$

$\therefore س = 3 \times \frac{8}{3} = 8$ #

(*) لاحظ من الشكل المثلث الكبير P ب ج يشابه المثلث الصغير م و ج

وهذا التشابه ينتج أن

$\frac{س}{12} = \frac{نق}{4}$

ارتفاع المثلث الصغير ← س

ارتفاع المثلث الكبير ← 12

نصف قطر المخروط الصغير ← نق

نصف قطر المخروط الكبير ← 4

ومنها $س = \frac{12نق}{4}$

$\therefore س = 3نق$

ملاحظة: نوحد الرموز ونفوض مكانة سينة.

أ. معتصم ريحان

م' + + + + − − − −

$\frac{8}{3}$

يكون عظمى مطلقة عند $نق = \frac{8}{3}$

المطلوب ← حجم المخروط الداخلي الصغير

$= \frac{1}{3} \times \pi نق^2 \times ع$

$= \frac{1}{3} \times \pi \times (\frac{8}{3})^2 \times (12-8)$

$= \frac{1}{3} \times \pi \times \frac{64}{9} \times 4 = \frac{256\pi}{27}$ #

أ. معتصم ريحان

00972598709519

تابعني على الفيس والتويتر

صح

أ. معتصم ريحان



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خارجي / أوجد أقصر مسافة بين النقطة (٠، ٦) والمنحنى $س^2 - ص^2 = 16$

أ. معتصم ريحاني
فيديوهات خاصة أونلاين مميزة

نريد علاقتان

الحل

أقصر مسافة بين النقطة والمنحنى

نفرض النقطة التي على المنحنى $(س، ص)$

∴ النقطتين هما $(٠، ٦)$، $(س، ص)$

$$ف = \sqrt{(ص - ص_1)^2 + (س - س_1)^2}$$

$$ف = \sqrt{(ص - ٦)^2 + (س - ٠)^2}$$

$$ف = \sqrt{ص^2 - ١٢ص + ٣٦ + س^2}$$

$$ف = \sqrt{ص^2 - ١٢ص + ٣٦ + ١٦ + ص^2}$$

$$ف = \sqrt{٢ص^2 - ١٢ص + ٥٢}$$ الآن نشتق ونصفر

$$ف' = \frac{٤ص - ١٢}{٢\sqrt{٢ص^2 - ١٢ص + ٥٢}} = صفر$$ وضربها $٤ص - ١٢ = ٠ \Leftarrow$ ص = ٣

خطوة الفحص

ف' : − − − | + + +

٣

عندما ص = ٣ يحقق صفر المشتقة.

أ. معتصم ريحاني
تابعني على الفيس واليوتيوب

المطلوب أقصر مسافة ∴

$$ف = \sqrt{٢ص^2 - ١٢ص + ٥٢}$$

$$ف = \sqrt{٢(٣)^2 - ١٢(٣) + ٥٢} = \sqrt{٣٤}$$ #

أ. معتصم ريحاني
فيديوهات خاصة أونلاين مميزة
00972598709519

(*) الرسم فقط علشانه يتم توضيح السؤال فقط.
أما الرسم مش واجب "إلزامي وعليه علامات"، فقط علشانه نعرف نحل.

(*) فكرة الدرس وخطوات الحل ⇐ ارسم علاقتاته. رموز موحدة واشتق وصفر ثم جد المطلوب، وفاتش خطوة الفحص

(*) يمكنك الفحص باختبار المشتقة الأولى أو الثانية أنت حر.


Camscanner

خارجي / جد أكبر مساحة ممكنة للمستطيل من الشكل التالي




نريد علاقتان

المساحة

مساحة أكبر مستطيل

م = الطول × العرض

م = (٨ + -ص) × ٢س

م = ١٦س - ٢س ص

م = ١٦س - ٢س (٤ - س٢)

م = ١٦س - ٢س + ٨س

م = -٢س + ٢٤س

م = -٦س٢ + ٢٤ = صفر

⇐ س٢ = ٤

∴ س = ٢

مساعدة

نعلم أن الشكلان

م(س) = ٤ - س٢

∴ ص = ٤ - س٢ ← بدلا نوجد الرمز

أ. مقصم ريحان

م

+++ | --- | +++

٢

أرجع عوض لايجاد المطلوب

م = -٢س٣ + ٢٤س

م = -٢(٢)٣ + ٢٤(٢)

م = -١٦ + ٤٨

م = ٣٢ وحدة ٢ #

أ. مقصم ريحان

خارجي / اوجد حجم أكبر اسطوانة دائرية قائمة يمكن رسمها داخل كرة نصف قطرها ٣√٢ سم

نريد علاقتان

المساعدة

المطلوب

حجم أكبر اسطوانة دائرية قائمة

حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة × الارتفاع

ح = ط نق٢ × ع

ح = ط نق٢ × ٢ × ع

ح = ط نق٢ × ٢ × √(٣٢ - نق٢)

ح = ٢(ط نق٢ × -٢نق / ٢√(٣٢ - نق٢) + √(٣٢ - نق٢) × ٢ط نق)

ح = -ط نق٣ / √(٣٢ - نق٢) + ٢ط نق √(٣٢ - نق٢) = صفر

بضرب الطرفين في √(٣٢ - نق٢) ← اشتقينا ومساويناها بصفر

-ط نق٣ + ٢ط نق (٣٢ - نق٢) = صفر

-ط نق٣ + ٦٤ط نق - ٢ط نق٣ = صفر

-٣ط نق٣ + ٦٤ط نق = صفر

-٣ط نق (نق٢ - ٢) = صفر

-٣ط نق = صفر ⇐ نق = صفر ← مرفوض

أو نق٢ - ٢ = صفر

نق٢ = ٢

نق = √٢

ح ← +++ | --- | +++

٢

المطلوب ح = ط × (√٢)٢ × (١)٢ = ٤ط سم٣ #

أ. مقصم ريحان



CamScanner

خارجي منهم / جد مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه داخل مثلث قائم وتره ٢٤ وإحدى زواياه ٣٠°.

نريد علاقة




مساعدة

(*) من الشكل نلاحظ كل منه الآتي:

$ظا ٣٠ = \frac{س}{ب ه} \Leftarrow ب ه = \frac{س}{ظا ٣٠}$

$ظا ٦٠ = \frac{س}{و جـ} \Leftarrow و جـ = \frac{س}{ظا ٦٠}$

الوتر = ب ه + ه و + و جـ

$٢٤ = \frac{س}{ظا ٣٠} + ص + \frac{س}{ظا ٦٠}$

$٢٤ = \frac{س}{\frac{١}{\sqrt{٣}}} + ص + \frac{س}{\sqrt{٣}}$

$٢٤ = \sqrt{٣} س + ص + \frac{\sqrt{٣} س}{٣}$

$ص = ٢٤ - \frac{\sqrt{٣} س}{٣} - \sqrt{٣} س$

الحل

مساحة أكبر مستطيل

$م = س \times ص$

$م = س \left( ٢٤ - \frac{\sqrt{٣} س}{٣} - \sqrt{٣} س \right)$

$م = ٢٤ س - \frac{\sqrt{٣}}{٣} س^٢ - \sqrt{٣} س^٢$

$م' = ٢٤ - \frac{٢\sqrt{٣}}{٣} س - ٢\sqrt{٣} س = ٠$

$٢٤ = \left( ٢\sqrt{٣} + \frac{٢\sqrt{٣}}{٣} \right) س$

$س = \frac{٢٤}{\frac{٦ + ٢}{\sqrt{٣}}}$

$س = ٢٤ \times \frac{\sqrt{٣}}{٨}$

$\Leftarrow س = ٣\sqrt{٣}$

خطوة الفحص

م' : + + + | - - - ، عند $٣\sqrt{٣}$

ارجع عوض لإيجاد ص

$ص = ٢٤ - \frac{٣\sqrt{٣}}{\sqrt{٣}} + ٣\sqrt{٣} \times \sqrt{٣}$

$ص = ٢٤ - ٣ + ٩$

$ص = ١٢$ نتكلم عن طول

المطلوب مساحة المستطيل = $س \times ص$

$= ١٢ \times ٣\sqrt{٣}$

$= ٣٦\sqrt{٣}$ #


أ. معتصم ريحاني

00972598709519


أ. معتصم ريحاني
تابعني في الفيس واليوتيوب
فيديوهات خاصة أونه لاين.



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خارجي / تحليل

يُراد صنع صندوق على هيئة متوازي مستطيلات مفتوح من أعلى وذلك بقطع أربعة مربعات صغيرة متطابقة من زوايا صفيحة مربعة الشكل طول ضلعها ١٢ دسم، ثم ثنيت الحواف إلى أعلى، ما طول ضلع كل من هذه المربعات إذا كانت سعة الصندوق أكبر ما يمكن ؟؟ أ. معتصم ريحان

نريد علاقتان

مساعدة

طول الصفيحة = ١٢
عرض الصفيحة = ١٢
بعد قطع القطع الصغيرة
الطول = ١٢ - ٢س
العرض = ١٢ - ٢س

أ. معتصم ريحان
00972598709519

المسألة: سعة الصندوق أكبر ما يمكن

حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع

ح = (١٢ - ٢س)(١٢ - ٢س) × س

ح = (١٢ - ٢س)² × س

ح = (١٤٤ - ٤٨س + ٤س²) × س

ح = ١٤٤س - ٤٨س² + ٤س³ ⟸ ح = ١٤٤ - ٩٦س + ١٢س² = صفر

⟸ س² - ٨س + ١٢ = ٠ ⟸ (س - ٢)(س - ٦) = ٠ ⟸ إما س = ٢ أو س = ٦

عندما س = ٢ يوجد قيمة عظمى مطلقة ∴ طول ضلع المربع لتكون السعة أكبر ما يمكن هي عندما س = ٢

∴ طول ضلع المربع = (١٢ - ٢×٢) = ٨ دسم

لو طلب الحجم لمتوازي المستطيلات = ٢ × ٨ × ٨ = ١٢٨ دسم³

خارجي / العلم

ما مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه بحيث رؤوسه الأربع على منحنيات م(س) = س² ، هـ(س) = ٦ - س²

أ. معتصم ريحان نريد علاقتان

مساعدة

٢س: طول المستطيل
ص: عرض المستطيل

ص = هـ(س) - م(س) = (٦ - س²) - (س²)

المسألة: مساحة أكبر مستطيل

م = ٢س × ص

م = ٢س (٦ - س² - س²)

م = ١٢س - ٤س³

م' = ١٢ - ١٢س² = صفر

س² = ١

س = ١

عندما س = ١ قيمة عظمى مطلقة







المطلوب: مساحة المستطيل = ٢س × ص

= ٤ × ١ × ٢

= ٨ وحدة

أ. معتصم ريحان
معلم رياضيات ومدرب
00972598709519



CamScanner ممسوحة ضوئيا بـ

خارجي / قطاع دائري محيطه ٢٠ م ، جد نصف قطر دائرته لتكون مساحة القطاع أكبر ما يمكن

الحل

نريد ملاقتانه

بالكلمات

مساعدة ⇐ محيط القطاع

محيط القطاع = ٢٠ = ل + ٢ نق

⇐ ل = ٢٠ - ٢ نق

أ. مقصم ريحان
حصص خاصة اونلاين

مساحة القطاع أكبر ما يمكن

مساحة القطاع = ½ × نصف القطر × طول القوس

م = ½ × نق × ل

م = ½ × نق × (٢٠ - ٢ نق)

م = ١٠ نق - نق² ⇐ م' = ١٠ - ٢ نق = صفر ⇐ نق = ٥

عندما نق = ٥ يوجد قيمة عظمى مطلقة

+++ | --- (م)

٥

المطلوب للمساحة = ½ × ٥ × ١٠ = ٢٥

أ. مقصم ريحان
00972598709519
تابعينا على الفيس واليوتيوب

✱ قوانين القطاع الدائري :-

(1) مساحة القطاع = ½ × نصف القطر × طول القوس

نصف قطر الدائرة

محيط القطاع = ٢ نق + ل

(2) مساحة القطاع = ½ × نق² × θ ← قياس الزاوية المركزية أو زاوية القطاع بالراديان

(3) مساحة القطاع = ٣٦٠/θ × ٣٫١٤ نق²

زاوية القطاع

خارجي / متوازي مستطيلات قاعدته على شكل مربع فإذا كان مجموع أطوال أبعاده الثلاثة ١٢٠ سم فأوجد هذه الأبعاد عندما تكون مجموع مساحات أوجه الكلية أكبر ما يمكن

أ. مقصم ريحان

نريد ملاقتانه

مساعدة

بالكلمات

القاعدة مربعة
مساحتها = س²

مساحة القاعدتين = ٢ س²

مساحة الجوانب = ٤ س ص

المساحة الكلية = مساحة القاعدتين + مساحة الأوجه الجانبية

م = ٢ س² + ٤ س ص

مجموع أطوال الثلاثة → ٢ س + ص = ١٢٠

ص = ١٢٠ - ٢ س

م = ٢ س² + ٤ س (١٢٠ - ٢ س)

م = ٢ س² + ٤٨٠ س - ٨ س²

م = - ٦ س² + ٤٨٠ س

م' = - ١٢ س + ٤٨٠ = صفر ✱ المطلوب أطوال المتوازي المستطيلات

س = ٤٠

+++ | --- (م)

٤٠

عظمى مطلقة عندما س = ٤٠

٤٠ ٤٠ ٤٠

ص = ٤٠

أ. مقصم ريحان



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

توجيهي علمي 2022
أ. معتصم ريحان
00972598709519

## ⑯ تابع حل أسئلة خارجية مرجعة على درس التطبيقات العملية على القيم القصوى ⑯

**خارجي** أ ب ج د شبه منحرف طول ب ج ضعف طول أ د، $m\angle P = m\angle دج = m\angle دجب = 90°$، طول أ ب = ٦ سم كما في الشكل المجاور. تم تدوير الشكل حول الضلع ب ج، جد أكبر حجم للجسم الناتج عن الدوران




نريد دقيقتان

**مساعدة**

إرتفاع الاسطوانة ٦ − س

إرتفاع المخروط = س

حسب فيثاغورس

$نق^2 + س^2 = (٦)^2$

$نق^2 = ٣٦ - س^2$

يلا نوحد الرموز

**الحل**

حجم الجسم أكبر ما يمكن

الجسم الناتج = اسطوانة + مخروط

حجم الجسم $= \pi نق^2 \times س + \frac{1}{3}\pi نق^2 \times س$

$ح = \pi س (٣٦ - س^2) + \frac{\pi س}{3}(٣٦ - س^2)$

$ح = ١٠٨\pi س - \pi س^3 + ١٢\pi س - \frac{\pi س^3}{3}$

$ح = ١٢٠\pi س - \frac{4}{3}\pi س^3$

$ح' = ١٢٠\pi - ٤\pi س^2 = 0 \Leftarrow ٤\pi(٣٠ - س^2) = 0 \Leftarrow س^2 = ٣٠$

$\therefore س = \sqrt{٣٠}$ عندما $س = \sqrt{٣٠}$ يتغير $ح'$ من + إلى − فتكون عظمى مطلقة

**المطلوب** $ح = ١٢٠\pi(\sqrt{٣٠}) - \frac{4}{3}\pi(\sqrt{٣٠})^3 = ٢٠٠\pi - ٨٠\pi = ١٢٠\pi$

**خارجي** أراد أحد الأشخاص تصميم رايته على شكل مستطيل صفراء اللون وبداخلها مثلث أحمر اللون بحيث ب ج = ج د = س، كما في الشكل المجاور، جد أقل مساحة ممكنة للمثلث




نريد دقيقتان

**مساعدة**

**الحل**

أقل مساحة ممكنة للمثلث P ج د

م = (مساحة المستطيل − مجموع مساحة المثلثات البقية)

$م = ٨٠ \times ٦٠ - \left(\frac{1}{2} \times ٨٠ \times س + \frac{1}{2} \times س \times (٦٠ - س) + \frac{1}{2} \times ٦٠ \times (٨٠ - س)\right)$

$م = ٤٨٠٠ - (٤٠س + ٣٠س - \frac{1}{2}س^2 + ٢٤٠٠ - ٣٠س)$

$م = ٤٨٠٠ - ٤٠س - ٣٠س + \frac{1}{2}س^2 - ٢٤٠٠ + ٣٠س$

$م = \frac{1}{2}س^2 - ٤٠س + ٢٤٠٠$

**المطلوب** $م = \frac{1}{2}(٤٠)^2 - ٤٠(٤٠) + ٢٤٠٠$

$م = ٨٠٠ - ١٦٠٠ + ٢٤٠٠$

$م = ١٦٠٠ سم^2$

$م' = س - ٤٠ = 0$

$س = ٤٠$

إشارة م': − | 0 | +

م تتناقص ثم تتزايد، عند س = ٤٠ قيمة صغرى مطلقة



Camscanner ممسوحة ضوئيا بـ

خارجي / يُراد عمل خزان معدني مقفل على هيئة توازي مستطيلات سعته ٤٥ م٣ بحيث تكون كل من قاعدتيه العليا والسفلى مربعة الشكل ، فإذا كانت تكاليف المتر المربع الواحد من القاعدة السفلى ٤ دنانير ومن القاعدة العليا ٦ دنانير لكل متر مربع ومن الجوانب ٣ دنانير لكل مربع أوجد أبعاد هذا الخزان حتى تكون تكاليفه أقل ما يمكن ، وما هي تكاليفه عندئذٍ ؟؟

أ. معتصم ريحان

نريد علامتان

مساعدة

الحل




طول الخزان = س
عرض الخزان = س
ارتفاع الخزان = ص

حجم الخزان = س × س × ص

٤٥ = س٢ ص

ص = ٤٥ / س٢

يلا نوجد الرموز

أ. معتصم ريحان

حصص خاصة أونة لاينة ميزة

٤ جوانب

تكاليف الخزان أقل ما يمكن

ت = ٤ × س٢ + ٦ × س٢ + ٣ (٤ س ص)

ت = ١٠ س٢ + ٣ (٤ س × ٤٥ / س٢)

ت = ١٠ س٢ + ٥٤٠ / س

ت′ = ٢٠ س + (٠ − ٥٤٠) / س٢ = صفر

٢٠ س٣ = ٥٤٠ ⇐ س٣ = ٢٧

⇐ س = ٣

ت′ : − − − | + + + (عند س = ٣)

عند س = ٣ يوجد صغرى مطلقة .

المطلوب / أبعاد الخزان

س = ٣ ، ص = ٥

ت = ١٠ (٣)٢ + ٥٤٠ / ٣ = ٩٠ + ١٨٠ = ٢٧٠ دينار

أ. معتصم ريحان / تابعين على الفيس واليوتيوب .

خارجي / قطاع دائري محيطه ٢٠ سم ، جد نصف قطر دائرته لتكون مساحته أكبر ما يمكن

الحل

نريد علامتان

مساعدة

قطاع دائري

محيط القطاع = ٢٠ سم

محيط القطاع = ٢ نق + ل

٢٠ = ٢ نق + ل

ل = ٢٠ − ٢ نق

يلا نوجد الرموز

ل = ٢٠ − ٢ × ٥ = ١٠

مساحة القطاع أكبر ما يمكن

مساحة القطاع = ١/٢ × نق × ل

م = ١/٢ × نق × (٢٠ − ٢ نق)

م = ١٠ نق − نق٢

م′ = ١٠ − ٢ نق = صفر

نق = ٥

+ + + | − − − (عند نق = ٥ يوجد عظمى مطلقة)

المطلوب المساحة = ١/٢ × ٥ × ١٠

= ٢٥ #

أ. معتصم ريحان / حصص خاصة أونة لاينة ميزة

00972598709519

تابعين على الفيس واليوتيوب



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خارجي / قطعة خشب على شكل اسطوانة دائرية قائمة مساحتها الجانبية ٤٠٠ π سم²
حُفر في هذه القطعة نصف كرة طول قطرها مساوٍ لطول قطر قاعدة الإسطوانة
جد طول قطر قاعدة الإسطوانة الذي يجعل حجم الجزء المتبقي منه الاسطوانة أكبر ما يمكنه.



نريد علاقتان

مساعدة

المساحة الجانبية للاسطوانة = ٤٠٠ π
محيط القاعدة × الارتفاع = ٤٠٠ π
٢ نق π ع = ٤٠٠ π
ع = ٤٠٠ / ٢ نق

ع = ٢٠٠ / نق

أ. معتصم ريحان
حصص خاصة أونلاين
مميزة

الأساسية

حجم الجزء المتبقي للاسطوانة أكبر ما يمكنه

الحجم المتبقي = حجم الاسطوانة − ½ حجم الكرة

ح = π نق² ع − ½ × ٤/٣ × π نق³

ح = π نق² ع − ٢/٣ π نق³

ح = π نق² (٢٠٠/نق) − ٢/٣ π نق³

ح = ٢٠٠ π نق − ٢/٣ π نق³

ح' = ٢٠٠ π − ٢ π نق² = صفر

٢ π (١٠٠ − نق²) = صفر

نق = ١٠

ح' : + + + | − − −  (عند ١٠)

∴ المطلوب طول القطر = ٢٠

أ. معتصم ريحان 00972598709519

عظمى مطلقة عند نق = ١٠

خارجي / جد ارتفاع الاسطوانة الدائرية القائمة ذات أكبر حجم والتي يمكن رسمها داخل مخروط دائري قائم نصف قطره ٥ سم وارتفاعه ٩ سم.




نريد علاقتان

مساعدة

ارتفاع المخروط = ٩ سم
نق للمخروط = ٥ سم
منه الشكل يتشابه المثلث
P ب ك الكبير
مع المثلث P و م الصغير
وينتج من التشابه أن:

الحل

الأساسية

الاسطوانة ذات الأكبر حجم
حجم الاسطوانة = π نق² ع

ح = π نق² × (٩ − ٩ نق/٥)

ح = ٩ π نق² − ٩ π/٥ نق³

ح' = ١٨ π نق − ٢٧ π/٥ نق² = صفر

π نق (١٨ − ٢٧/٥ نق) = صفر

نق = ١٨ × ٥/٢٧

∴ نق = ١٠/٣

ح' : + + + | − − −  (عند ١٠/٣)

المثلث الصغير ~ المثلث الكبير (قياس المثلث)

ارتفاع المثلث الصغير ← (٩ − ع) / ٩ = نق / ٥ ← المثلث الصغير
ارتفاع المثلث الكبير ←

٩ − ع = ٩ نق / ٥

ع = ٩ − ٩ نق / ٥

عند نق = ١٠/٣ مم قطر المطلوب

ع = ٩ − ٩/٥ × ١٠/٣ = ٣ سم



CamScanner ممسوحة ضوئيا بـ

خارجي / دائرتان لهما نفس المركز م ونصف قطر الصغرى = ٩ سم ، ونصف قطر الكبرى = ١٥ سم فإذا أخذ نصف قطر الصغرى يتزايد بمعدل ثابت مقداره ٥ سم/ث بينما أخذ نصف قطر الكبرى يتزايد بمعدل ثابت مقداره ٤ سم/ث فأوجد أكبر مساحة ممكنة بين الدائرتين بحيث لا يتعدى نصف قطر الصغرى نصف قطر الكبرى .

أ. معتصم ريحان

نريد معادلتان

مساعدة

(الصغرى) نق = ٩ سم

(الكبرى) نق = ١٥ سم




أ. معتصم ريحان

بالتعليق

أكبر مساحة ممكنة بين الدائرتين

المساحة المحصورة بين الدائرتين = مساحة الدائرة الكبرى − مساحة الدائرة الصغرى

$م = \pi(١٥+ص)^{٢} - \pi(٩+س)^{٢}$

$م = \pi(١٥+٤ن)^{٢} - \pi(٩+٥ن)^{٢}$

$م = ٢\pi(١٥+٤ن)\times٤ - ٢\pi(٩+٥ن)\times٥ = ف$

$م = ٨\pi(١٥+٤ن) - ١٠\pi(٩+٥ن) = ف$

$م = ٢٢\pi ن + ١٢٠\pi - ٥٠\pi ن - ٩٠\pi = ف$

$م = -١٨\pi ن + ٣٠\pi = ف$

$\pi(-١٨ن + ٣٠) = ف$

$ن = \frac{٣٠}{١٨} = \frac{٥}{٣}$ #

م: +++ | $\frac{٥}{٣}$ | ---

عند $\frac{٥}{٣}$ يحقق عظمى مطلقة

(*) نصف قطر الصغرى يتزايد

$٩ + س$

(*) نصف قطر الكبرى يتزايد $١٥ + ص$

$\frac{دس}{دن} = ٥$ سم/ث ← تغير الصغرى بالنسبة للزمن

$\frac{دص}{دن} = ٤$ سم/ث ← تغير الكبرى بالنسبة للزمن.

$\therefore س = ٥ن$

$\therefore ص = ٤ن$

أ. معتصم ريحان

المسافة = السرعة × الزمن

المطلوب ⇐ $م = \pi(١٥+٤\times\frac{٥}{٣})^{٢} - \pi(٩+٥\times\frac{٥}{٣})^{٢}$

$م = ٣٠٠,٤٤\pi - ٤٦٩,٤٤\pi$

$م = ١٦٩\pi$

أ. معتصم ريحان / تابعني على الفيس واليوتيوب.

(*) لاحظ أيضاً أنه :.

نصف قطر الصغرى ⇐ $س + ٩ = ٥\times\frac{٥}{٣} + ٩ = \frac{٥٢}{٣}$

نصف قطر الكبرى ⇐ $ص + ١٥ = ٤\times\frac{٥}{٣} + ١٥ = \frac{٦٥}{٣}$

شرط السؤال ⇐ نصف قطر الصغرى < نصف قطر الكبرى


أ. معتصم ريحان
مرحبا خاصة أو نة لا ينسه ميزة
00972598709519


تابعني على الفيس واليوتيوب



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خارجي/ مستقيم يمر بالنقطة الثابتة (٢،١) ويقطع محور السينات والصادات في النقطتين P، ب أوجد أصغر مساحة ممكنة للمثلث وأ ب الواقع في الربع الأول "اميمي و نقطة الأصل"




أ. معتصم ريحان

نريد علاقتان

مساعدة

المثلث P م هـ الصغير يشابه المثلث P و ب الكبير وينتج منه التشابهة

$\frac{١-P}{P} = \frac{٢}{ب}$

$ب = \frac{P٢}{١-P}$

يلا نوحد الرموز

أ. معتصم ريحان

أصغر مساحة المثلث و P ب

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × القاعدة × الارتفاع

أ. معتصم ريحان

$م = \frac{١}{٢} \times P \times ب$

$م = \frac{١}{٢} \times P \times \frac{P٢}{١-P}$

$م = \frac{P^٢}{١-P}$

$م' = \frac{(١-P)(١) \times P^٢ - P٢ \times (١-P)}{(١-P)^٢}$ = صفر

$م' = \frac{P٢ - P٢^٢ - P^٢}{(١-P)^٢} = \frac{P٢ - P٢}{(١-P)^٢}$ = صفر

∴ البسط = صفر

$P^٢ - P٢ = ٠ \Leftarrow P(P-٢) = ٠$

$P = ٢$

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | ٠ | ٢ | |
| م' | + | ٠ | - |
| م | ↗ | عند P = ٢ قيمة عظمى مطلقة | ↘ |

نعوض لايجاد ب = $\frac{٢ \times ٢}{١-٢} = -٤$

المطلوب مساحة المثلث و P ب = $\frac{P^٢}{١-P} = \frac{٢^٢}{١-٢} = -٤$ وحدات مربعة

أ. معتصم ريحان

تابعني على الفيس واليوتيوب
00972598709519

خارجي/ جد أقل كمية من الصفيح اللازمة لصناعة علبة على شكل اسطوانة دائرية قائمة مغلقة القاعدتين سعتها ١٦ π سم٣

أ. معتصم ريحان

خصص خامة أونه لاسيد

نريد علاقتين

مساعدة

القاعدتين لا

الجانبية لا

أقل كمية من الصفيح لصناعة العلبة = المساحة الكلية للاسطوانة = $٢\pi نق^٢ + ٢ نق \pi ع$

حجم الاسطوانة = $\pi نق^٢ \times ع$

$\pi ١٦ = \pi نق^٢ ع$

$ع = \frac{١٦}{نق^٢}$

يلا نروح نوحد الرموز

أ. معتصم ريحان

كمية الصفيح $ك = ٢\pi نق^٢ + ٢ نق \pi \times \left(\frac{١٦}{نق^٢}\right)$

$ك = ٢\pi نق^٢ + \frac{٣٢\pi}{نق}$

$ك' = ٤\pi نق + \frac{-٣٢\pi}{(نق)^٢}$ = صفر

$٤\pi نق^٣ - ٣٢\pi$ = صفر

$٤\pi (نق^٣ - ٨)$ = صفر

نق = ٢

| | | | |
|---|---|---|---|
| نق | ٠ | ٢ | |
| ك' | - | ٠ | + |
| ك | ↘ | عند نق = ٢ قيمة صغرى مطلقة | ↗ |

المطلوب كمية الصفيح

$ك = ٢\pi (٢)^٢ + \frac{٣٢\pi}{٢}$

$ك = ٨\pi + ١٦\pi = ٢٤\pi$ سم٢

أ. معتصم ريحان

00972598709519



CamScanner

خارجي جميل / مستطيل أ ب جـ د فيه أ ب = ١٠٠ سم ، ب جـ = ٨٠ سم ، فإذا تحركت نقطة من د باتجاه أ بسرعة منتظمة مقدارها ٥ سم/ث وتحركت نقطة أخرى من ب باتجاه جـ بسرعة منتظمة مقدارها ٣ سم/ث فمتى تكون المسافة بين النقطتين أقل ما يمكنه وما مقدارها عندئذ ؟؟ أ. معصم ريحان




نريد علامتان

الحل

مساعدة

مُعطى س = ٥ سم/ث ⟸ س = ٥ ن

مُعطى ص = ٣ سم/ث ⟸ ص = ٣ ن

المسافة = السرعة × الزمن

المسافة بين النقطتين أقل ما يمكنه

ف = √(ص − ص)² + (س − س)²

ف² = (١٠)² + (٨٠ − (٥ن + ٣ن))²

ف² = (١٠٠) + (٨٠ − ٨ن)²

أ. معصم ريحان

نشتقه بالنسبة للزمن .

٢ ف ف' = ٢ (٨٠ − ٨ن) × −٨

نضع ف' = صفر

صفر = −١٦ (٨٠ − ٨ن)

صفر = (٨٠ − ٨ن) ⟸ ن = ١٠

عندن = ١٠ تتحقق شروط طلقة

(*) المطلوب ⟸ المسافة

ف² = (١٠)² + (٨٠ − ٨ن)²

ف² = (١٠)² + (٨٠ − ١٠×٨)²

ف² = ١٠٠

ف = ١٠٠

(*) والجواب فلحقر لأنه أقل مسافة بين الضلع أ د والضلع ب جـ عندما يكون المستقيم أفقي وليس له شكل وتر ويكون عندها موازي أ ب . أ. معصم ريحان

خارجي جميل / لدى رجل حقل مستطيل يُريد احاطته بسياج تم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام متطابقة بسياجين يوازيان أحد أضلاعه ، فإذا كان لديه ١٠٠٠ م من السياج فجد أكبر مساحة يمكنه احاطتها بالسياج . أ. معصم ريحان




نريد علامتان

الحل

أكبر مساحة يمكنه احاطتها بسياج

مساحة القطع = ٣ × (س ص)

م = ٣ ص × (١٠٠٠/٦ − ٤ص/٦)

م = ٥٠٠ ص − ٢ ص²

مساعدة

طول السياج = ١٠٠٠ متر

٦س + ٤ص = ١٠٠٠

٦س = ١٠٠٠ − ٤ص

س = ١٠٠٠/٦ − ٤ص/٦

أ. معصم ريحان

م' = ٥٠٠ − ٤ص = صفر

ص = ١٢٥

(*) المطلوب ⟸ المساحة = ٥٠٠ ص − ٢ ص²

= ٥٠٠ × ١٢٥ − ٢ (١٢٥)²

= ٦٢٥٠٠ − ٣١٢٥٠

= ٣١٢٥٠ م²

أ. معصم ريحان

حصص خاصة أدنة لابنة

عند ص = ١٢٥ تتحقق شروط طلقة



CamScanner الماسحة ضوئيا بـ

خارجي / ا ب ج د مستطيل فيه ا ب = ٦٠ سم ، ب ج = ٨٠ سم
م ن و ل متوازي أضلاع كما في الشكل، ما قيمة س التي تجعل مساحة متوازي الأضلاع أكبر ما يمكن علماً بأن ٢ ب = ٢ ب ن




نريد علاقات
مساعدة
أ. معتصم ريحاوي
نحسب
مساحة متوازي الأضلاع أكبر ما يمكن

مساحة متوازي الأضلاع = مساحة المستطيل - (مجموع مساحات المثلثات المتبقية)

م = ٤٨٠٠ - (٢س² - ٢٢٠س + ٤٨٠٠)

م = ٤٨٠٠ - ٢س² + ٢٢٠س - ٤٨٠٠

م = -٢س² + ٢٢٠س

م' = -٤س + ٢٢٠ = صفر

س = ٢٢٠ / ٤ = ٥٥ سم

أ. معتصم ريحاوي
م متصلة وقابلة للاشتقاء على ح
م' + عند ٥٥ - عند ٥٥

المطلوب عندما س = ٥٥ سم #

أ. معتصم ريحاوي

① مساحة المثلث م ا ل = مساحة و ج ن
② مساحة المثلث م ب ن = مساحة ل د و

③ مساحة Δ م ا ل = ½ × (٦٠ - ٢س) × (٨٠ - س)
= ½ × (٤٨٠٠ - ٦٠س - ١٦٠س + ٢س²)

∴ مساحة Δ م ا ل + مساحة Δ و ج ن
= ٤٨٠٠ - ٦٠س - ١٦٠س + ٢س²
= ٢س² - ٢٢٠س + ٤٨٠٠

④ مساحة Δ م ب ن = ½ × س × ٢س
= س × س = س²

∴ مساحة Δ م ب ن + مساحة Δ ل د و
= ٢س² - ٢٢٠س + ٤٨٠٠

خارجي / أحب أكبر حجم لأسطوانة دائرية قائمة مغلقة القاعدتين يمكن صنعها من صفيحة معدنية مساحتها ٣٦٠٠ سم²

أ. معتصم ريحاوي
المساحة الكلية للأسطوانة = المساحة الجانبية + القاعدتين
٣٦٠٠ = ٢ π نق ع + ٢ π نق²
ع = (٣٦٠٠ - ٢ π نق²) / ٢ π نق

نريد علاقة
أكبر حجم للأسطوانة
حجم الأسطوانة = π نق² × ع
ح = π نق² × (٣٠٠ - نق²) / نق
ح = π (٣٠٠ نق - نق³)
ح' = π (٣٠٠ - ٣ نق²) = صفر

نق = ١٠

عظمى
+++ | ---
١٠

أ. معتصم ريحاوي
ع = (٣٠٠ - نق²) / نق

المطلوب ح = π (٣٠٠ × ١٠ - ١٠³) = ٢٠٠٠ π سم³


CamScanner بـ صوتيا

**خارجي** جد بعدي أكبر مستطيل يوضع داخل نصف دائرة، نصف قطرها ٤√٢ بحيث ينطبق أحد أضلاعه على قطر الدائرة.




**الحل**

نريد علاقتان

جد بعدي أكبر مستطيل

مساحة المستطيل = الطول × العرض

م = ٢س × ص

م = ٢س × ٢√(٣٢ − س²)

مساعدة

حسب فيثاغورس

س² + ص² = (٤√٢)²

ص² = ٣٢ − س²

ص = ٢√(٣٢ − س²)

بلا نوحد الرموز

م = ٢س × ٢√(٣٢ − س²) + (−٢س / ٢√(٣٢ − س²)) × ٢س = صفر ← ضربنا الطرفين في ٢√(٣٢ − س²)

⇐ −٢س² + (٣٢ − س²) × ٢ = صفر ⇐ −٢س² − ٢س² + ٦٤ = ٠

⇐ −٤س² = −٦٤ ⇐ س² = ١٦ ⇐ **س = ٤**

تبيّن عظمى طلقة عند س = ٤ (+++ | ---)

ص = √(٣٢ − ٤²) = ٤ ⇐ أبعاد المستطيل ٤ × ٤

أ. مقصم ريحان

أ. مقصم ريحان ٠٠٩٧٢٥٩٨٧٠٩٥١٩

**خارجي** ا ب ج د مستطيل كما في الشكل حيث ا ب = ٤ سم، ب ج = ١٠ سم، مُدّ الضلع ج د على استقامته إلى و، وُصِل ب و فقطع ا د في ه، ا ه = س

د و = ص، جد قيمتي س، ص ليكون مجموع مساحتي المثلثين د ه و، ا ه ب أصغر ما يمكن

**الحل**

نريد علاقتان

مساعدة

Δ د ه و مشابه Δ ا ه ب

إذاً من التشابه ينتج أن

ص / ٤ = (١٠ − س) / س

ص = (٤٠ − ٤س) / س

بلا نوحد الرموز

مجموع مساحتي المثلثين أصغر ما يمكن

م = ½ × س × ٤ + ½ × (١٠ − س) × ص

م = ٢س + ½ × (١٠ − س) × (٤٠/س − ٤)

م = ٢س + (٥ − ٢س/س) × (٤٠/س − ٤)

م = ٢س + ٢٠٠/س − ٢٠ − ٢ + ٢س

م = ٤س + ٢٠٠/س − ٤٠

م′ = ٤ − ٢٠٠/س² = صفر

٢٠٠/س² = ٤ ⇐ س² = ٥٠ ⇐ **س = ٥√٢**

تبيّن صغرى طلقة عند ٥√٢ (− − − | + + +)

الآن نعوض لإيجاد ص

ص = ٤٠/٥√٢ − ٤

**ص = ٥√٢ − ٤**

أ. مقصم ريحان

تابعني على الفيس واليوتيوب


أ. مقصم ريحان
حصص خاصة أونلاين
٠٠٩٧٢٥٩٨٧٠٩٥١٩





صورة ضوئية بـ CamScanner

حصة رقم 45

توجيهي علمي 2022

أ. معتصم ريحان
00972598709519

# مراجعة كاملة للوحدة الثانية
## وتمارين تقوي على الوحدة

خارجي / ميت / رقم جـ التي تحققها نظرية رول للاقتران
م(س) = لو$_{هـ}$ (س + $\frac{1}{س}$) في الفترة [$\frac{1}{4}$ ، 4] هي :

(أ) ± 1 (ب) ± 1 الحل م(جـ) = صفر ← نتيجة رول

(جـ) 2 (د) 3 م(س) = $\frac{1 + \frac{1}{س^2}}{س + \frac{1}{س}}$

∴ م(جـ) = $\frac{1 + \frac{1}{جـ^2}}{جـ + \frac{1}{جـ}}$ = صفر ⇐ البسط = صفر ⇐ 1 + $\frac{1}{جـ^2}$ = 0

⇐ $\frac{1}{جـ^2}$ = 1 ⇐ $جـ^2$ = 1 ⇐ جـ = ± 1

المقام = صفر لأنه لا ينتمي للفترة

[$\frac{1}{4}$ ، 4] #

أ. معتصم ريحان
شرح على كيف كيف
تدريس أونه لاينه بشكل مميز

خارجي / كثير حدود من الدرجة الثالثة له نقطة حرجة واحدة فقط عندما س = و
أثبت أن الإنطاف له يحدث عندما س = و

الحل م(س) = أ $س^3$ + ب $س^2$ + جـ س + د ⇐ الصورة العامة لكثير الحدود من الدرجة الثالثة

م'(س) = 3أ $س^2$ + 2ب س + جـ

م''(س) = 6أ س + 2ب = صفر

∴ س = $\frac{-2ب}{6أ}$

بما أنه للاقتران نقطة حرجة عندما س = و
∴ م''(و) = صفر

∴ س = و = $\frac{-2ب}{6أ}$

| | $\frac{-2ب}{6أ}$ | |
|---|---|---|
| + + + | 0 | — — — |
| نفس إشارة معامل س | | عكس إشارة معامل س |
| م''(س) | | |
| سلوك م(س) | ∪ | ∩ |

∴ عندما س = و = $\frac{-2ب}{6أ}$ نقطة إنطاف لأن الاقتران يغير من اتجاه تقعره عندها.

أ. معتصم ريحان
تدريس أونه لاينه على الزوم



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خارجي/ إذا كانت $م(س) = \frac{1}{\theta جاس}$ ، $س \in [0, \pi]$ في أي الفترات التالية يكون $م(س)$ متزايد :-

(أ) $[0, \frac{\pi}{2}]$ (ب) $[0, \frac{\pi}{4}]$ (ج) $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$ (د) $[\frac{\pi}{2}, \pi]$

الحل $م'(س) = \frac{-1 \times \theta جتاس \times \theta جاس}{(\theta جاس)^2} = ظا$ (مشتقة المقام)

$\therefore -جتاس \times \theta جاس = ظا \Leftarrow جتاس = ظا$

$س = \frac{\pi}{2} \in ]0, \pi[$ مقبولة

$س = \frac{3\pi}{2} \notin ]0, \pi[$ مرفوضة

| $س$ | $0$ | | $\frac{\pi}{2}$ | | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| إشارة $م'(س)$ | | $+++$ | $0$ | $---$ | |
| سلوك $م(س)$ | | ↗ | ظا | ↘ | |

$\therefore م(س)$ متزايد $[\frac{\pi}{2}, \pi]$

أ. معتصم رجبان
00972598709519
حصص خاصة أونلاين متميزة على الزووم

س/ كثيرحدود من الدرجة الثالثة أثبت أن الوتر الواصل بين النقطتين $(س_1, م(س_1))$ ، $(س_2, م(س_2))$ يوازي المماس المرسوم لمنحنى $م(س)$ عند $س = \frac{س_1 + س_2}{2}$

الحل $م(س) = أس^3 + بس^2 + جس + د$ متصل في $ح$ وقابل للاشتقاق

$\therefore$ يوجد $جـ \in ]س_1, س_2[$ بحيث $م'(جـ) = \frac{م(س_2) - م(س_1)}{س_2 - س_1}$

$\Leftarrow 3أجـ^2 + 2بجـ + جـ = \frac{(أس_2^3 + بس_2^2 + جس_2 + د) - (أس_1^3 + بس_1^2 + جس_1 + د)}{س_2 - س_1}$

$\Leftarrow 3أجـ^2 + 2بجـ + جـ = \frac{أس_2^3 + بس_2^2 + جس_2 + د - أس_1^3 - بس_1^2 - جس_1 - د}{س_2 - س_1}$

$\Leftarrow 3أجـ^2 + 2بجـ + جـ = \frac{أ(س_2^3 - س_1^3)}{س_2 - س_1} + \frac{ب(س_2^2 - س_1^2)}{س_2 - س_1} + جـ$

فكينافرق المربعة

$\Leftarrow 3أجـ^2 + 2بجـ + جـ = \frac{أ(س_2 - س_1)(س_2^2 + س_1 س_2 + س_1^2)}{س_2 - س_1} + ب(س_2 + س_1) + جـ$

$\Leftarrow 3أجـ^2 + 2بجـ = أ(س_2^2 + س_1 س_2 + س_1^2) + ب(س_2 + س_1)$

$\Leftarrow 3جـ^2 = س_2^2 + س_1 س_2 + س_1^2 \Longleftarrow جـ = \frac{س_2 + س_1}{2}$ #

أ. معتصم رجبان

أ. معتصم رجبان


Camscanner بـ صوتيا حه

س/ إذا كانت $م(س) = ق(س) = جا^{٣}س + جتا^{٣}س$ ، $س \in [0, \frac{\pi}{2}]$ [عين مجالات التقعر للأعلى وللأسفل.

الحل $ق'(س) = ٣جتا^{٢}س - ٣جا^{٢}س = صفر$

$\Leftarrow ٣جتا^{٢}س = ٣جا^{٢}س$

$\therefore ٣س = ٤٥°$

$\therefore س = \frac{٤٥}{١٨٠} = \frac{١}{٤}\pi$




$م(س)$ مقعر للأعلى $[صفر، \frac{١}{٤}\pi[$

$م(س)$ مقعر للأسفل $]\frac{١}{٤}\pi، ٢[$

عند $س = \frac{١}{٤}\pi$ يوجد نقطة انعطاف

$(\frac{١}{٤}\pi، م(\frac{١}{٤}\pi))$ نقطة انعطاف

أ. معتصم ريحاني 00972598709519

---

س/ $م(س) = \begin{cases} |س^{٣} - ٤س + ٦| & ، صفر \leq س < ١ \\ ب + ٢س & ، ١ \leq س < ٢ \\ جـ & ، س = ٢ \end{cases}$

أ. معتصم ريحاني

يحقق المتوسطة على مجاله فجد الثوابت $أ، ب، جـ$ ثم جد جـ التي تعينها النظرية.

أولاً نجد تعريف المطلق $س^{٣} - س - ٦ = ٠ \Leftarrow (س - ٣)(س + ٢) = ٠ \Leftarrow س = ٣$ $س = -٢$

$\therefore م(س) = \begin{cases} -س^{٣} + س + ٦ & ، صفر \leq س < ١ \\ ب + ٢س & ، ١ \leq س < ٢ \\ جـ & ، س = ٢ \end{cases}$

بما أن $م(س)$ يحقق شروط المتوسطة إذاً متصل وقابل للاشتقاق في الفترة المعطاة.

إذاً $م(س)$ متصل عند $س = ١$

$-(١)^{٣} + (١) + ٦ = ب + ٢(١)$

$\boxed{٦ = ب + ٢}$ ①

$م(س)$ متصل عند $س = ٢$

إذاً $\boxed{ب + ٢٢ = جـ}$ ②

④ الآن سنجد $ق(س)$

$ق(س) = \begin{cases} -٢س + ١ & ، صفر < س < ١ \\ أ & ، ١ < س < ٢ \end{cases}$

$ق(١)^{+} = ق(١)^{-}$

إذاً $-٢(١) + ١ = أ$

$\boxed{أ = -١}$

ارجع بعوض في ① و ②

$\therefore ب - ١ = ٦ \Leftarrow \boxed{ب = ٧}$

$\therefore جـ = ٧ + ٢ \times ٢ - ١ \Leftarrow \boxed{جـ = ٥}$

$\therefore م(س) = \begin{cases} -س^{٣} + س + ٦ & ، صفر \leq س < ١ \\ ٧ - س & ، ١ \leq س < ٢ \\ ٥ & ، س = ٢ \end{cases}$

الآن سنجد من جـ التي تحقق ما النظرية

$ق(جـ) = \frac{م(٢) - م(صفر)}{٢ - صفر}$

⑤ في الفترة $صفر < جـ < ١$

$-٢جـ + ١ = \frac{م(١) - م(٠)}{١ - ٠}$

$-٢جـ + ١ = \frac{٦ - ٦}{١}$

$-٢جـ + ١ = ٠$

$\boxed{جـ = \frac{١}{٢}} \in ]٠، ١[$

في الفترة $١ < جـ < ٢$

$ق(جـ) \neq صفر$

لأن $ق(جـ) = -١$

$\therefore$ نجد جـ في كل الفترة $]١، ٢[$

أ. معتصم ريحاني

تابعني في الفيس واليوتيوب

3p



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

س/ الشكل التالي يمثل $ق'(س)$ مجموعة قيم س التي تكون عندها نقطة إنطاف

أ) $\{٠\}$ ب) $\{٤،٠\}$ ج) $\{٣\}$ د) $\{\}$ هـ) $\varnothing$

الحل




عند س = ٣ لا يوجد نقطة إنطاف
لأن الاقتران لم يغير منه اتجاه تقعره

أ. معتصم ريحاني
شرح فائق كيفي كيفك
تدريسي أونلاين بشكل مميز

---

س/ اذا كان ق(س) = $س + \frac{٢٥}{س}$ ، $س \in [-٨، ٨] - \{٠\}$ فجد:-

أ) الاحداثيات السينية للنقاط الحرجة ب) جدد مجالات التزايد والتناقص للاقتران ق ج) القيم القصوى وحدد نوعها.

الحل ق'(س) = $١ - \frac{٢٥}{س^٢} = ٠ \Leftarrow س^٢ = ٢٥ \Leftarrow س = \pm ٥$




قيم س التي عندها نقط حرجة = $\{-٨، -٥، ٥، ٨\}$

ق(س) متزايد $[-٨، -٥]$ ، $[٥، ٨]$

ق(س) متناقص $[-٥، ٥]$

أ. معتصم ريحاني
00972598709519

للاقتران ق(س) قيمة قصوى عظمى محلية عندما س = -٥ وقيمتها ق(-٥) = ١٠

للاقتران ق(س) قيمة قصوى صغرى محلية عندما س = ٥ وقيمتها ق(٥) = ١٠

---

س/ وعاء على شكل أسطوانة يعلوها نصف كرة مساحة سطحه $٨٠\pi$ ، جد أكبر حجم ممكن للوعاء.

أ. معتصم ريحاني



مساحة سطح الوعاء = مساحة سطح أسطوانة + مساحة سطح نصف كرة

$٨٠\pi = ٢\pi نق ع + ٢\pi نق^٢$

$٤٠ = نق ع + نق^٢$

$ع = \frac{٤٠ - نق^٢}{نق}$

بدلالة وحيد المجهول

أسئلة:
أكبر حجم للوعاء

حجم الوعاء = حجم الأسطوانة + $\frac{١}{٢}$ حجم الكرة

$ح = \pi نق^٢ ع + \frac{١}{٢} \times \frac{٤}{٣} \pi نق^٣$

$ح = \pi نق^٢ \times \frac{٤٠ - نق^٢}{نق} + \frac{٢}{٣} \pi نق^٣$

$ح = ٤٠\pi نق - \pi نق^٣ + \frac{٢}{٣} \pi نق^٣$

$ح = ٤٠\pi نق - \frac{١}{٣} \pi نق^٣$

$ح' = ٤٠\pi - \pi نق^٢ = ٠$

$\pi نق^٢ = ٤٠\pi$

$نق^٢ = ٤٠$

$نق = \sqrt{٤٠}$

$نق^٢ = ٤٠$




قيمة عظمى مطلقة = $\frac{١٦٠}{٣} \pi \sqrt{٤٠}$

الحجم المطلوب = $\frac{٢}{٣} \pi (\sqrt{٤٠})^٣ \times ٢\sqrt{٤٠} - \pi \sqrt{٤٠}^٢ \times \sqrt{٤٠}$

$= \frac{٢}{٣} \times \pi \times ٤٠ \times ٢\sqrt{٤٠} - \pi \times ٤٠ \times \sqrt{٤٠}$

$= \frac{٤}{٣} \pi \times ٤٠ \sqrt{٤٠} - \pi \times ٤٠ \sqrt{٤٠}$

أ. معتصم ريحاني



CamScanner

أ. معتصم ريحان
00972598709519

س/ الشكل التالي قـ(س) على [-٢، ٤] بالاعتماد عليه أجب عن :




① قيم س الحرجة للاقتران هـ ② التزايد والتناقص لـ هـ(س)

③ التقعر للأعلى وللأسفل للاقتران هـ(س) ونقطة الانعطاف .

الحل

① قيم س الحرجة = {-٢، -١، حز، ٣، ٤}

② هـ(س) تزايد [-٢، -١] ، [حز، ٣] .

هـ(س) تناقص [-١، حز] ، [٣، ٤] .

③




عند (حز، هـ(٠))
وعند (٢، هـ(٢))
نقط انعطاف لانه الاقتران يغير من اتجاه تقعره عندها .

هـ(س) مقعر للأعلى ]حز، ٢[

هـ(س) مقعر للأسفل ]-٢، حز[ ، ]٢، ٤[

أ. معتصم ريحان

أ. معتصم ريحان
مهم خاص بالثانوية

س/ P ب جـ مثلث طول قاعدته ب جـ يساوي ١٢ سم ، وطول ارتفاعه النازل منه الرأس P يساوي ١٦ سم فرضت نقطة د على ب جـ ، ثم رسم مستقيم ب جـ ، ثم رسم مستقيم يوازي ب جـ ويقطع P ب ، P جـ في نقطتين هـ ، و ، أوجد طول العمود النازل منه و على هـ لتكون مساحة المثلث هـ و أكبر ما يمكن




أ. معتصم ريحان

نريد دالة

مساعدة ١٦ سم

مساحة المثلث أكبر ما يمكن

م = ½ × القاعدة × الارتفاع

م = ½ × هـ و × س

م = ½ × (١٢ - ¾ س) × س

م = ٦ س - ⅜ س²

م = ٦ - ¾ س = صفر

س = ٦ × ⅔

س = ٨

عظمى مطلقة عند س = ٨

يتشابه المثلثان P هـ و مع المثلث P ب جـ

ونتج $\frac{هـ و}{١٢} = \frac{١٦ - س}{١٦}$

$هـ و = \frac{١٩٢ - ١٢ س}{١٦}$

$هـ و = ١٢ - \frac{٣ س}{٤}$

لو طلب مساحة المثلث

م = ٦ (٨) - ⅜ (٨)²

م = ٢٤ سم²

لو طلب طول الضلع هـ و

$هـ و = ١٢ - \frac{٣ \times ٨}{٤} = ٦$

أ. معتصم ريحان



CamScanner

س/ إذا كانت $م(س)$ اقترانا كثير حدود ومتزايد على $[-٣، -١]$ ويقع في الربع الثاني وكانت $م(س) \times هـ(س)$ و $س$ ، جد فترات التزايد والتناقص لمنحنى $هـ(س)$

رسم تقريبي




أ. معتصم ريحان

الحل $هـ(س) = \frac{س}{م(س)}$

$هـ'(س) = \frac{م(س) \times (١) - س \times م'(س)}{(م(س))^٢}$

$هـ'(س) = \frac{(+) - (+) \times (-)}{(+)}$

$هـ'(س) = (+) > ٠$

$\therefore$ $هـ(س)$ تزايد في $[-٣، -١]$

أ. معتصم ريحان

* $م(س)$ موجب لأنه صفوف محور السينات
* $م'(س)$ موجب لأنه متزايد $م(س)$
* قيم $س$ سالبة في الفترة $[-٣، -١]$
* تربيع $م(س)$ موجب

---

س/ $م(س)$ اقتران معرف على الفترة $[-١، ٤]$ ومنحنى مشتقته الثانية $ق''(س)$ يمثل بالشكل المجاور، إذا علمت أن $ق'(٢) = ق'(\frac{١}{٢}) = ٠$




أ. معتصم ريحان

اعتمد على الشكل في الإجابة عن الأسئلة التالية:-

① مجالات التزايد والتناقص والقيم القصوى لاقتران $م(س)$

② عين مجالات التقعر للأعلى لمنحنى الاقتران $م(س)$

③ أوجد نقط/نقاط الانعطاف. أ. معتصم ريحان

إشارة $ق'(س)$ | + + + | صفر | - - - | صفر | + + +

سلوك $م(س)$ | -١ | $-\frac{١}{٢}$ | ٢ | ٤

عند $س = ٢$ يمتلك صغرى محلية.

عند $س = -\frac{١}{٢}$ يمتلك عظمى محلية.

$\Leftarrow$ $م(س)$ تزايد $[-١، -\frac{١}{٢}]$ ، $[٢، ٤]$

$\Leftarrow$ $م(س)$ تناقص $[-\frac{١}{٢}، ٢]$

أ. معتصم ريحان

خصص خاصة أوله لاينه

إشارة $ق''(س)$ | - - - | صفر | + + + | صفر | - - -

سلوك $م(س)$ | -١ | صفر ∩ | ٣ ∪ | ٤ ∩

$\Leftarrow$ $م(س)$ مقعر للأعلى $]صفر، ٣[$

$\Leftarrow$ $م(س)$ مقعر للأسفل $[-١، صفر[$ ، $]٣، ٤[$

عند $(صفر، م(٠))$ نقطة انعطاف. يتغير عندها سلوك الاقتران

$(٣، م(٣))$ نقطة انعطاف

$ق''(٢) > صفر$ صغرى حسب اختبار المشتقة الثانية

$ق''(-\frac{١}{٢}) < صفر$ عظمى

* منه اختبار المشتقة الثانية عرفنا الإشارة فوق خط الأعداد للمشتقة الأولى $(م')$



CamScanner

س/ أثبت أنه لايوجد للاقتران $ه(س) = \frac{أس + ب}{جس + د}$ قيمة قصوى علماً بأن $ه(س) \neq 0$،

$أد - ب جـ \neq 0$ ، $ه(س)$ معرف على ح

الحل بما أنّ $ه(س) \neq$ صفر إذاً البسط $أس + ب \neq$ صفر

يريد القيم القصوى، بلا اشتقاق وشادي يجيب

$$ق(س) = \frac{(جس + د) \times أ - (أس + ب) \times جـ}{(جس + د)^2}$$

$$ق(س) = \frac{أجس + أد - أجس - ب جـ}{(جس + د)^2} = \frac{أد - ب جـ}{(جس + د)^2}$$

المشتقة الأولى لاشادي صفر لأنه مابقدر اساوي البسط بصفر لأنه في السؤال قال أن $أد - ب جـ \neq$ صفر

الآن حتى أعين المشتقة تكون غير موجودة وسنساوي المقام بصفر

$\therefore (جس + د)^2 =$ صفر

$جس + د =$ صفر

$س = \frac{-د}{جـ}$ مرفوض لأنه لاينتمي لمجال الاقتران $ه(س)$ $\therefore$ لايوجد للاقتران $ه(س)$ قيم قصوى .

أ. معصم ريحان
كيف كيف

أ. معصم ريحان
تابعين لم الفيس واليوتيوب

---

س/ $ه$، $ك$ كثيرا حدود معاملان دائماً وكل منهما قيمة صغرى محلية عندس $= أ$ حيث $ق(أ) \neq 0$، $ل(ق أ) \neq 0$ أثبت أن للاقتران $(ه \times ك)$ قيمة صغرى محلية عندس $= أ$

الحل نعطي $ه(س)$ $\oplus$ بما أنه قال ممكن صغرى محلية عندس $= أ$

$ك(س)$ $\oplus$ $\therefore$ $ق(أ) =$ صفر وأيضاً $ق(أ) >$ صفر

$\therefore ق(أ) \oplus$ حسب اختبار المشتقة الثانية

وكذلك $ك(أ) =$ صفر وأيضاً $ك(أ) >$ صفر

$\therefore ك(أ) \oplus$ حسب اختبار المشتقة الثانية

أ. معصم ريحان

المطلوب

$(ه \times ك) = ه \times ك + ك \times ق$

تدريسي أونه لاينبه بشكل مميز

$(ه \times ك)(أ) = ه(أ) \times ك(أ) + ك(أ) \times ق(أ)$

$(ه \times ك)(أ) = ه(أ) \times ك(أ) + ك(أ) \times ق(أ) + ل(أ) \times ق(أ) + ق(أ) \times ك(أ)$

$(ه \times ك)(أ) = \oplus \times \oplus + \text{صفر} \times \text{صفر} + \oplus \times \oplus + \text{صفر} \times \text{صفر}$

$(ه \times ك)(أ) = \oplus + \oplus = \oplus >$ صفر #

حسب اختبار المشتقة الثانية إذاً يوجد قيمة صغرى محلية عندس $= أ$ للاقتران $(ه \times ك)$



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

س/ $م(س)$ معرف $[P، ب]$، وتزايد ويقع في الربع الرابع، $م(س) \neq$ صفر $ع(س) = \frac{ح}{م(س)}$ فإن $ع(س)$ يكون :-

P متزايد $[P، ب]$ ب ثابت $[P، ب]$ ج متناقص $[P، ب]$ د لا يمكن التحديد

الحل $عَ(س) = \frac{م(س) \times ح' - ح \times م'(س)}{(م(س))^2}$

$عَ(س) = \frac{(-) \times (+) - (+)(+)}{(+)}$

$عَ(س) = \frac{(-)}{(+)} = \frac{(-)}{(+)}$

$\therefore عَ(س) = (-) <$ صفر $\therefore ع(س)$ متناقص

أ. معتصم ريحان

P ب

$م(س)$

① $م(س)$ تحت محور السينات إذاً سالب

② $م(س)$ متزايد في $[P، ب]$ إذاً $م'(س) >$ صفر (+)

③ الاقتران الأسي الطبيعي دائماً موجب

---

س/ عدد القيم القصوى للاقتران $م(س) = \frac{P س + ب}{ج س + د}$ علماً بأن $P د - ب ج \neq$ صفر، $س \neq -\frac{د}{ج}$، $م(س) \neq$ صفر

P 1 ب 2 ج 3 د صفر

الحل بما أن $م'(س) \neq$ صفر إذاً أبسط $P س + ب \neq$ صفر

يريد السؤال عدد القيم القصوى للاقتران ونساوي بصفر

$م'(س) = \frac{P \times (ج س + د) - (P س + ب) \times ج}{(ج س + د)^2}$

$م'(س) = \frac{\cancel{P ج س} + P د - \cancel{P ج س} - ب ج}{(ج س + د)^2} =$ صفر

$م'(س) = \frac{P د - ب ج}{(ج س + د)^2} =$ صفر

المشتقة الأول تساوي صفر عندما أبسط

$P د - ب ج =$ صفر

ولكن في السؤال الشرط أنه $P د - ب ج \neq$ صفر

إذاً لا يوجد قيم تجعل المشتقة تساوي صفر

أ. معتصم ريحان قصص خاصة أو نهاية ميزة

00972598709519

الآن سنبحث عن أهم النقاط التي تجعل $م'(س)$ غير معرفة وهي عندما المقام يساوي صفر

$ج س + د = ٠$

$\therefore س = -\frac{د}{ج}$

وأيضاً في السؤال الشرط أنه $س \neq -\frac{د}{ج}$

إذاً لا يوجد قيم قصوى للاقتران $م(س)$

د

أ. معتصم تابعني على جروبات الواتس والتليجرام ضروري



CamScanner

أ. معتصم ريحان

س/ منحنى $م(س)$ من الدرجة الرابعة بالاعتماد على الشكل المجاور




جد ① مجالات التزايد والتناقص

② القيم القصوى للاقتران $م(س)$

③ مجالات التقعر للأعلى وللأسفل للاقتران $م(س)$

④ نقطة/نقاط الإنعطاف للاقتران $م(س)$

الحل ① مجالات التزايد والتناقص




$م(س)$ متزايد $]-\infty, -٣] \cup [حز, ٢]$

$م(س)$ متناقص $[-٣, حز] \cup [٢, \infty[$

② مجالات التقعر للأعلى وللأسفل




$م(س)$ مقعر للأسفل حز $]-\infty, -١[ \cup ]١, \infty[$

$م(س)$ مقعر للأعلى $]-١, ١[$

③ نقط الإنعطاف

عند $(١، م(١))$ ، $(-١، م(-١))$

نقط انعطاف لتحقق الشروط الثلاثة

$م''(-١) = حز$ ، $م''(١) = حز$

الاقتران متصل عند ١ ، -١

الاقتران يغير من سلوكه عند ١ ، -١


أ. معتصم ريحان
تابعنا في الفيس واليوتيوب
حصص خاصة أونلاين مميزة
00972598709519


---

س/ إذا كان $م(س) = لو(س - س^٢)$ جد قيم $س$ الحرجة ومجالات تزايد وتناقص الاقتران

الحل أولاً نجد مجال الاقتران $م(س)$ وهو عندما $س - س^٢ > حز$

$س - س^٢ = ٠$

$س(١ - س) = ٠$

$س = ٠$ أو $س = ١$




إذاً مجال $م(س)$ حز $< س < ١$


أ. معتصم ريحان
00972598709519
حصص خاصة أونلاين


$م'(س) = \frac{١ - ٢س}{س - س^٢} = حز$

ابسط $\therefore ١ - ٢س = حز$

$= حز$

$س = \frac{١}{٢}$ ⟸ نقطة حرجة

عندما $س = \frac{١}{٢}$ يوجد قيمة قصوى عظمى

ومقدارها $م(\frac{١}{٢}) = لو(\frac{١}{٢} - \frac{١}{٤}) = لو_{\frac{١}{٤}} \frac{١}{٤}$

$م(س)$ متزايد في $]حز, \frac{١}{٢}]$

$م(س)$ متناقص في $[\frac{١}{٢}, ١[$

أ. معتصم ريحان

حل



CamScanner

س٧ تحرك جسم في خط مستقيم حسب العلاقة ف(ن) = $ن^4 - 12ن^3 + 8ن^2 - 6$ بالاعتماد على ذلك أقل تسارع ممكنة للجسم هو

(أ) -92 (ب) -3 (ج) 92 (د) 3

الحل المطلوب أقل تسارع ممكن يعني لازم نحصل على التسارع ثم نشتقه ونساويه بصفر

ف = $ن^4 - 12ن^3 + 8ن^2 - 6$

ع = $4ن^3 - 36ن^2 + 16ن$

ت = $12ن^2 - 72ن + 16$

ت = $24ن - 72$ = صفر

$24ن = 72$ ∴ عندن = 3 يوجد أقل تسارع ممكنة

$ن = 3$

∴ ت(3) = $12(3)^2 - 72(3) + 16$

= $108 - 216 + 16$ = -92

المطلوب التحقق وليس الزمن الذي يكون عنده أقل تسارع

ميل موجب عند 3 (--- | +++)

أ. مقصم ريحان
00972598709519
حصص خاصة أونلاين مميزة

---

س٨ إذا كان ف(س) = $س^2 + \frac{ك}{س}$ ، ك ≠ 0 . أثبت أنه لا توجد عظمى للاقتران مهما كانت ك

الحل ف(س) = $2س - \frac{ك}{س^2}$ = صفر

$\Leftarrow 2س - \frac{ك}{س^2} = صفر \Leftarrow س^3 = \frac{ك}{2} \Leftarrow س = \sqrt[3]{\frac{ك}{2}}$

(٩) نشتقه كمانة مرة

ف''(س) = $2 + \frac{2ك}{س^4}$

صفر المشتقة الأولى

أ. مقصم ريحان
تابعني على الفيس واليوتيوب .

ف''$\left(\sqrt[3]{\frac{ك}{2}}\right)$ = $2 + \frac{2ك}{(\sqrt[3]{\frac{ك}{2}})^4}$ = $2 + \frac{2ك}{ك} \times 2$ = 6 > صفر

∴ ف $\left(\sqrt[3]{\frac{ك}{2}}\right)$ قيمة صغرى محلية حسب اختبار المشتقة الثانية .

أذاً لا يوجد قيم عظمى للاقتران ف(س)

ف(س) قابلة للاشتقاق على ح

ميل سالب | صفر | ميل موجب (--- | +++)

$\sqrt[3]{\frac{ك}{2}}$

ص١٥



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

س/ إذا كانت قيمة جـ التي تعينها نظرية القيمة المتوسطة للاقتران
هـ(س) = (لو_ه س)^٢ − لو_ه س في [١، ب] تساوي ١/٢ فما قيمة ب ؟؟

أ. معتصم ريحان
00972598709519

الحل هـ'(س) = ٢ (لو_ه س) × ١/س − ١/س

نتيجة نظرية القيمة المتوسطة ←

هـ'(جـ) = (هـ(ب) − هـ(١)) / (ب − ١)

هـ'(جـ) = متوسط التغير

٢ لو_ه حـ × ١/جـ − ١/جـ = ((لو_ه ب)^٢ − لو_ه ب − صفر) / (ب − ١)

٢ لو_ه ٢ / ٢ = ((لو_ه ب)^٢ − لو_ه ب) / (ب − ١)

١/٢ (٢ لو_ه ٢ − ١) = ((لو_ه ب)^٢ − لو_ه ب) / (ب − ١)

١/٢ × صفر = ((لو_ه ب)^٢ − لو_ه ب) / (ب − ١)

ميل جـ التي تحددها النظرية تساوي ١/٢ مثل هذا السؤال

(*) نكمل صفا :- نفرض لو_ه ب = م

∴ صفر = م^٢ − م

∴ م = ٠ أو م = ١

∴ لو_ه ب = صفر أو لو_ه ب = ١

ب = ١ مرفوضة ⇐ ب = ٢

س/ الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران هـ(س) المعرف على [٠، ٤] أثبت أن الاقتران ك(س) = هـ(−س) / (٢ − ٢س) متزايد في [−٤، صفر].




الحل ك'(س) = ((٢ − ٢س) × هـ'(−س) − هـ(−س) × (−٢)) / (٢ − ٢س)^٢

ك'(س) = (موجب × سالب × سالب − موجب × سالب) / موجب

ك'(س) = (موجب − سالب) / موجب

ك'(س) = (موجب + موجب) / موجب > صفر

∴ ك(س) متزايد في [−٤، صفر]




٢ − ٢س = ٠
س = ١

٢ − ٢س > ٠ عندما س ∈ [−٤، ١]

أ. معتصم ريحان
دروس خاصة أونلاين في الأردن
00972598709519

أ. معتصم ريحان
تابعني في الفيس واليوتيوب


تحويل صوتي بـ CamScanner

س/ اذا كانت $م(س) = ٢س^{٢} + ٢س$ وكانت الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران $هـ(س)$




فأوجد $\frac{د}{دس}\left(م \circ \left(\frac{س}{هـ(س)}\right)\right)$ عندما $س = ١$

الحل $م'(س) = ٤س + ٢$

من الشكل $هـ'(١) = ظا ٤٥$

$\therefore هـ'(١) = ١$

المطلوب $(م \circ ل)'(١)$ فرضنا $ل = \frac{س}{هـ(س)}$

$(م \circ ل)'(١) = م'(ل(١)) \times ل'(١)$

$(م \circ ل)'(١) = م'\left(\frac{١}{٤}\right) \times \frac{٣}{١٦}$

$(م \circ ل)'(١) = \left(٤\left(\frac{١}{٤}\right) + ٢\right) \times \frac{٣}{١٦}$

$(م \circ ل)'(١) = ٣ \times \frac{٣}{١٦}$

$(م \circ ل)'(١) = \frac{٩}{١٦}$

$ل(١) = \frac{١}{٤}$

(*) $ل'(س) = \frac{هـ(س) \times ١ - س \times هـ'(س)}{(هـ(س))^{٢}}$

$ل'(١) = \frac{هـ(١) - هـ'(١)}{(هـ(١))^{٢}}$

$\Leftarrow ل'(١) = \frac{٤ - ١}{(٤)^{٢}} = \frac{٣}{١٦}$

أ. معتصم رمضان
حصص خاصة أونلاين ميزة
تابعين على الفيس واليوتيوب
00972598709519

---

س/ ما مساحة أكبر مثلث يمكن رسمه في الربع الأول بحيث يقع رأسان منه على المستقيمين $م(س) = ٢س$ ، $هـ(س) = ٦ - س$ في حين يقع رأسه الثالث على محور السينات علماً بأن قاعدة المثلث توازي محور السينات.




نريد علاقتان

المساحة = أكبر مثلث

$م = \frac{١}{٢} \times$ القاعدة $\times$ الارتفاع

$م = \frac{١}{٢} \times (س_{٢} - س_{١}) \times (٢س_{١})$

$م = ((٦ - ٢س_{١}) - س_{١}) \times س_{١}$

$م = (٦ - ٣س_{١}) \times س_{١}$

$م = (٦س_{١} - ٣س_{١}^{٢})$

$م' = ٦ - ٦س_{١} = ٠$

$س_{١} = ١$

عظمى مطلقة عند $س_{١} = ١$

(*) ارتفاع المثلث من الشكل

يساوي $٦ - س_{٢}$

ويساوي $٢س_{١}$

$\therefore ٦ - س_{٢} = ٢س_{١}$

$٦ - ٢س_{١} = س_{٢}$

$٦ - ٢س_{١} = س_{٢}$

نعوض لإيجاد $س_{٢}$

$س_{٢} = ٦ - ٢ \times ١ = ٤$

المطلوب المساحة $= \frac{١}{٢} \times (س_{٢} - س_{١}) \times (٢س_{١})$

$= \frac{١}{٢} \times (٤ - ١) \times (٢ \times ١)$

$= ٣$ وحدات مربعة

حل

أ. معتصم رمضان
حصص خاصة أونلاين ميزة
تابعين على الفيس واليوتيوب
00972598709519



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

∴ س) اذا كانت م(س) = ٢ جاس - ٢س ، س ∈ ]$\frac{\pi}{2}$ ، $\frac{\pi}{2}$[ أوجد

① فترات التقعر للأعلى وللأسفل لمنحنى م(س) ② نقط الانطواف الأفقي إن وجدت لمنحنى م(س)

الحل م(س) متصل على ]$-\frac{\pi}{2}$ ، $\frac{\pi}{2}$[ كثير حدود ومثلثية مطروحين.

م'(س) = ٢ جتاس - ٢

م''(س) = -٢ جاس = صفر

∴ س = صفر ∈ ]$-\frac{\pi}{2}$ ، $\frac{\pi}{2}$[




م(س) مقعر للأعلى ]$-\frac{\pi}{2}$ ، صفر[

م(س) مقعر للأسفل ]صفر ، $\frac{\pi}{2}$[

(٠ ، م(٠)) = (٠ ، ٠) نقطة انطواف أفقي لأنه

م(س) متصل عند س = صفر

م''(صفر) = صفر

م'(صفر) = صفر

الاشارة تغيرت من سالبة عند صفر.


أ. معتصم رحيان

حصص خاصة أونلاين مميزة

تابعني على الفيس واليوتيوب

00972598709519


س) اذا كانت م(س) = $\begin{cases} أس^2 + ب س + ك & ، 0 \leq س < 2 \\ جتا(\pi س) + 1 & ، 2 \leq س \leq 3 \end{cases}$ يحقق شروط نظرية رول على [٠ ، ٣]

أ. معتصم رحيان

أوجد قيم الثوابت أ ، ب ، ك ثم أوجد قيم جـ التي تحددها النظرية.

الحل م(٠) = م(٣) ← الشرط الثالث لرول

أ(٠)^٢ + ب(٠) + ك = جتا(٣π) + ١

ك = -١ + ١

ك = صفر #

أ. معتصم رحيان

لاحظ جتا ٣π = جتا(٢π + π) = جتا π

(*) نهاية م(س) = نهاية م(س)

س ← ٢⁻ ، س ← ٢⁺

أ(٢)^٢ + ب(٢) + ك = جتا(٢π) + ١

٤أ + ٢ب + ك = ١ + ١

٤أ + ٢ب + صفر = ٢

٢أ + ب = ١ ——— (١)

(*) م'(س) متصل عند س = ٢

م'(٢)^+ = م'(٢)^-

-٣π جا(٣π س) = ٢أ(٢) + ب

-٣π جا(٢π) = ٤أ + ب

صفر = ٤أ + ب ——— (٢)

(*) نحل معادلة ① مع ② بالحذف

٢أ + ب = ١

٤أ + ب = صفر

-٢أ = ١ ⇐ أ = $-\frac{1}{2}$

بالطرح ⇐

(*) صفر لا يجاور ب

٢ × أ + ب = ١

ب = ٢ #

الآن صفر لا يجاور ب

∴ صفر .

**الفترة الأولى**

(*) م(س) = $\begin{cases} 2أس + ب & ، 0 < س < 2 \\ -3π جا(3π س) & ، 2 \leq س < 3 \end{cases}$

غ.م ، س = ٠ ، ٣ ← الأطراف

**الفترة الثانية**

م'(جـ) = صفر ∈ ]٢ ، ٣[ ∴ -٣π جا(جـ π) = صفر

∴ جا(جـ π) = صفر

∴ جـ π = صفر ، π ، ٢π ، ٣π ، ٤π ، ...

وبالتعويض على π

∴ جـ = ٢ ∈ ]٢ ، ٣[

م'(جـ) = صفر ∈ ]٠ ، ٢[ ∴ -جـ + ٢ = ٠ ⇐ جـ = ٢ ∉ ]٠ ، ٢[ ∴ جـ = ٠ ، ١ ، ٣ ∉ ]٢ ، ٣[




Scanned with CamScanner

س/ الشكل المجاور يمثل منحنى $م(س)$ الذي له نقطة إنعطاف عندما $س = صفر$
ما الفترة التي يكون عندها $م''(س)$ ، $م'(س)$ ، $م(س)$ لهم نفس الإشارة ؟؟




① $]٠،١[$ ⓑ $]-\infty،-٢[$ ⓒ $]-٢،-١[$ ⓓ $]٢،\infty[$

أ. معتصم ريحاني

الحل/ في الفترة $]٢،\infty[$
* الاقتران فوق محور السينات $\therefore م(س) > صفر$
* الاقتران يتزايد كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين $\therefore م'(س) > صفر$
* اتجاه تقعر الاقتران $م(س)$ للأعلى في الفترة $]٠،\infty[$ $\therefore م''(س) > صفر$ في الفترة $]٢،\infty[$

أ. معتصم ريحاني
تدريسي أونه لاينه بشكل مميز

$\therefore$ الجواب الصحيح هو الفرع ⓓ $]٢،\infty[$

أ. معتصم ريحاني 0097259870951 9

---

س/ إذا كانت $م(س)$ معرفة على $[٣،٨]$ بحيث $م(س_٢) > م(س_١)$ لكل $س_٢ > س_١$
وكان الاقتران $م(س)$ معرف على $[-٣،٢]$ بحيث $م(س_٢) > م(س_١)$ لكل $س_٢ > س_١$
فإن جميع العبارات الآتية صحيحة ماعدا ؟؟

أ. معتصم ريحاني

Ⓐ $م'(٤) < م'(-٢)$ ⓑ $\frac{م(٥) - م(٧)}{م'(٠)} > صفر$ ⓒ $م'(٦) > م'(-١)$ ⓓ $\frac{م(٧) - م(٥)}{م'(-١)} > صفر$

الحل/ الخيار Ⓐ صحيح $\Leftarrow م'(٤) < م'(-٢)$ لأن $م'(٤)$ سالبة ، $م'(-٢)$ موجبة .

الخيار ⓑ صحيح $\Leftarrow \frac{م(٥) - م(٧)}{م'(٠)} > صفر$ لأن $م$ متناقص في $[٣،٨]$
$م(٧) < م(٥)$ $\therefore م(٥) - م(٧) > صفر$

كذلك $م' > صفر$ في $]-٣،٢[$ $\therefore م'(٠) > صفر$

الخيار ⓒ غلط $\Leftarrow م'(٦) > م'(-١)$ لأن $م'(٦) <$ بسبب التناقص
$م'(-١) >$ بسبب التزايد

أ. معتصم ريحاني

الخيار ⓓ صحيح $\Leftarrow \frac{م(٧) - م(٥)}{م'(-١)} > صفر$ لأنه البسط سالب والمقام موجب إذاً المعادلة سالبة

أ. معتصم ريحاني
0097259870951 9
حصص خاصة
أونه لاينه مميزة




* رسم تقريبي توضيحي للشكل

* إذا كانت $م$ تتزايد إذاً $م'$ موجبة
* إذا كانت $م$ تتناقص إذاً $م'$ سالبة .

لاحظ :- مشهد كله الرسم تحت أو فوق محور السينات الرسم للفهم فقط

ص (١٤)


ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

س/ الشكل المجاور يمثل منحنى قـ(س) للاقترانه م(س) ، إذا علمت أنّ
قـ(-٥) = قـ(١) = صفر ، فما الفترة التي يكون فيها منحنى م(س) متناقصاً ؟؟

أ) ]-∞، -٥[ ∪ ]١، ∞[ ب) ]-∞، -٥] ج) [١، ∞[ د) ]-٥، ١[

الحل




حسب اختبار المشتقة الثاني

إشارة قـ(س) + + + | - - - | + + +
سلوك م(س) ∪ -٢ ∩

قـ(١) > صفر عندما س = ١ عظمى محلية
قـ(-٥) < صفر عندما س = -٥ صغرى محلية

إشارة قـ(س) + + + | صفر | - - - | صفر | + + +
سلوك م(س) ∪ -٥ ∩ ١ ∪

أ. مقصم ريحان


حصص خاصة أونلاين / تابعني على الفيس واليوتيوب


س/ أي من الاقترانات الآتية يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على [-٢، ٢]

أ) م(س) = [س + ٢]
ب) م(س) = √(س٤ + ٢س + ١)
ج) م(س) = |س٤ + ٢س + ١|
د) م(س) = (٢س - ١)^(١/٣)


أ. مقصم ريحان 00972598709519


الحل م(س) = [س + ٢] غير متصل عندما س = -١، ١

م(س) = √(س٤ + ٢س + ١) = √((س + ١)٢) = |س + ١| غير قابل للاشتقاق عندما س = -١

∴ م(س) = |س٤ + ٢س + ١| = |(س + ١)٢| = (س + ١)٢ كثير حدود يحقق شروط المتوسطة على [-٢، ٢]

م(س) = (٢س - ١)^(١/٣) ⟸ قـ(س) = (١/٣)(٢س - ١)^(-٢/٣) × ٢ = ٢ / ٣ ∛(٢س - ١)٢

غير قابل للاشتقاق عندما س = ١/٢

أ. مقصم ريحان / تابعني على الفيس واليوتيوب

س/ الشكل المجاور يمثل منحنى الاقترانه قـ(س)، أي من الرسوم الآتية يعد تمثيلاً لمنحنى الاقتران م(س)




الحل

الجواب فرعي د







ب)




أ)

أ. مقصم ريحان

ج)

أ. مقصم ريحان


حصص خاصة أونلاين مميزة 00972598709519





CamScanner بـ صوتيا

خارجي / اذا كان $م(س) = \frac{1}{2}س^2 + 2جاس$ $\quad س \in [0, \pi]$

أوجد فترات التقعر للأعلى وللأسفل ونقط الإنطواف لـ $م(س)$.

الحل ⇐ الاقترانية $م(س)$ متصل على $[0, \pi]$ لأنه مجموع اقترانيتين متصلتين.

⇐ $م'(س) = س + 2جتاس$

⇐ $م''(س) = 1 - 2جاس = صفر \Leftarrow جاس = \frac{1}{2}$

$س = \frac{\pi}{6}$ ، $س = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$

⇐ $م''(س)$ غير موجودة عند أطراف الفترة $(س = 0)$ ، $(س = \pi)$

⇐ إشارة $م''(س)$ : $+++$ | $----$ | $+++$

سلوك $م(س)$ : $\cap$ | $\cup$ | $\cap$

⇐ الاقترانية $م(س)$ مقعر للأعلى في $[0, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{5\pi}{6}, \pi]$ ومقعر للأسفل في $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$

⇐ نقاط الإنطواف $= (\frac{\pi}{6}, م(\frac{\pi}{6})) = (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2\sqrt{2}} + 1)$

$(\frac{5\pi}{6}, م(\frac{5\pi}{6})) = (\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{2\sqrt{2}} + 1)$

أ. معتصم ريحان
مدرسة أونروا الثانوية
شرح كيفي كيس

مثال / اذا كان $م(س) = (س - ا)(س - ب)(س - جـ)$ وكانت النقطة $(د، م(د))$ نقطة إنطواف للاقترانية $م(س)$ أثبت أن $د = \frac{1}{3}(ا + ب + جـ)$

أ. معتصم ريحان

الحل ⇐ $م(س)$ متصل على $ح$ لأنه كثير حدود.

⇐ $م'(س) = (س - ا) \times [(س - ب)(س - جـ)] + [(س - ب)(س - جـ)] \times 1$

⇐ $م'(س) = (س - ا) \times [(س - ب) \times 1 + (س - جـ) \times 1] + (س - ب)(س - جـ)$

⇐ $م'(س) = (س - ا)(س - ب) + (س - ا)(س - جـ) + (س - ب)(س - جـ)$

⇐ $م''(س) = (س - ا) \times 1 + (س - ب) \times 1 + (س - ا) \times 1 + (س - جـ) \times 1 + (س - ب) \times 1 + (س - جـ) \times 1$

⇐ $م''(س) = س - ا + س - ب + س - ا + س - جـ + س - ب + س - جـ$

⇐ $م''(س) = 6س - 2ا - 2ب - 2جـ = 6س - 2(ا + ب + جـ)$

بما أن $(د، م(د))$ نقطة إنطواف $\therefore م''(د) = صفر$

⇐ $6د - 2(ا + ب + جـ) = صفر$

$2(ا + ب + جـ) = 6د$

$د = \frac{1}{3}(ا + ب + جـ)$ #

أ. معتصم ريحان
مدرسة أونروا الثانوية
للبنين خاصة
00972598709519



تم تحويله صوتيا بـ CamScanner

خارجي / الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران مـ(س) إذا كان الاقتران ل(س) = $\frac{|س^2 - 4|}{مـ(س)}$ فجد لَ(١)

أ. معتصم ريحان

الحل لَ(س) = $\frac{مـ(س) \times (|س^2-4|)' - (|س^2-4|) \times مـ'(س)}{(مـ(س))^2}$

لَ(١) = $\frac{مـ(١) \times (-2) - (3) \times مـ'(١)}{(مـ(١))^2}$

لَ(١) = $\frac{3 \times -2 - 3 \times (-3)}{(3)^2}$

لَ(١) = $\frac{-6 + 9}{9}$

انتهى

أ. معتصم ريحان

تابعنا على الفيس واليوتيوب

خارجي / اذا كانت مـ(س) = |س - ١| + ٣ ، س ∈ [-٢، ٢]

فما هي أكبر قيمة للاقتران مـ(س).

(أ) -٢ (ب) ٦ (ج) ٢ (د) ٤

الحل مـ(س) غير موجبة عند (س = -٢)، (س = ٢)

بعد تعريف المطلق

س - ١ = ٠ ⇐ س = ١

(س - ١) (س - ١)

$|س-1| = \begin{cases} 1-س & ، -2 \leq س < 1 \\ س-1 & ، 1 \leq س \leq 2 \end{cases}$

$مـ(س) = \begin{cases} 1-س+3 & ، -2 \leq س < 1 \\ س-1+3 & ، 1 \leq س \leq 2 \end{cases}$

$مـ(س) = \begin{cases} -س+4 & ، -2 \leq س < 1 \\ س+2 & ، 1 \leq س \leq 2 \end{cases}$

مـ(-٢) = -(-٢) + ٤ = ٦ أكبر قيمة للاقتران

مـ(١) = ١ + ٢ = ٣

مـ(٢) = ٢ + ٢ = ٤

أ. معتصم ريحان

00972598709519

* هامش مهم

عوض داخل اقترانه القيمة المطلقة بـ واحد

(١)٢ - ٤ = -٣

بما أنه الجواب سالب نأخذ القاعدة سالبة

∴ -س٢ + ٤

عوض ١ بواحد بعد الاشتقاق بيطلع (-٢)

عوض ١ بواحد مباشرة بيطلع (٣)




* مـ'(١) = ظا ١٢٠ = $-\sqrt{3}$

* مـ(١) = ٣

(17 ص)



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أ. مقصم ريحان
تابعين لم العين واليوتيوب

خاص/ اذا كانه $م(س) = \frac{س - ٣}{س^٢ - ٩}$ فجد :

(P) مجالات التزايد والتناقص للاقترانه $م(س)$ . (ب) القيم القصوى المحلية للاقترانه $م(س)$ إنه وجد

الحل أولاً نجد مجال $م(س)$ $س^٢ - ٩ = ٠ \Leftarrow س = \pm ٣$ $س^٢ - ٩ \neq$ صفر




(*) ∴ مجال $م(س)$ هو $ح - [-٣، ٣]$

(*) الاقترانه $م(س)$ متصل ع مجاله .

(*) $م'(س) = \frac{(س^٢ - ٩) \times (١) - (س - ٣) \times ٢س}{(س^٢ - ٩)^٢} =$ صفر

أ. مقصم ريحان

(*) نضرب الطرفين في $س^٢ - ٩$

⇐ نضع البسط يساوي صفر $س^٢ - ٩ - (س^٢ - ٣س) = ٠$

⇐ $س^٢ - ٩ - س^٢ + ٣س = ٠ \Leftarrow ٣س - ٩ = ٠ \Leftarrow س = \frac{٩}{٣} = ٣$ ∉ للمجال

⇐ لايوجد قيم لسينه تجعل المشتقة تساوي صفر

⇐ لكنه المشتقة غير موجودة عند أطراف الفترة ٣ ، -٣ وهم أطراف المجال

(*) وأطراف الفترة لاتنتمي للمجال .




(*) ∴ $م(س)$ متزايد $]٣، ∞[$

∴ $م(س)$ متناقص $]-∞، -٣[$

(*) ⇐ ولايوجد للاقترانه نقاط حرجة .

⇐ ولايوجد للاقترانه قيم قصوى محلية .

أ. مقصم ريحان
حصص خاصة أونلاين مميزة
00972598709519

خاص/ اذا كانه $م(س) = جتا^٢ س - ٢س$ ، $س \in [٠، ٢\pi]$ ما الفترة التي يكون الاقترانه فيها $م(س)$ متناقصة

(P) $[٠، \frac{\pi}{٢}]$ (ب) $[٠، \frac{٢\pi}{٣}]$ (ج) $[\frac{\pi}{٣}، \pi]$ (د) $[٠، ٢\pi]$

الحل $م'(س) = -٢ جتا س جا س - ٢$

داعماً سالب لانه الجيب في الربع الأول والثاني موجب وتم قريبه في سالب .

$جا ٢س = -٢$ لايوجد قيم لسينه

∴

∴ $م(س)$ متناقص في $[٠، ٢\pi]$

أ. مقصم ريحان / شرح ما كيف كفيك

صفحة 18



CamScanner

خارجي/ اذا كانت $م(س) = جتا س$ ، $س \in [0 ، \frac{\pi}{2}]$ فإن للاقتران $م(س)$ نقطة حرجة عندما $س$ تساوي

(أ) $\frac{\pi}{4}$ (ب) $\frac{\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{2}$ (د) $\frac{\pi}{2}$

الحل/ $م(س) = ٢(جتا س)(-جا س) = -جا ٢س$

← نأخذ مشتقة مركبة

السؤال طلب النقاط الحرجة للاقتران $م(س)$

إذاً نشتق الاقتران $م(س)$ كما نرة ونساوي بصفر

$م'(س) = -٢ جتا ٢س = صفر \Leftarrow$ جتا $٢س = صفر$ ∴

$٢س = \frac{\pi}{2}$ مقبولة

$٢س = \frac{٣\pi}{2}$ مرفوضة لأنها خارج الفترة

∴ $س = \frac{\pi}{4} \in ]0 ، \frac{\pi}{2}[$

← هذه هي النقطة الحرجة للاقتران $م(س)$

أ. معتصم ريحان

خارجي/ اذا كان $م(س) = (س^٢ - ١)^٣ (س - ١)^٤$ ما الفترة التي يكون فيها الاقتران $م(س)$ متناقصاً

(أ) $[٢ ، \infty[$ (ب) $]-\infty ، -١]$ (ج) $[-١ ، ٢]$ (د) $[-١ ، ١]$

الحل/ $م(س) = ٠$ ∴ $(س^٢ - ١)^٣ = ٠$ أو $(س - ١)^٤ = ٠$

$س^٢ - ١ = ٠$ ، $س = ١$

$س^٢ = ١$

$س = \pm ١$

| | $-١$ | | $١$ | |
|---|---|---|---|---|
| $م'(س)$ | + | − | 0 | + |
| سلوك $م(س)$ | ↗ | ↘ | | ↗ |

$م(س)$ متناقص في $[-١ ، ١]$

أ. معتصم ريحان

خارجي/ اذا كان $م(س)$ كثير حدود من الدرجة الثالثة معرف على $[أ ، ب]$

ما أكبر عدد من النقاط الحرجة للاقتران $م(س)$

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

شرح كيف كيفك

الحل $م(س)$ من الدرجة الثالثة وعند اشتقاقه يصبح من الدرجة الثانية

إذاً $م(س)$ له أكثر حالة نقطتين حرجتين ، وقد تكون طرف فترة عندئذ

إذاً يصبح أكبر عدد للنقاط الحرجة (٣) نقط.

أ. معتصم ريحان

خارجي/ إليك منحنى الاقتران $م'(س)$ المعرف على $ح$ فإن نقاط الانطاف لمنحنى $م(س)$




(أ) $\{٢\}$ (ب) $\{٣\}$ (ج) $\{٣ ، ٢\}$ (د) $\{٣ ، ٠\}$

الحل

| | $٣$ | | $٣$ | |
|---|---|---|---|---|
| إشارة $م'(س)$ | + | − | − | + |
| سلوك $م(س)$ | ∪ | ∩ | ∩ | ∪ |

∴ $(٣ ، م(٣))$ نقطة انطاف

وهي عندما $س = \{٣\}$

أ. معتصم ريحان

حصص خاصة أونلاين (19 ص)



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خارجي / اذا كانة م(س) اقترانة كثير حدود معرف على [-١، ٢] ولة ٣ نقاط حرجة في هذة الفترة، م'(١) = صفر ، م''(س) < صفر في الفترة ]-١، ٢[
فأي العبارات التالية صحيحة دائماً :- أ. معتصم ريحان

(أ) م(١) قيمة صغرى محلية (ب) م(س) متزايد على [١، ٢]

(ج) م(س) متزايد على [-١، ١] (د) (-١، م(-١)) نقطة إنعطاف

الحل :: م'(١) = صفر ∴ عندس = ١ نقطة حرجة.
واطراف الفترة [-١، ٢] ايضاً نقاط حرجة
وبما أنه م''(س) < صفر ∴ م'(١) > صفر ∴ م(١) قيمة عظمى محلية حسب اختبار المشتقة الثانية




∴ م(س) متزايد على [-١، ١] #

أ. معتصم ريحان
00972598709519
شرح على كيف كيفك

خارجي / الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران م(س) ، والاقترانان هـ(س) ، ك(س) المعرفين على الفترة [P، ب] بين أن الاقتران م(س) = ك(س) / هـ(س) متزايد في الفترة [P، ب]




الحل هـ(س) > صفر في [P، ب] لأنه فوق محور السينات.
ك(س) > صفر في [P، ب] لأنه فوق محور السينات.
م'(س) > صفر لأنه م(س) متزايد في [P، ب]
هـ'(س) < صفر لأنه هـ(س) متناقص في [P، ب]
ك'(س) > صفر لأنه م(س) مقعر لأعلى في ]P، ب[
ك''(س) > صفر لأنه ك(س) مقعر لأعلى في ]P، ب[

م(س) = ك(س) / هـ(س) ⇐ م'(س) = (هـ(س) × ك'(س) - م'(س) × هـ'(س)) / (هـ(س))^٢

∴ م'(س) = (⊕ × ⊕ - ⊕ × ⊕) / ⊕

⊕ = (⊕ + ⊕) / ⊕ = م'(س)

∴ م'(س) > صفر ∴ م(س) متزايد في [P، ب] #

أ. معتصم ريحان
حصص خاصة أونلاين على الزوم
تابعين على الفيس والبوستر

ص 20


CamScanner ممسوحة ضوئيا بـ

مثال / معتمداً على رسم $م'(س)$ ، $م''(س)$ أوجد قاعدة الاقتران
$م(س) = أ س^3 + ب س + جـ$ الذي يمر بالنقطة $(0، 2)$ ثم أوجد الفترة
التي يكون فيها الاقتران $م(س)$ متزايد ومقعر للأسفل معاً.




الحل / نستنتج من الرسم
$م'(0) = -3$ ، $م'(3) = م''(3)$
معطى أن $م(س)$ يمر بالنقطة $(0، 2)$
$م(0) = أ(0)^3 + ب(0) + جـ$
$جـ = 2$ #

$م'(س) = 3أ س^2 + ب \Leftarrow م''(س) = 6أ س$
$م'(0) = 3أ(0)^2 + ب$
$ب = -3$ #

$م'(3) = م''(3)$
$27أ - 3 = 18أ$
$9أ = 3 \Leftarrow أ = \frac{1}{3}$ #

$\therefore م(س) = \frac{1}{3} س^3 - 3س + 2$
$\therefore م'(س) = س^2 - 3 = 0 \Leftarrow س = \pm\sqrt{3}$




$\therefore م(س)$ متزايد في $]-\infty، -\sqrt{3}[ \cup ]\sqrt{3}، \infty[$
$م''(س) = 6س = 0 \Leftarrow س = 0$




$\therefore م(س)$ مقعر للأسفل في $]-\infty، 0[$
$\therefore م(س)$ متزايد ومقعر للأسفل في الفترة $]-\infty، -\sqrt{3}[$

المشترك

أ. معتصم ريحان


أ. معتصم ريحان
تابعين لنا الفيزياليوتيوب
00972 598709519
حصص خاصة أونلاين مميزة




CamScanner ممسوحة ضوئيا بـ

مثال / معتمداً على منحنى $م(س)$ المعرف على الفترة $[0، 6]$ ، فبأنه إحدى العبارات التالية صحيحة دائماً :- أ. معتصم ريحان

(أ) $م'(3) < م'(4) < م'(5)$

(ب) $م''(1) < م(2) < م''(5)$

(ج) $م(2) < م'(4) < م(5)$

(د) $م''(5) < م'(2) < م'(3)$










أ. معتصم ريحان

خارجي / إذا كانت $م(س) = 1 + ق^2(س)$ ، وكانت $ق(س)$ كثيرة حدود والمنحنى مفتوح محلي عند $(1، -5)$ ، أثبت أنه للاقتران $م(س)$ نهاية عظمى محلية عند $س = 1$

الحل $ق(1) = -5$ ، $ق'(1) = صفر$ $\quad$ $ق''(1) > صفر$




$م(س) = 1 + ق^2(س)$

$م'(س) = 2 ق(س) \times ق'(س)$

$م''(س) = 2 \left( ق(س) \times ق''(س) + ق'(س) \times ق'(س) \right)$

$م''(1) = 2 \left( ق(1) \times ق''(1) + ق'(1) \times ق'(1) \right)$

$م''(1) = 2 \left( -5 \times \oplus + صفر \times صفر \right)$

$م''(1) =$ (سالب) $< صفر$

$\therefore$ $م(1)$ نهاية عظمى محلية حسب اختبار المشتقة الثانية

* ملاحظة مهمة : إذا كان $م(س)$ مقترن نهاية محلية عند $س = ك$ إذاً $ق''(1) > صفر$ حسب اختبار المشتقة الثانية


أ. معتصم ريحان
00972 598709519

حصص خاصة أونلاين مميزة



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خارجي / اذا كانت هـ(س) معرف ف [٠ ، ٣] وكانت هـ(١) = -٢ ، هـ(١) = صفر ، هـ(١) = ٣

حاول تحل

أ) -٣ ب) -٢

ج) صفر د) ١

---

خارجي / اذا كانت هـ(س) كثير حدود من الدرجة الرابعة معرف ف [أ ، ب] فإن عدد نقاط الإنعطاف

حاول تحل

أ) نقطة ب) نقطتين

ج) نقطتان على الأكثر د) نقطتان على الأقل

---

خارجي / اذا كان لمنحنى هـ(س) = جا س + أ س^٢ نقطة إنعطاف عندما س = π/٢ فإن قيمة أ

حاول تحل

أ) صفر ب) ١/٤

ج) ١/٢ د) ١

---

خارجي / إذا كانت هـ(س) > هـ(س_١) لكل س > س_١ فإن هـ(س)

حاول تحل

أ) تزايدية ب) متناقصة

ج) مقعرة لأسفل د) مقعرة لأعلى



ممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(*) المسئلة حاول أن تحلها بنفسك * أ. معصم ريحان

تطبيقات حياتية / دائرة نصف قطرها ٢٠ سم، أوجد مساحة أكبر سبتة مخروطي مرسوم داخلها بحيث الرأسان ب، جـ على نهايتي قطر في الدائرة والرأسان P، د على محيط الدائرة.

قيم قصوى وتقعر وانعطاف / اذا كانت $م(س) = س^3 - 3س^2 - 9س + 5$ ، $س \in [-2، 5]$

أوجد (أ) فترات التزايد والتناقص (ب) القيم القصوى المحلية والمطلقة
(جـ) التقعرات ونقط الإنعطاف.

تقاطع حر / مجموعة الإحداثيات السينية لنقاط الحرجة للاقتران $م(س) = س^4 - 16س$ تساوي

(أ) $\{0، 16\}$ (ب) $\{0، 8، 16\}$ (جـ) $\{0، 8\}$ (د) $\{8، 16\}$

س / أحد الاقترانات الآتية متصل وغير مشتق عند $س = 0$

(أ) $[س]$ (ب) $|س|$ (جـ) $س|س|$ (د) $س^2$

س / اذا كانت $م(س)$ كثير حدود بحيث $م(1) = 0$ ، $ق(1) \times ق(2) < 0$
وكانت $ق(2) > 0$ فإن النقطة $(1، م(1))$ تكون لاقتران $م(س)$
(أ) حرجة محلية (ب) عظمى محلية (جـ) إنعطاف (د) غير ذلك.

س / اذا كانت $م(س) = \sin س$ ، $س \in [\frac{\pi}{4}، \pi]$ فإن $م(س)$ متناقص في الفترة
(أ) $[\frac{\pi}{2}، \pi]$ (ب) $[\frac{\pi}{4}، \pi]$ (جـ) $[\frac{\pi}{4}، \frac{\pi}{2}]$ (د) $[\frac{\pi}{4}، \frac{\pi}{3}]$

س / إذا كانت $م(س) = جاس + جتاس$ ، حيث $س \in [0، 2\pi]$ ، عين فترات التزايد والتناقص والقيم القصوى المحلية لمنحنى $م(س)$

س / الشكل المجاور يمثل منحنى $ق'(س)$ فإن نقطة إنعطاف الاقتران $ق(س)$ عندما $س$ تساوي




(أ) ٢ (ب) ٣
(جـ) ٤ (د) غير ذلك

ص 24


CamScanner

خارجي / اذا كانت م(س) = س + $\frac{ب}{س}$ تحقق شروط نظرية رول في الفترة [١، ٥] فإن قيمة ب تساوي :-

أ ٤ ب ٥ ج ١ د ٦

أ. معتصم ريحان

خارجي / مجموعة قيم جـ التي تعينها نظرية القيم المتوسطة على الفترة م(س) = [$\frac{س^٢}{٢}$ + ٢] في الفترة [١، ٢] هي :-

أ [١، ٢] ب ]١، ٢] ج ]١، ٢[ د {١}

خارجي / اذا كانت م(س) = $س^{\frac{٣}{٢}}$ فإن قيمة س الناتجة من تطبيق نظرية القيمة المتوسطة على الاقتران م(س) في الفترة [٠، ٨] هي

أ $\frac{٢٧}{٦٤}$ ب $\frac{٦٤}{٢٧}$ ج $\frac{٢٧}{٨}$ د $\frac{٨}{٧}$

أ. معتصم ريحان

خارجي / جميع الاقترانات التالية لا تحقق شروط رول على أي فترة [أ، ب] عدا واحدة هي

أ م(س) = ٢س - ٥ ب م(س) = $س^٤$ ج م(س) = ظاس د $\frac{١}{س}$

خارجي / لا يمكن تطبيق نظرية رول على الاقتران م(س) = $(س-٢)^{\frac{٣}{٥}}$ على الفترة [١، ٣] لأن

أ م(١) ≠ م(٣) ب للعددين م(١)، م(٣) الإشارة نفسها

ج م(س) غير متصل عند س = ٢ د م(س) غير قابل للاشتقاق عند س = ٢

خارجي / اذا كانت م(س) = $\begin{cases} [\frac{س}{٢}+١] & ، ٢ \leq س < ٣ \\ ٢س - ٤ & ، ٣ \leq س \leq ٥ \end{cases}$ بين أن م(س) لا تحقق شروط القيمة المتوسطة في [٢، ٥]

ثم اكتب أطول فترة جزئية مغلقة في الفترة [٢، ٥] يتحقق فيها م(س) شروط نظرية القيمة المتوسطة ثم عين قيم جـ .

أ. معتصم ريحان 0097259870959

خارجي / اذا كانت الاقتران م(س) = $\begin{cases} س^٢ + ٤س + ٥ & ، س \leq ١ \\ \frac{١٠}{س} & ، س > ١ \end{cases}$

فأبحث في تحقق شروط نظرية رول على الاقتران م(س) في الفترة [-٤، ٢] وهل يوجد جـ ∈ ]-٤، ٢[ بحيث م'(جـ) = صفر

تابعني على الفيس والبوتيوب وجروبات الواتس والتليجرام

أ. معتصم ريحان

خارجي / بين أن م(س) = ٢جاس - جتا٢س تحقق شروط رول في [٠، ٢π] ثم جد قيمة / قيم جـ التي تحددها النظرية .

25

خارجي / ليكن $م(س) = (س-1)$ جاس $\forall$ س $\in [0,1]$ باستخدام نظرية رول
أثبت وجود جـ $\in ]0,1[$ ، ظاجـ $= 1-$ جـ

خارجي / اذا كان $م(س) = \frac{1}{س}$ ، س $\in [أ,ب]$ ، س $\neq$ صفر فأثبت باستخدام
نظرية القيمة المتوسطة $أ^2 < أب < ب^2$ أ. مقصم ريحان

خارجي / باستخدام نظرية القيمة المتوسطة أثبت أن $|$جاب $-$ جاأ$| \leq |ب-أ|$
$\forall$ أ، ب $\in$ ح
أ. مقصم ريحان

خارجي / اذا كان $م(س) =$ س جاس ، س $\in [0, \frac{\pi}{2}]$ تحقق نظرية رول لإثبات
أن القيمة التي تعينها النظرية هي عندما جـ $=$ ظاجـ
أ. مقصم ريحان

خارجي / اذا كان $م(س) = \frac{أ}{س} + س$ ، أ $\neq$ صفر ، س $\in [س_1, س_2]$ ، صفر $< س_1 < س_2$
أثبت وجود جـ $\in ]س_1, س_2[$ بحيث جـ$^2 = س_1 س_2$

خارجي / اذا كان $هـ(س)$ ، $م(س)$ اقترانين كثيري حدود موجبين متقاطعين
عند النقطتين $(س_1, ص_1)$ ، $(س_2, ص_2)$ ، أثبت أنه يوجد على الأقل جـ $\in ]س_1, س_2[$
بحيث أن $\frac{م(جـ)}{و(جـ)} = \frac{م'(س)}{و'(س)}$ ، $و'(س) \neq$ صفر
أ. مقصم ريحان
تابعين على الغير واليوتيوب

خارجي / باستخدام نظرية رول بين أنه لأي اقتران كثير حدود من الدرجة الثالثة مختلف
إذا قطع منحناه محور السينات في ثلاث نقاط فإنه منحنى $م'(س)$ يقطع محور السينات
في نقطة واحدة على الأقل. أ. مقصم ريحان

خارجي / جد قيمة جـ التي تعينها نظرية القيم المتوسطة للاقتران $م(س) = |س^3 - 5س - 6|$
في الفترة $[0, 1]$
أ. مقصم ريحان 0097259870951 9

خارجي / اذا كان $م(س) = \begin{cases} -س^3 + 3س + جـ & ، س < 1 \\ أس + ب & ، 1 \leq س \leq 2 \end{cases}$ ، س $=$ صفر
جد الثوابت أ، ب، جـ
التي تجعل الاقتران $م(س)$
يحقق شروط المتوسطة
على $[0, 2]$ (صفر 26)

أ. مقصم ريحان

دروس خاصة أونلاين شرح على كيف كيفك
0097259870951 9


CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| دولة فلسطين | | التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٩ |
| وزارة التربية والتعليم | | الصف : ١٢ -علمى |
| مديرية التربية والتعليم – نابلس | | المبحث : الرياضيات |
| المدرسه :الملك طلال الثانويه | الجلسه الاولى | |

١): **اذا كان** $أ = \begin{bmatrix} س & ٢ \\ ٥ & ص \end{bmatrix}$ منفردة وكان $|أ - م_٢| = -٢$ فان المقدار $ص^٢ + س^٢ =$

أ) ٢٢ ب) ٣٣ جـ) -١١ د) ٤٤

**اذا كانت** $س = \begin{bmatrix} أ & ب \\ جـ & د \end{bmatrix}$، $|س| = ١$ **فان** $س^{-١} + س =$ **الكخن ٢٠٢١ -kh-2021**

أ) و ب) $(د - أ) م_٢$ جـ) $(د + أ) م_٢$ د) $(د \times أ) م_٢$

**اذا كانت** $س = \begin{bmatrix} ١ & ٥ \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$ ، $س^{٢٠٠} =$

أ) $\begin{bmatrix} ١ & ٢٠٠٠ \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix} ١ & ١٠٠٠ \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$ جـ) $\begin{bmatrix} ١ & ٥^{٢٠٠} \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$ د) $\begin{bmatrix} ١ & ٢٠٠^{٥} \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$

٤) **أ،ب مصفوفتان من الرتبه الثالثه بحيث** $أ_{ص ع} = ٢ص - ع$ ، $ب_{ص ع} = ع - ص$ **فان أ+ب=**

أ) $\begin{bmatrix} ١ & ١ & ١ \\ ٢ & ٢ & ٢ \\ ٣ & ٣ & ٣ \end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix} ٣ & ٢ & ١ \\ ٤ & ٣ & ٢ \\ ٥ & ٤ & ٣ \end{bmatrix}$ جـ) $\begin{bmatrix} ٢ & ١ & ٠ \\ ١ & ٠ & ١- \\ ٠ & ١- & ٢- \end{bmatrix}$ د) $\begin{bmatrix} ٢ & ١- & ٣ \\ ٠ & ١ & ٢- \\ ٤ & ٣- & ٠ \end{bmatrix}$

**أ مصفوفه من الرتبه** $م \times ن$ **وعند تبديل الصفوف بالاعمدة اصبحت من الرتبه** $(٢م - ١) \times (ن - ١)$ **فان**

**م+ن =** أ) **٢** ب) **٤** جـ) **٥** د) **٦**

٨) س،ص غير منفردتين مربعتين من الرتبه ن×ن بحيث $|٢س ص^{-١}| = ١٦$ ، $|س| = ٣$ ، $|س| = ١٢$

فان قيمه ن هى أ) ٣ ب) ٦ جـ) ٥ د)٣٢

٩) **أ،ب،جـ ثلاث مصفوفات احدى التاليه صائبه:**

أ) اذا كان $|أ| = |أ^{-١}|$ **فان** $|أ| = \pm ١$

ب) $|٢أ| = ٢^{٤} |أ|$

جـ) **اذا كان** $أ \cdot ب = أ \cdot جـ$ ، $|أ| \neq ٠$ فان **ب =جـ**

د) **الاجابه جـ+ب**

٢) الشكل التالى ق ′(س) كثير الحدود المعرف على ح نقطه الانعطاف ومجال تناقص ق ′(س) على الترتيب

أ) (٢، ق(٢)) ، ]-∞، ٢[ ب) (-٢، ق(-٢)) ، ]-٢، ٠[

جـ) (-١، ق(-١)) ]-∞، -٢[ د) (٠، ق(٠)) ، ]-٢، ∞-[




الكخن ٢٠٢١ = kh2021

٣) ق(س) = [٢س - ٤] ، س ∈ [٠، ٢] فان جميع قيم س التى يكون لها حرجه هى

أ) ٠ ب) {٠، ١، ٢} جـ) [٠، ٢] د) ]٠، ٢[

٥) معادله المماس للعلاقه س$^{٢}$ + ص$^{٢}$ = ١ عند النقطه (٠، ١) هى أ) ص=١ ب) س=-١ جـ) س=١ د) ص=-١

٧) إذا كان متوسط تغير الاقتران ه(س) في الفترة [١ ، ٣] يساوي ٥ وكان ه(١) × ه(٣) = ١٢،

هـ(س) = $\frac{١}{ق(س)}$ فإنَّ متوسط تغير الاقتران هـ (س) في الفترة نفسها هو

الكخن ٢٠٢١ = kh2021

أ) $\frac{٥}{١٢}$ = ب) $\frac{٥}{١٢}$ - = ج) $\frac{١}{٥}$ - = د) $\frac{١}{٥}$ =

١١) ق(س) معرف [أ ، ب]، ومتزايد ويقع فى الربع الرابع ، ق(س) ≠ ٠ : ع(س) = $\frac{هـ^{س}}{ق(س)}$ فان ع(س)

أ) يكون متزايد على [أ ، ب] ب) ثابت على [أ ، ب]

جـ) متناقص على [أ ، ب] د) لايمكن التحديد

١٢) عدد القيم القصوى للاقتران:ه(س) = $\frac{أ س^{٣} + ب}{ج س + ء}$ علمان بان أ ء - ب ج ≠ ٠ ، س ≠ - $\frac{ء}{ج}$ ه(س) ≠ ٠؟

أ) ١ ب) ٢ جـ) ٣ د) ٠

الكخن ٢٠٢١- kh-2021

١٣) ق(س) كثير حدود زاويه ميل المماس لمنحى ق′(س) عند اى نقطه عليه على ]٢،٥[ هى زاويه منفرجه احدى التاليه

صائبه أ) ق متناقص على [٢،٥] ب)ق متزايد على [٢،٥]

جـــ) ق مقعر للاعلى على ]٢،٥[ د ) ق مقعر للاسفل ]٢،٥[

١٤) $\lim_{هـ \to 0} \frac{جا^{٣}(٤س + ٣هـ) - جتا^{٣}\left(\frac{\pi}{٢} - ٤س\right)}{٦هـ} =$ الكخن ٢٠٢١=H2021

أ) $\frac{٣}{٤}$جا٤س جا٨س ب) $\frac{٣}{٤}$جا٤س جا٨س جـ) $-\frac{٣}{٤}$جتا٤س جا٨س د) $-\frac{٣}{٤}$جتا٤س جتا٨س

١٥) .إذا كان قـ(س) معرفاً على [– ١ ، ١] ، قَ(س) موجودة في ]– ١ ، ١[ ويوجد عند س = ٠ نقطة انعطاف ، فإن إحدى العبارات التالية صحيحة دائماً:

أ. منحنى قـ مقعر للأسفل على [– ١، ١] وللأعلى على [٠، ١] ب. قـ له نقطة حرجة في ]– ١، ١[

جـ. قَ له نقطة حرجة في ]– ١ ، ١[ د. قَ له نقطة حرجة في ]– ١ ، ١[

١٦) ص = ١ – ٥س مماسا للاقتران ق(س) عند(٢، -٩)فان $\lim_{هـ \to 0} \frac{ق(٣هـ + ٢) - ق(٢)}{١٥هـ} =$

أ)-١٥ ب)١ جـ)-٥ د)-١

١٧)اذا كانت $ص = \frac{١}{أ}\left(هـ^{\frac{١}{٢}أس} + هـ^{-\frac{١}{٢}أس}\right)$ فان ص″= الكخن ٢٠٢١=H2021

أ) $\frac{ص}{أ}$ ب)- أ ص جـــ) $\frac{ص}{س أ^{٢}}$ د) $\frac{ص}{أ^{٢}}$

١٩)تحرك جسم فى خط مستقيم حسب العلاقه ف(ن) = ن$^{٤}$ – ٢ ١ن$^{٣}$ + ٨ن$^{٢}$ – ٦ بالاعتماد على ذلك اجب عن السؤالين التاليين ٣) اقل تسارع ممكن للجسم هو : أ) ٣ ب)-٣ جـــ) ٩٢ د)-٩٢

١٣) مجموعه قيم ن التى يكون عندها التسارع متناقص الكخن ٢٠٢١ -kh-2021

أ) ]–∞،٣–[ ب) ]٣،+∞[ جـ) ]٠،٣+[ د) ]–∞،٣–[

٢٠) إذا كان ق(س) = س $^{\frac{١}{٣}}$ (س – ٢) $^{\frac{١}{٣}}$ ∋ ح ، فإنَّ مجموعة الإحداثيات السينية للنقاط الحرجة هي:

أ.{ ١، ٢ ، ٠ } ب. {– ١ ، – ٢} جـــ) {١} د. {– ١، ،-٢، ٠ ، $\sqrt{٣}$}

٢٢)الشكل التالى ا ق "(س) مجموعه قيم س التى تكون عندها نقطه انعطاف




أ) {٠} ب) {٤،٠} جـ) {٣} د) ∅

٢٣)اذا كان ا × ب = $\begin{bmatrix} ٣ & ١ \\ ٥ & ١- \end{bmatrix}$ ، ا × جـ = $\begin{bmatrix} ٢ & ٣- \\ ١ & ٤- \end{bmatrix}$ ، |ا| ≠ ٠ فان ب+جـ= الكخن ٢٠٢١=H2021

أ) ا ب) م جـ) ا$^{-١}$ د)و

٢٤)اذا كانت أ غير منفردة ومربعه وكان ا$^{٢}$ + ا س = ا فان س=

أ) − ا ب) ا$^{-١}$ جـ) م$_{٢}$ د) م$_{٢}$ − ا

السؤال الثانى : ٢٠ علامه

أ) ق(س) = س + $\frac{٢٥}{س}$ :س ∈ [−٨،٨] − {٠} جد ١) الاحداث السينى للنقاط الحرجه ٦علامات

٢) جد مجالات التزايد والتناقص للاقتران ق ٣) القيم القصوى وحدد نوعها ٨علامات

ب) اذا كانت ا = $\begin{bmatrix} ٥ & ٣- \\ ٢- & ٤ \end{bmatrix}$ ، ب = $\begin{bmatrix} ٢- & ١ \\ ٤ & ٣ \end{bmatrix}$ حل المعادله ا$^{-١}$ (س$^{-١}$ × ب)$^{-١}$ = م$_{٢}$ + ب

جـ) جد نقطه على منحنى العلاقه ٣ص$^{٢}$ + ٢س$^{٢}$ = ٣٠ التى يكون المماس موازى للمستقيم

٥ = ٢ص + ٢س ٦علامات

السؤال الثالث :

أ) حل المعادله المصفوفيه ٣س + $\begin{bmatrix} ٤ & ١ \\ ٧ & ٢- \end{bmatrix}$ − $\begin{bmatrix} ١٠ & ٦- \\ ٣- & ٢ \end{bmatrix}$ = س $\begin{bmatrix} ٥ & ٩ \\ ٣- & ١٦ \end{bmatrix}$ ٨علامات

ب) اذا كان جاص = $\frac{٢}{قتاس٨}$ اثبت ان (ص ′)$^{٢}$ = ٣قا$^{٢}$ص + ١ ؟ الكخن ٢٠٢١- kh-2021 ٦ علامات

حـ) من قمه برج يرتفع ٤٨ قدم قذف جسم رأسيا الى الاعلى حسب العلاقه ف(ن) = −٦ ١ن$^{٢}$ + ٣٢ن وفى اللحظه نفسها قذف جسم ثانى من سطح الارض للاعلى حسب ف(ن) = −٦ ١ن$^{٢}$ + ع$_{٠}$ن جد ع$_{٠}$ للجسم الثانى عندما يتساوى اقصى ارتفاع للجسمين عن سطح الارض؟ ٦علامات

السؤال الرابع :أ) $ن(س) = \text{جتا}(\frac{\pi}{٤}س)$ ، $هـ(س) = ٢\sqrt{س} + ١$ ، $(ن \circ هـ)'(١) = \sqrt{٢}$ جد الثابت أ ٨علامات

ب ) عند حل نظام باستحدام كريمر وجد ان $|أ_س \times أ_ص| = ٣٢$ ، $س = ٢$ ، $ص = ٤$ ، $|أ| < ٠$

جد $|أ|$ ٦ علامات

جـ) $ق(س) = ن'(س) = \text{جا}\pi س + \text{جتا}\pi س \in [٠،٢]$ عين مجالات التقعر للاعلى للاسفل؟ ٦علامات

---

الخامس:أ) $ن(س) = \begin{cases} |-٦ + س^{٢} - س| & ، ٠ \leq س < ١ \\ ب + أس & ، ١ \leq س < ٢ \\ جـ & ، س = ٢ \end{cases}$ يحقق المتوسطه على مجاله جد الثوابت أ،ب،جـ

ثم جد جـ التى تعنيها النظريه ٨علامات

ب) $\begin{vmatrix} أ & أ+ب & أ+٢ب \\ أ+٢ب & أ & ب+أ \\ ب+أ & أ+٢ب & أ \end{vmatrix} = ٩ب^{٢}(أ+ب)$ ٦علامات

ج،) أذا كان متوسط التغير للاقتران ق(س) على $[-١،١]$ يساوى ٧ وكان $هـ(س) = س ن^{٢}(س) + ٤س$

احسب متوسط التغير للاقتران على $[-١،١]$ علما بان $ن(١) \times هـ(١) = -٨$ ٨علامات

---

السادس:أ) اذا كانت العلاقه $\frac{١}{٢}ع^{٣} + \frac{٩}{ف} = ٧$ تربط ازاحه الجسم مع سرعته جد التسارع عند ما يكون قد قطع ٣م

**الكخن ٢٠٢١=H2021** ٦علامات

ب) : استخدم طريقه جاوس لايجاد مجموعه حل النظام

$س + ٣ص - ع = -٤$ ، $٢س + ٣ص + ٢ع = ٢$ ، $٩ = ٤ع - ص + س$ ٦علامات

حـ) كثير حدود من الدرجة الثالثة له عظمى محليه عند $س = س_{١}$ وصغرى محليه عندس $س = س_{٢}$ اثبت ان الانعطاف يحد

عند $س = \frac{س_{١} + س_{٢}}{٢}$

---

السابع:أ) كثير حدود من الدرجه الثالثه له حرجه واحدة فقط عند س=و اثبت ان الانعطاف له يحدث

عندس=و ٦علامات

ب)اذا كان س مربعه من الرتبه الثانيه بحيث $س^{-١} = س$ حل المعادله $س^{٣} - ٢س = \begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ -١ & -٢ \end{bmatrix} + ٢س$ ٦علامات

جـ) ق((س) كثير حدود معرف على $[١،٣]$ يقع فى الرابع ومتزايد على مجاله كان $هـ(س) = ١٠ - س^{٢}$

جد مجالات التزايد والتناقص للاقتران $ل(س) = (هـ(س) \times ن(س))^{٢}$ على نفس الفترة ٨علامات

الثامن أ) كثير حدود من الدرجة الثانية اثبت ان الوتر الواصل بين النقطتين $(س_١، ق(س_١))، (س_٢، ق(س_٢))$ يوازى المماس المرسوم لمنحنى ق(س) عند $\frac{س_١ + س_٢}{٢}$ ٦علامات

ب) . ا ب ج مثلث طول قاعدته ب ج يساوي ١٢سم ، وطول ارتفاعه النازل من الرأس ا يساوي ١٦سم فرضت نقطة د على ب ج ، ثم رسم مستقيم ب ج ، ثم رسم مستقيم يوازي ب ج ويقطع ا ب ، ا ج في نقطتين هـ ، و أحسب طول العمود النازل من و على هـ لتكون مساحة المثلث هـ د و أكبر ما يمكن

جـ) اذا كانت $ا = \begin{bmatrix} ١ & ٠ & ٠ \\ ٢ & ١ & ٠ \\ ٣ & ٢ & ١ \end{bmatrix}$ كانت $جـ_١$ ، $جـ_٢$ مصفوفتى عمود حيث $ا جـ_١ = \begin{bmatrix} ١ \\ ٠ \\ ٠ \end{bmatrix}$ ، $ا جـ_٢ = \begin{bmatrix} ٠ \\ ١ \\ ٠ \end{bmatrix}$

جد $جـ_١ + جـ_٢$ ٦علامات

H2021=٢٠٢١ الكخن

التاسع:أ) وعاء اسطوائى غطائه نصف كرة مساحه سطحه $٨٠\pi$ جد اكبر حجم ممكن للوعاء ٨ علامه؟

ب) ) عند حل نظام باستخدام كريمر وجد ان

$ا_س - ا_ص = \begin{bmatrix} ٤ & ٦- \\ ١ & ٠ \end{bmatrix}$ ، $ا_ص - ٢ا_س = \begin{bmatrix} ٧ & ٩- \\ ٣- & ٢- \end{bmatrix}$ جد س،ص

جـ) ا الشكل التالى $ق'(س)$ على $[-٢،٤]$ بالاعتماد اجب

١)قيم س الحرجه للاقتران ق

٢)التزايد والتناقص ل ق(س)

٤)التقعر للاعلى وللاسفل للاقتران ق(س) ونقطه الانعطاف؟




KH-2021-أ-بلال

H2021=٢٠٢١ الكخن

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي
مديرية التربية والتعليم – خان يونس

# امتحان نهاية الفصل الأول

## للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢

*المبحث : الرياضيات*

الصف: الثاني عشر علمي
الزمن :
التاريخ: / /

اسم الطالب : _____

**القسم الأول: يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعاً**

## السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة : ( ٣٠ علامة)

١) إذا كان متوسط تغير الاقتران ق(س) في [١، ٣] يساوي ٤ وكان متوسط تغيره في [٣،٥] يساوي ٨ ، فإن متوسط تغير الاقتران في [١،٥] يساوي

أ) ٢ ب) ٢٤ ج) ٦ د) ١٢

٢) إذا كان $\lim_{س \to ١} \frac{ق(س)-٢}{س-١} = ٣$ ، وكان ق(س) متصلاً على ح فإن $\lim_{س \to ١} \frac{س^{٣} ق(س) - ق(١)}{س-١}$ ؟

أ) ٩ ب) ٦ ج) ١٤ د) صفر

٣) أي من الاقترانات الأتية يكون قابلاً للاشتقاق على مجاله

أ) ق(س)= [ س + $\frac{١}{٢}$ ] – [س] ب) ق(س) = $\sqrt{٣٦-س^{٢}}$

ب) ق(س) = $س^{٥} + س^{\frac{١}{٣}}$ د) ق(س) = | $س^{٢}$ + ٢س +١|

٤) إذا علمت أن ص=$ع^{٢}$ ، ع= جاس – جتاس ، فما قيمة $\frac{د ص}{د س}$ ؟

أ) ٢جتا٢س ب) ٢جا٢س ج) –٢جتا٢س د) صفر

٥) يتحرك جسم على خط مستقيم بحيث أن بُعده بالأمتار عن النقطة (و) بعد ن ثانية يعطى بالعلاقة :
ف= $ن^{٢}$ + ك ن + ٣ فإذا كانت سرعته المتوسطة في الفترة [٥،٢] تساوي ١١ فما قيمة الثابت ك ؟

أ) –٤ ب) ٤ ج) $\frac{-١٠}{٣}$ د) ٧

٦) إذا كان ق(س) = س+ | س–١| ، فإن مجموعة قيم س التي يكون عندها نقاط حرجة للاقتران ق(س) هي

أ) ١ ب) ٠ ج) ]– ∞ ، ١[ د) ]– ∞ ، ١[

٧) إذا كان ق(س) اقتراناً معرفاً على الفترة [–٢،٦] وكانت $ق'$(س) ممثلة في الشكل المجاور، ٠فما الفترة التي يكون فيها ق(س) مقعراً للأسفل




أ) ]–٢،٦[ ب) ]–٢،٠[ ج) ]–٢،٣[ د) ]٣،٦[

٨) ما مجموعة قيم جـ التي تحددها نظرية رول على الاقتران ق(س) = ٩ في [٠،١]

أ) Ø ب) {٠} ج) ]٠،١[ د) [٠،١]



اقلب الصفحة

٩) **يتحرك جسيم في خط مستقيم بحيث** $ع^{٢} = ١ + ٨\sqrt{ف + ن}$ **، ف: المسافة بالأمتار، ن: الزمن بالثواني ، فجد تسارع الجسيم عندما تكون سرعته ٥م/ ث .**

أ) ٠,٨ ب) ٠,٤ ج) ٠,٢ د) ٠,٥

١٠) **ماالعبارة الصحيحة دائماً من العبارات التالية ؟**

أ) إذا كان للاقتران ق(س) قيمة صغرى محلية عند س= **جـ** فإن **ق`(جـ)** = ٠

ب) إذا كان ق(س) اقتران كثير حدود من الدرجة الثانية وكان **ق(أ)=ق(−أ)** ، فإنه يوجد جـ على الأقل ، جـ ∈ ]−أ، أ[ ، بحيث **ق`(جـ)** = ٠

ج) إذا كان ق(س) اقتراناً متصلاً على [١،٥] ، **ق`(س)** > ٠ ، ∀ س ∈ ]١،٥[ فإن للاقتران ق(س) قيمة عظمى محلية عند س= ٥ .

د) إذا كان $س_{١}$ ، $س_{٢}$ ∈ [ أ، ب] ، **ق`($س_{١}$)− ق`($س_{٢}$)** > ٠ ∀ $س_{١}$ > $س_{٢}$ ، فإن منحنى ق(س) متزايد في [ أ، ب] .

١١) إذا كان ق(س) اقتراناً معرفاً على [−١،١] ، **وكان ق(١) =٢ ،** $\lim_{س \to ١^{-}}$ **ق(س) =١ ،فإنه يوجد عند س=١**

أ) قيمة صغرى محلية ب) قيمة صغرى مطلقة

ج) قيمة عظمى محلية د) **ق`(١)=٠**

١٢) **إذا كان ق(س)= س٢ ،** هـ**(س)=** $\frac{ب}{٢س + ١}$ **، وكان** $(ق` \circ هـ)`(١) = \frac{٨}{٩}$ **، فأن قيمة الثابت ب تساوي**

أ) −٢ ب) ٢ ج) −٤ د) ٤

١٣) **إذا كان المستقيم: ص+٣س +٢=٠ مماساً لمنحنى الاقتران ق(س) عند نقطة الانعطاف (−١،١) فإن ظل زاوية الانعطاف عند النقطة (−١،١) يساوي**

أ) −١ ب) ١ ج) صفر د) −٣

١٤) **إذا كان ق(س) =** $لـو_{هـ}(ظتاس + قتاس) - ٢$ ، $٠ < س < \frac{\pi}{٢}$ **، فأي مما يلي يمثل جاس × ق`(س)**

أ) −١ ب) ١ ج) − قتاس د) − ظاس

١٥) **إذا كان (س − ص)٤ + (ص − س)٤ = ٣٢ ، س ≠ ص ، فإن** $\frac{د ص}{د س}$ **=**

أ) ١ ب) ٤ ج) −١ د) −٤

١٦) **إذا كان ق(س) =** $\sqrt{٣٦ - س^{٢}}$ **حيث** $|س| \geq ٦$ **فإن ق(س) يكون متزايداً عندما**

أ) س ≤ ٠ ب) س ≤ ٦ ج) −٦ ≤ س ≤ ٠ د) ٠ ≤ س ≤ ٦

١٧) **القيمة العظمى المطلقة للاقتران ق(س)=** س$لـو_{هـ}$ س **حيث** س∈$[هـ^{-٢}، هـ]$ **تساوي**

أ) −٢$هـ^{-٢}$ ب) هـ ج) ٢هـ د) −$هـ^{-١}$



اقلب الصفحة

١٨) **إذا كان ق(س)** = $\sqrt{س^{٢}-٩}$ ، س ∈ [٣، ب] ، **وكانت قيمة جـ التي تعينها نظرية القيمة المتوسطة للاقتران ق(س) في الفترة** [٣، ب] **هي (٥)، فجد قيمة** ب؟

أ) $\frac{٩}{١٢٣}$ ب) $\frac{١٢٣}{٩}$ ج) $\frac{٢٥}{١٦}$ د) $\frac{٥}{٤}$

١٩) **إذا كانت** ص = هـ$^{س^{٣}-٤}$ **وكان** ٢ص$_{س}$ = م س$^{٢}$ ص ، س ≠ صـــفر **فإن قيمة** م **تساوي**

أ) ٦ ب) ٤ ج) ٣ د) ٢

٢٠) **إذا كان لمنحنى الاقتران ق(س)** = س$^{٣}$ + ٣س$^{٢}$ + أس **نقطة انعطاف أفقي فما قيمة** أ ؟

أ) -٣ ب) -١ ج) ١ د) ٣

---

## السؤال الثاني : (٢٠علامة)

أ) إذا كان ق(س) = س$^{٢}$(٣س -٣) +١ معرفاً على [-٢ ، ٦] ، فجد : **(١٠ علامات)**

١) مجالات تزايد وتناقص الاقتران ق(س)

٢) القيم القصوى المحلية والمطلقة للاقتران ق(س) (إن وجدت)

ب) جد معادلة العمودي على المماس لمنحنى العلاقة : س$^{٢}$ - ٤س + ص$^{٢}$ =١ ، **(١٠ علامات)**
ص > . ، عند نقطة تقاطعه مع منحنى ص= س$^{٢}$ -٤س + ٥ .

---

## السؤال الثالث : (٢٠علامة)

أ) إذا كان ق(س)= $\begin{cases} أس^{٢}+٢س & ٠ \geq س < ٢ \\ س^{٣}-بس+١٢ & ٢ \geq س \geq ٣ \end{cases}$ **(١٠ علامات)**

يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في [٠ ، ٣] ، جد قيمة الثابتين أ ، ب ، ثم جد قيمة/قيم جـ التي تحددها النظرية .

أ) دائرة نصف قطرها ١٠سم ، رسم فيها شبه منحرف أب جـ د بحيث تقع رؤوسه على **(١٠ علامات)**
محيط الدائرة وتنطبق قاعدته الكبرى ب جـ على قطر الدائرة ، جد أكبر مساحة ممكنة لشبه المنحرف .



اقلب الصفحة

## السؤال الرابع : (٢٠علامة)

أ) إذا كان ق(س) = ٣جاس جتاس ، س ∈ ]٠ ، π [ ، فجد : **(١٠ علامات)**

١) فترات التقعر لأعلى ولأسفل للاقتران ق(س) . ٢) نقاط الانعطاف وزوايا الانعطاف (إن وجدت) .

ب) الشكل المجاور يمثل منحنى ق ً(س). إذا علمت أن : **(١٠ علامات)**




النقاط الحرجة للاقتران ق(س) هي عند س= -١، ٦ فأوجد:

١) فترات التقعر للأعلى وللأسفل للاقتران ق(س) .

٢) نقط القيم القصوى المحلية للاقتران ق(س) .

٣) نقطة / نقط الانعطاف للاقتران ق(س) .

القسم الثاني: يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى المشترك أن يجيب عن أحدهما فقط.

## السؤال الخامس : (١٠علامات)

أ) الشكل المجاور يمثل منحنى ق(س) ، م(س) في الفترة [٢ ، ٦ ] ، **(٥ علامات)**

بحيث ك ً(س) = هـ$^{ق(س)\cdot م ً(س)}$ ، بين أن الاقتران ك(س) مقعراً لأعلى في ]٢ ، ٦[.




ب) إذا كانت ص = أجتا(لـــو$_{هـ}$ س) + بجا(لـــو$_{هـ}$ س)، أثبت أن س$^{٢}$ $\frac{د^{٢}ص}{دس^{٢}}$ + س $\frac{دص}{دس}$ + ص = ٠ **(٥ علامات)**

---

## السؤال السادس : (١٠علامات)

أ) قُذِف جسم رأسياً إلى أعلى من نقطة على سطح الأرض بحيث أن بعده عن سطح الأرض **(٥ علامات)**

يعطى بالعلاقة ف(ن)= ٢٠ن - ٥ن$^{٢}$ حيث ف : ارتفاع الجسم بالأمتار ، ن : الزمن بالثواني ، جد :

١) أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم .

٢) سرعة الجسم عندما يكون قد قطع مسافة ٢٥م .

ب) إذا كان ص + س ص = جتاس ، اثبت أن : ص ً + ص = $\frac{-٢ص ً}{س+١}$ **(٥ علامات)**

**انتهت الأسئلة**

**القسم الأول : يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة ، أجب عنها جميعا.**

**السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة :** **( ٢٠ علامة )**

١) إذا كان متوسط تغير $ن(س) = |س + ٢| - ب$ في $[جـ، ٢]$ يساوي ٤ فإن $جـ$ =

أ) $\frac{٢}{٥}$ ب) ٢ ج) ٤ د) ١

٢) إذا كان $ن(س)$ معرفا في $[-١، ١]$ ، و كان $ن(١) = ٢$ ، $\lim_{س \to ١^-} ن(س) = ١$ فما العبارة الصحيحة :

أ) $ن(١)$ قيمة صغرى محلية ب) $ن(١)$ قيمة صغرى مطلقة

ج) $ن(١)$ قيمة عظمى محلية د) $ن'(١)$ = صفر

٣) تحرك جسم حسب العلاقة $ف = \sqrt{ع}$ إذا كان التسارع يساوي ٨ م/ث فإن قيمة ف الموجبة :

أ) $\frac{١}{١٦}$ ب) $\frac{١}{٨}$ ج) $\frac{١}{٤}$ د) $\frac{١}{٢}$

٤) إذا كان $ن(س) = ١$ معرف على $[٤، ٠]$ ، فإن قيم $جـ$ التي نحصل عليها من تطبيق رول هي :

أ) $\{\}$ ب) ٢ ج) $]٤، ٠[$ د) $[٤، ٠]$

٥) إذا كان $ن(س) = ٢س^٢ + بس$ ، $(ن \circ ن)'(١) = ٢٤$ ، فما قيمة الثابت $ب$ ؟

أ) ٢ ب) $-٢$ ج) $-٤$ د) ٤

٦) إذا كان $ن(س) = [س + ٧] - [س] + |٢س|$ ، $س \in ]-١، ٥[$ ، فإن $ن'(-٣)$ =

أ) ٢ ب) $-٢$ ج) ١٣ د) غير موجودة

٧) إذا كان $ن(س) = جتاس - جاس$ ، $س \in [\pi، ٠]$ ، فما قيمة $س$ التي يكون عندها قيمة صغرى مطلقة للاقتران $ن(س)$؟

أ) ٠ ب) $\frac{\pi}{٤}$ ج) $\frac{\pi}{٢}$ د) $\frac{\pi ٣}{٤}$

٨) إذا كان $ن(س)$ كثير حدود من الدرجة الثالثة له قيمة صغرى محلية عند $س_١$ وقيمة عظمى محلية عند $س_٢$ ، $س_١ < س_٢$ فإن $ق'(س)$ يكون على ح

أ) مقعرا لأسفل ب) مقعرا لأعلى ج) متناقصا د) متزايدا

٩) إذا كان $ق(س) = لـو_هـ (س^٢ + ١)^٢ + هـ^{جاس}$ ، فما قيمة $ق(٠) \times ق'(٠)$

أ) صفر ب) ١ ج) هـ د) ١ + هـ

١٠) إذا كان المستقيم $ص + ٣س + ٢ = ٠$ ، مماسا لمنحنى $ن(س)$ عند نقطة الانعطاف $(-١، ١)$ فما ظل زاوية الانعطاف عند هذه النقطة :

أ) $-٣$ ب) $-١$ ج) صفر د) ١

**السؤال الثاني ( ٢٠ علامة ) :**

أ) جد $\lim_{س \to ١} \frac{س لـو_{٢} س - س + ١}{(س - ١) لـو_{٢} س}$ .

ب)جد معادلة العمودي على المماس لمنحنى العلاقة $(س + ٢ص)^{٣} - ٤س + ٦ص = ٤٣$ عند نقطة تقاطع منحناها مع المستقيم $٦ص = ٩ - ٣س$ .

**السؤال الثالث ( ٢٠ علامة ) :**

أ) قذف جسم رأسيا لأعلى من قمة برج ارتفاعه ١٢٠ م حسب العلاقة $ف = ٤٠ن - ٥ن^{٢}$ ، حيث ف ارتفاع الجسم عن سطح البرج (بالأمتار ) في اللحظة ن ( بالثواني ).

١) جد المسافة الكلية المقطوعة بعد ٧ ث من بدء الحركة .

٢) جد سرعة الجسم عندما يكون على ارتفاع ٢٠ م عن سطح الأرض.

ب)الشكل المقابل يمثل منحنى $ن(س)$ في $\left[\frac{٣\pi}{٢}، ٢\pi\right]$ ، أثبت أن $هـ(س)$ مقعر لأعلى في تلك الفترة علما بأن $هـ`(س) = ن`(س) جتاس$ .




**السؤال الرابع ( ٢٠ علامة ) :**

أ) إذا كان $ن(س) = \begin{cases} ا س^{٢} - ٢س - ٢ & ، -١ \geq س > ١ \\ س^{٢} + بس - ٤ & ، ١ \geq س \geq ٣ \end{cases}$ يحقق نظرية المتوسطة في $[-١، ٣]$

جد قيمتي الثابتين ا،ب ثم قيمة / قيم جـ التي تعينها النظرية.

ب) إذا كان $ص = \left(\frac{١}{٢} ظا س جا ٢س\right)^{٣}$ ، فأثبت أن : $\frac{ء ص}{ء س} = ٣جا^{٤} س جا ٢س$

**القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين و على المشترك أن يجيب عن أحدهما فقط .**

**السؤال الخامس ( ٢٠ علامة ):**

أ) مستطيل محيطه ٢٤ سم ، ثني ليكون اسطوانة . أوجد أكبر حجم لهذه الاسطوانة .

ب)إذا كان $ن(س)$ كثير حدود متصل على ح وكان $ن`(٣) = ن`(١) = ٠$ ، وكان $ن`(س)$ متناقص على $]-∞، -٢]$،$[٢، ∞[$ ، $هـ`(س)$ متزايدا على $[-٢، ٢]$ ، جد للاقتران ق ( س) :

١) فترات التزايد والتناقص والقيم القصوى المحلية ٢) فترات التقعر ونقط الانعطاف

**السؤال السادس ( ٢٠ علامة ) :**

أ) ا ب جـ د مستطيل عرضه ا ب = ٨ سم و طوله ب جـ = ١٠ سم ، م نقطة على الضلع ا ب ، بحيث أن ا م = س ، ن نقطة على الضلع ب جـ بحيث ب ن = $\frac{٣}{٢}$ س ، جد قيمة س بحيث يكون مجموع مساحتي الشكل أ م جـ د والمثلث م ب ن أصغر ما يمكن .

ب) $ص = هـ^{٣}(س) - هـ(س^{٣})$ ، جد $\frac{ء ص}{ء س}$ عند س = ٢ حيث $ن(٢) = ١، ن`(٢) = -٢، ن`(٨) = ٢$

انتهت الأسئلة

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم -طولكرم
المبحث : الرياضيات /الورقة الأولى

الامتحان التجريبي
الثاني العلمي

مدة الامتحان : ساعتان ونصف
التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٢٧
مجموع العلامات (١٠٠)علامة

**ملاحظة: عدد أسئلة الورقة (ستة) أسئلة، أجب عن (خمسة) منها فقط**

**القسم الأول: يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة ، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعا**

**السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة ، ثم ضع إشارة ( ✗ )في المكان المخصص في دفتر الاجابة : (٣٠علامة)**

١) جد $\lim_{س \to ١} \frac{هـ^{س-١} - س}{لـو_{هـ} س}$ ، حيث هـ العدد النيبيري ؟

أ) ١ ب) صفر ج) - ١ د) هـ

٢) إذا كان متوسط التغير في الاقتران ق(س) في $[١ ، ٣]$ يساوي (٤) ، وكان ك(س) $= س^{٢} + ٣ق(س)$ ، جد مقدار التغير في الاقتران ك(س) على نفس الفترة ؟

أ) ١٦ ب) ٣٢ ج) ٤ د) ٢٠

٣) اذا كان $\begin{bmatrix} س^{٢}-١ & -٣ \\ ٢ & ٤ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٨ & ص+٥ \\ ٢ & س+١ \end{bmatrix}$ ، فإن قيم س ، ص على الترتيب هي :

أ) ٣ ، -٨ ب) -٨ ، ٣ ج) -٣ ، -٨ د) ± ٣ ، - ٨

٤) أحد الاقترانات التالية قابل للاشتقاق على مجاله :-

أ) $ق(س) = س^{\frac{٣}{٤}}$ ب) $ق(س) = [س + ٣]$ ج) $ق(س) = |س|$ د) $ق(س) = \frac{س}{س+٢}$

٥) اذا كان $ق(س) = \frac{١}{ج} س^{٥}$ ، $ق'''(س) = ٥س^{٢}$ جد قيمة الثابت ج ؟

أ) ٢٠ ب) ٥ ج) ١٢ د) ٦٠

٦) إذا كان $ق(س) = س^{٢} + \frac{١}{٢} هـ(س)$ ، وكان ميل العمودي على المماس لمنحنى الاقتران ق(س) عند $س = ٢$ يساوي $\left(-\frac{١}{٥}\right)$، جد قيمة $\frac{١}{٢} ق'(٢) - هـ'(٢)$؟

أ) $\frac{٥}{٢}$ ب) ٢ ج) ٤ د) $\frac{١}{٢}$

٧) اذا كان $ق(س) = س^{٢} - ٣س - ب$ يحقق شروط نظرية رول على الفترة $[-٢ ، ب]$، جد قيمة الثابت ب :

أ) ١ ب) ٢ ج) ٤ د) ٥

٨) اذا كان $ج = \begin{bmatrix} ٣ & ٠ \\ ٢ & ١ \end{bmatrix}$ ، $أ = \begin{bmatrix} ٥ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{bmatrix} + ب$ جد ب ج $-$ أ ج؟

أ) $\begin{bmatrix} ١٦ & ٥ \\ ١٨ & ٣ \end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix} ١٢ & ٩ \\ ١٠ & ١١ \end{bmatrix}$ ج) $\begin{bmatrix} -٥ & -١٦ \\ -٣ & -١٨ \end{bmatrix}$ د) $\begin{bmatrix} -١٢ & -٩ \\ -١٠ & -١١ \end{bmatrix}$

لاحظ الصفحة التالية
يتبع صفحة (٢)

٩) اذا كان س = ظا ص ، ص ∈ $\left[0 ، \frac{\pi}{٢}\right[$ ، جد $س^{٢}$ ص/ ؟

أ) $جا^{٢}$س ب) $جا^{٢}$ص ج) $جتا^{٢}$س د) $جتا^{٢}$ص

١٠) اذا كان ق(٣) = ٥ ، ق/(٣) = ٤ فجد $\lim_{س \to ٣} \frac{٣ق(س) - س ق(٣)}{س - ٣}$

أ) ٧ ب) ١١ ج) ٨ د) ١٢

١١) عدد النقاط الحرجة للاقتران ق(س) = $\sqrt[٣]{س^{٣} - ١٢ س}$ ، س ∈ [−١ ، ٣] هي :

أ) ٢ ب) ٣ ج) ٤ د) ٥

١٢) اذا كان ق(س) = $\begin{cases} ٣س + ب & ، -٢ \geq س \geq ١ \\ ٣س^{٢} + ب س & ، ١ < س \leq ٦ \end{cases}$ وكان ق/(١) موجودة جد قيمة الثابت ب؟

أ) ٣ ب) − ١ ج) - ٣ د) صفر

١٣) اذا كان ق(س$^{٣}$ − ١) = (س$^{٢}$ + ٢)$^{٣}$ ، جد ق/(٧) ؟

أ) ٣٢ ب) ٣٦ ج) ٥٠ د) ٢٥

١٤) اذا كان أ = $\begin{bmatrix} ٣ & -٥ \\ ٢ & ٤ \end{bmatrix}$ ، ب = $\begin{bmatrix} -٣ & ٥ \\ ١ & -٦ \end{bmatrix}$ ، جد قيمة المصفوفة ٢٢أ + ٢٧ب − ٥(أ + ٢ب)؟

ب) $\begin{bmatrix} ٠ & ٠ \\ -٢ & ٣ \end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix} ٠ & ٠ \\ ١٧ & ١٧ \end{bmatrix}$ ج) $\begin{bmatrix} ٠ & ٠ \\ -٣٤ & ٥١ \end{bmatrix}$ د) $\begin{bmatrix} ٠ & ٠ \\ ٣٤ & ٥١ \end{bmatrix}$

١٥) اذا كان $\begin{vmatrix} ٢أ & ٢جـ \\ ٤ب & ٤د \end{vmatrix}$ = − ٨ ، اوجد $\begin{vmatrix} \frac{٣}{٢}جـ & \frac{٣}{٢}د \\ ٢أ & ٢ب \end{vmatrix}$

أ) -٣ ب) -١ ج) ١ د) ٣

١٦) اذا كانت زاوية الانعطاف للاقتران ق(س) = $س^{٣} + ٣س^{٢} + أس$ هي $\frac{٣\pi}{٤}$ ، جد قيمة الثابت أ ؟

أ) - ١ ب) ٢ ج) - ٢ د) ٣

١٧) اذا كان (ق ∘ هـ)/(٢) = ٢٧ ، ق(س) = $س^{٢} - ٥س$ ، هـ/(٢) = ٣ فما قيمة هـ(٢)؟

أ) ٢١ ب) ١٦ ج) ٩ د) ٧

١٨) اذا كان ق(س) كثير حدود له قيمة عظمى محلية عند النقطة (١ ، ٤) ، وكان هـ(س) = (١ − ق(س))$^{٣}$ ، احدى العبارات التالية صحيحة ؟

أ) هـ//(١) < ٠ ب) هـ//(١) > ٠ ج) هـ//(١) = ٠ د) هـ//(١) غير موجودة

١٩) اكبر قيمة للاقتران ق(س) = هـ$^{جاس}$ − جاس ، س ∈ [٠ ، $\pi$] هي

أ) ١ ب) ٢ ج) هـ − ١ د) هـ

٢٠) الشكل المجاور يمثل منحنى ق/(س) للاقتران كثير الحدود ق(س)




فان النقطة (٢ ، ق(٢)) هي

أ) نقطة قيمة قصوى ونقطة انعطاف ب) نقطة حرجة ونقطة انعطاف

ج) نقطة انعطاف وليست نقطة حرجة د) ليست نقطة انعطاف

**السؤال الثاني : (٢٠ علامة )**

أ) ابحث في تحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة للاقتران $ق(س) = \begin{cases} ٣س^{٢} - ٢س - ٢ ، -١ \geq س > ١ \\ س^{٢} + ٢س - ٤ ، ١ \geq س \geq ٣ \end{cases}$

على $[-١ ، ٣]$ ، ثم جد قيمة/قيم جـ التي تعينها النظرية ان وجدت ؟ ( ٧علامات )

ب) اذا كان $ق(س) = \frac{س^{٢} - ٢}{س + ١} ، س \neq -١$ ، جد معادلة المماس المرسوم لمنحنى الاقتران $ق(س)$ والذي يوازي المستقيم المار بالنقطتين $(٣ ، ٦) ، (١ ، ٢)$ ؟ ( ٧علامات )

ج) حل المعادلة المصفوفية $-٣ \begin{pmatrix} س \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ٤ & -١ \end{bmatrix} \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} ١ & ١ \\ ٠ & ١ \end{bmatrix} = س$ ( ٦علامات )

---

**السؤال الثالث : (٢٠ علامة)**

أ) اذا كان $ق(س) = ٢ + جتا^{٢} س - جتا ٢س ، س \in [٠ ، \pi]$ ، جد ما يلي :- (١٢ علامات)

١)عين مجالات التزايد والتناقص للاقتران $ق(س)$ ٢)جد القيم العظمى والصغرى المحلية للاقتران $ق(س)$ ( ان وجدت)

٣)مجالات التقعر للأعلى وللأسفل للاقتران $ق(س)$ على الفترة $[٠ ، \pi]$

ب) ١) جد قيم س ، ص التي تجعل $[س \quad ص] \cdot \begin{bmatrix} ٠ & ٣ \\ -٢ & ٠ \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} ٣ & -١ & ١ \\ ٤ & ٠ & ٢ \end{bmatrix} = [٤ \quad -٣ \quad ١١]$ ( ٨ علامات)

٢)اذا كان $أ = \begin{bmatrix} ٢ & ك \\ ٥ & ١+ك \end{bmatrix} ، ب = \begin{bmatrix} -ك & ٢ \\ -١ & -٢ك \end{bmatrix}$ ، جد قيمة ك التي تجعل $|أ + ب| = ٠$

---

**السؤال الرابع : ( ٢٠ علامة)**

أ) قذف جسم رأسيا لأعلى من قمة برج ارتفاعه (٤٠) متر بحيث أن ارتفاعه عن البرج بالأمتار بعد ن ثانية يعطى بالعلاقة

$ف(ن) = ٤٠ ن - ٥ ن^{٢}$ ، احسب :

١)اقصى ارتفاع يصله الجسم عن سطح الارض؟

٢) سرعة الجسم عندما يكون على ارتفاع (١٠٠) متر من سطح الأرض ؟ ( ٨ علامات)

ب) اذا كان $ل = ص^{٢} + ٤ص - ٥ ، ص + س ص = ٦$ ، جد $\frac{د ل}{د س}\Big|_{ص=٢}$ ؟ ( ٥علامات )

ج) اذا كان $ق(س) = ٢س^{٣} - ٩أ س^{٢} + ١٢ أ^{٢} س + ١ ، أ > ٠$ له قيمة عظمى محلية عند $س = ٢$ ، وله قيمة صغرى محلية عند $س = ن$ ، بحيث $٢^{٢} = ن$ ، جد الثابت أ ؟ ( ٧علامات)

---

**القسم الثاني: يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى المشترك أن يجيب عن أحدهما فقط**

**السؤال الخامس: ( ١٠ علامات)**

أ)اذا كان $ص^{٢} = \frac{س}{س+١}$ ، اثبت أن $ص' = \frac{ص^{٣}}{٢س^{٢}}$ ( ٤ علامات)

ب) دائرة قطرها $\overline{أب}$ طوله يساوي (٤) سم ، بدأت النقطة (جـ) الحركة على القوس $\overset{\frown}{أب}$ ، من $أ$ باتجاه ب ، جد قياس الزاوية $أ ب جـ$ التي تجعل مساحة المثلث $أ ب جـ$ أكبر ما يمكن ؟ ( ٦ علامات)

---

**السؤال السادس : (١٠علامات)**

أ)باستخدام خصائص المحددات اثبت أن $\begin{vmatrix} ١ & ١ & ١ \\ س & ص & -س \\ -س ص & -س^{٢} & س ص \end{vmatrix} = ٢س(ص^{٢} - س^{٢})$ ( ٥علامات)

ب)الشكل المجاور يمثل منحنى $ق(س)$ على الفترة $\left]\frac{٣\pi}{٢}, \pi\right[$




جد فترات التزايد والتناقص لمنحنى الاقتران $هـ(س) = \frac{س ظاس}{ق(س)}$

على الفترة $\left]\frac{٣\pi}{٢}, \pi\right[$

(٥ علامات)

---

**انتهت الأسئلة**

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بيرزيت
الامتحان الموحد

# امتحان نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2021-2022 م

**المبحث : الرياضيات**
**الورقة : -**
الفرع : العلمي
الزمن : ساعتان ونصف
**مجموع العلامات ( 100 ) علامة**
**التاريخ : 27 / 12 / 2021 م**

**ملاحظة : عدد أسئلة الورقة ( ستة ) أسئلة ، أجب عن ( خمسة ) أسئلة منها فقط**

**القسم الأول : يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة ، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعها**

**السؤال الأول : انقل رمز الإجابة الصحيحة إلى دفتر الإجابة ( 20 علامة )**

(1) ما قيمة / قيم جـ التي تحددها نظرية رول على الاقتران $ن(س)=جا^{٢}س+\frac{١}{٢}جتا٢س$ في $[٠ ، \pi]$

أ) $\{\frac{\pi}{٦}\}$ ب) $[٠ ، \frac{\pi}{٦}]$ ج) $]٠ ، \frac{\pi}{٦}[$ د) $[٠ ، \frac{\pi}{٦}[$

( 2 ) اذا كان متوسط تغير الاقتران $ن(س)=٣س^{٢}-٢س$ في $[ب ، ٢ب]$ يساوي ١٦ حيث $ب>٠$ فان قيمة الثابت ب هي

أ) ٢ ب) $\frac{١٤}{٩}$ ج) $\frac{٢٢}{٩}$ د) ١

(3) $\lim_{هـ\to٠}\frac{قا^{٢}(٥س+٣هـ)-قا^{٢}(٥س)}{هـ}=$

أ) $٦قا^{٢}٥س ظا٥س$ ب) $١٠قا^{٢}٥س ظا٥س$ ج) $٦قا٥س ظا٥س$ د) $٦قا^{٢}٣هـ ظا٢هـ$

(4) إذا كان $ن(س)=(س^{٢}+٢)هـ(س)$ وكان المماس لمنحنى $هـ(س)$ عند النقطة $(١ ، -٢)$ عموديا على المستقيم الذي معادلته $٤ص+٢س=١$ فما قيمة $ن'(١)$

أ) $-٢$ ب) ١٠ ج) ٢ د) $-٥$

(5) إذا كان $ن(س)=\begin{cases} س^{٢} & ١ \geq س > ٢ \\ ٤س & ٢ \geq س \geq ٣ \end{cases}$ فما عدد النقاط الحرجة

أ) ١ ب) ٢ ج) ٣ د) ٤

6) **اذا كانت أ،ب مصفوفتين مربعتين غير منفردتين بحيث إن : $|أ ب|=١٨ ، |أ|+|ب|=١١$ و كان $|أ| \leq |ب|$ فما قيمة $|أ|$**

**أ) ٢ ب) ٦ ج) ٧ د) ٩**

7) اذا كان $ن(س)=أجا٢س$ وكان $(ن \circ ن')'(\frac{\pi}{٤})=-٣٢$ فما قيمة / قيم الثابت أ

أ) ٢ ب) $-٢ ، ٢$ ج) ٤ د) $-٤$

8) اذا كان $ن(س)=لـو_{هـ}(س-س^{٢})$ فما الفترة التي يكون فيها $ن(س)$ متزايدا على مجاله

أ) $[٠ ، \frac{١}{٢}[$ ب) $]٠ ، \frac{١}{٢}[$ ج) $]١ ، \frac{١}{٢}[$ د) $]١ ، \frac{١}{٢}[$

9) اذا كانت $\begin{bmatrix} ٢س & ١٤ \\ ٦ & -٣ص \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -٢ & ع^{٢} \\ ٤ & -٣ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} ٣- & ٣ \\ ٢ & ٢ \end{bmatrix}$ فما قيمة $س + ص$

أ) ٦ ب) ١ ج) ٧ د) ٠

10) **اذا كانت** $ص^{٣} = ن(٢س^{٢} - س)$، $ن'(٦) = ٤$، $ن(٦) = -٨$ **فان** $\frac{د ص}{د س}$ **عندما** $س = ٢$ **هي**

أ) $\frac{٣}{٧}$ ب) $\frac{٧}{٣}$ ج) $\frac{٧}{١٢}$ د) $\frac{١٢}{٧}$

---

**السؤال الثاني : ( 20 علامة )**

**( أ) اذا كان الاقتران** $ن(س) = \begin{cases} ٣ - أس^{٢} & ، -١ \le س < ١ \\ س^{٢} + ب س + ٥ & ، ١ \le س \le ٢ \end{cases}$ **يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على**

**الفترة** $[-١، ٢]$ **فجد الثابتين** $أ، ب$ **ثم جد قيمة / قيم** $جـ$ **التي تحصل عليها من تطبيق النظرية ( 10علامات )**

**( ب )إذا كانت** $أ = \begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ ٢ & ١ \end{bmatrix}$، $ب = \begin{bmatrix} ٠ & ١ \\ ١ & ٠ \end{bmatrix}$ **حل المعادلة المصفوفية** $(٢س أ)^{-١} = ب$ **( 10 علامات )**

**السؤال الثالث : (25 علامة )**

( أ ) إذا كان $ن(س) = ٢س^{٣} - ٦س^{٢} - ١٨س + ١$ ، $س \in ع$ اوجد **( 10 علامات)**

1 ) مجالات التزايد والتناقص للاقتران $ن(س)$

2 )القيم القصوى المحلية للاقتران $ن(س)$

( ب ) اذا كان $ن(س) = س - ظاس$ ، $س \in \left]-\frac{\pi}{٢}، \frac{\pi}{٢}\right[$ أوجد **( 7 علامات)**

1 ) فترات التقعر للاعلى وللاسفل للاقتران $ن(س)$

2 ) نقط وزوايا الانعطاف للاقتران $ن(س)$ ان وجدت

( ب ) **مقلمة على شكل اسطوانة دائرية قائمة مفتوحة من أعلى سعتها** $١٩٢\pi$ **سم$^{3}$ فإذا علمت أن سعر كل ١ سم$^{2}$ من البلاستيك المستخدم في صنع القاعدة يساوي ثلاثة أمثال سعر ١سم$^{2}$ من البلاستيك المستخدم في صنع الجوانب. جد أبعاد المقلمة ذات الاقل تكلفة .** **( 8 علامات )**

**السؤال الرابع : (25 علامة )**

( أ ) استخدم طريقة جاوس في حل النظام الاتي : (9 علامات)

$$\begin{cases} ٣س - ٧ص - ٥ع = ١١ \\ ٤ص + ٢ع + ٢ = ٠ \\ ٧ + ع - ٢س = ٠ \end{cases}$$

(ب ) يتحرك جسم حسب المعادلة $ع^{٢} = \frac{٢}{أ ف} + ع$ اوجد تسارع الجسم عندما تكون سرعته ٢ م / ث **( 8 علامات )**

**( ج ) اذا كان ق(س) اقتران متصل على ح حيث ق′(س) = هـ′(س) × ل(س) بالاعتماد على الشكل المجاور**

**اثبت ان منحنى ق(س) مقعر للاسفل في ]∞،١[** **( 8 علامات )**




**القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين ، وعلى المشترك أن يجيب عن أحدهما فقط**

**السؤال الخامس : ( 10علامات )**

أ ) قذف جسم رأسيا لأعلى من سطح الارض حسب العلاقة ف(ن) = ٢٠ن − ٥ن$^{٢}$ فاذا علمت انه فقد ربع السرعه التي قذف بها وهو على ارتفاع ٣٥م عن سطح الارض اوجد اقصى ارتفاع يصل اليه الجسم ( 5 علامات )

**ب ) بدون فك المحدد اثبت ان** $\begin{vmatrix} أ & -ب & -جـ \\ ب & ١ & ٠ \\ جـ^{٢} & ٠ & ١ \end{vmatrix} = أ + ب^{٢} + جـ^{٣}$ **( 5 علامات )**

**السؤال السادس : ( 10علامات )**

أ ) اذا كان المستقيم ٤ص + س = ٣ يمس منحنى الاقتران ق(س) = $\frac{٢}{س^{٢} + جـ}$ ، س > ٠،جـ > ٠ **عند نقطة الانعطاف** $(س_{١}، ص_{١})$ **لمنحنى الاقتران ق(س) اوجد قيمة جـ** **(5 علامات)** .

ب ) اذا كان س = $\sqrt{١ + جتاص}$ . أثبت أن $\frac{ع ص}{ع س} = \frac{-٢}{\sqrt{٢ - س^{٢}}}$ ( 5 علامات )

********** انتهت الأسئلة **********

| | | |
|---|---|---|
| دولة فلسطين | | مدة الامتحان : ساعتان و نصف |
| وزارة التربية و التعليم | | التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١٩م |
| مديرية التربية و التعليم ضواحي القدس | | مجموع العلامات : (١٠٠) علامة |
| نهاية الفترة الاولى و الثانية | | المبحث : رياضيات |

**الامتحان الموحد للثاني عشر العلمي**

**ملاحظة: عدد أسئلة الورقة (ستة ) أسئلة ، أجب عن (خمسة) منها فقط.**

القسم الأول : يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة وعلى المشترك ان يجيب عن جميع الأسئلة.

**السؤال الاول: اختر رمز الاجابة الصحيحة ثم انقل الرمز الى ورقة الاجابة . ( ٢٠ علامة)**

١) اذا كان متوسط تغير الاقتران ق(س) في الفترة $[٩،١]$ يساوي ٥ فما متوسط تغير الاقتران $ل(س) = س^{٢} هـ(٢س + ٥)$ في الفترة $[-٢،٢]$ ؟

أ) ١٠ ب) $-١٠$ ج) ٤٠ د) $-٤٠$

٢) اذا كان $ص = لـو_{هـ}(س^{٢})$ ، $س > ٠$ فما قيمة $ص هـ^{ص}$ ؟

أ) $-٢$ ب) ٢ ج) $-١$ د) ١

٣) اذا كان $هـ(س) = [س] \times |س|$ فما قيمة $هـ'\left(-\frac{٥}{٢}\right)$ ؟

أ) $-٣$ ب) ٣ ج) صفر د) غير موجودة

٤) اذا كان الاقتران ق(س) اقتران متصل على الفترة $[٥،١]$، و له ثلاث نقاط حرجة على مجاله، فإذا علمت أن $هـ'(٢) = ٠$، $هـ'(٣) > ٠$ و كان $هـ'(٢) \times هـ'(٣) < ٠$ ، فأي العبارات الأتية صحيحة دائماً للاقتران ق؟

أ) $(٣، هـ(٣))$ نقطة حرجة للاقتران ق(س) ب) $(٢، هـ(٢))$ نقطة انعطاف.

ج) $(٢، هـ(٢))$ نقطة قيمة عظمى . د) $(٢، هـ(٢))$ نقطة قيمة صغرى.

٥) **ما قيم ا ، ب على الترتيب التي تجعل** $\lim_{س \to ٢} \frac{ا - جتا٢\pi س}{س^{٢} - ٢س} = ب$ ؟

أ) صفر ، ١ ب) ١، صفر ج) $١، \frac{١}{٢}$ د) $١، \frac{١}{٢}$

٦) اذا كانت س مصفوفة مربعة من الرتبة ٢ ، و كان $س^{٢} = س$، $ص = م_{٢} - س$ فما قيمة $ص^{٢}$ ؟

أ) **س** ب) $م_{٢} - ص$ ج) **س ص** د) **ص**

٧) اذا كانت $\frac{١}{٢}(ا - ب) = \begin{bmatrix} ٢ & ٢ \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$ فما قيمة $(٣ا - ٣)(ب + م_{٢} + ١٤ا) + ٢ب)$ ؟

أ) $\begin{bmatrix} ١ & -١ \\ ٢ & -١ \end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix} ٤ & ١ \\ ٢ & -٣ \end{bmatrix}$ ج) $\begin{bmatrix} ٣ & ٤ \\ -١ & ٢ \end{bmatrix}$ د) $\begin{bmatrix} -١ & -٤ \\ ٣ & -٢ \end{bmatrix}$



لاحظ الصفحة التالية

٨) **اذا علمت أن** $أ = \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ٣ & -١ \\ ١ & ٧ \end{bmatrix}$ ، $ب = \begin{bmatrix} ١ & ٢ & ٣ \\ ١ & ٠ & ٢ \end{bmatrix}$ **و كانت** $جـ = أب$ **، فما قيمة** $جـ_{٣٢}$ ؟

أ) ٨ ب) ٤ ج) ١١ د) ٧

٩) ما ميل المماس عند $س = ١$ لمنحنى الاقتران $ق(س) = \begin{cases} ٣س^{٢} + ٢ & ، \ س < ١ \\ ٥ & ، \ س = ١ \\ ٦س - ١ & ، \ س > ١ \end{cases}$ ؟

أ) ٥ ب) ٦ ج) صفر د) غير موجود

١٠) يتحرك جسيم في خط مستقيم وفق العلاقة $ف(ن) \times ع(ن) = ن$ حيث ف، ع يمثلان المسافة و السرعة على الترتيب ، ن : الزمن بالثواني. فإذا كانت $ع(٢) = ٣$ م/ث فما هو تسارع الجسم بعد ثانيتين من بدء الحركة ؟

أ) $-٨$ م/ث$^{٢}$ ب) ٨ م/ث$^{٢}$ ج) ١٢ م/ث$^{٢}$ د) $-١٢$ م/ث$^{٢}$

## السؤال الثاني : (٢٠ علامة)

أ) اذا كان $ق(س) = \begin{cases} -س^{٢} + ٣س + أ & ، \ ٠ \leq س \leq ١ \\ بس + ٤ & ، \ ١ < س \leq ٤ \end{cases}$ (٨ علامات )

١) جد قيم $أ ، ب$ اللتان تجعلان ق(س) يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة على الفترة $[٢،٠]$ ؟

٢) قيمة \ قيم جـ التي تحددها النظرية ؟

ب) رُسم مماس وعمودي على المماس لمنحنى الاقتران ق ( س ) = س$^{٢}$ + ٢ عند النقطة ( ٢ ، ٦ ) الواقعة عليه ، فقطعا محور السينات في النقطتين أ ، ب . (٦ علامات )
أوجد مساحة المثلث المحصور بين المماس والعمودي على المماس ومحور السينات ؟

ج) قذف جسم راسيا لأعلى من قمة برج بحيث أن ارتفاعه عن البرج بالأقدام بعد ن ثانية يعطى بالعلاقة $ف(ن) = ٩٦ن - ١٦ن^{٢}$ . (٦ علامات

١- جد ارتفاع البرج علما بأن أقصى ارتفاع وصله الجسم عن سطح الأرض $= ٢٥٦$ قدم .

٢- جد سرعة ارتطام الكرة بالأرض.

لاحظ الصفحة التالية

## السؤال الثالث : (٢٠ علامة)

أ) اذا كانت $ص = (٢ع - ٥)^{٤}$ ، $ع = \sqrt{س^{٣} - ٢س + ١٢}$ جد $\frac{د ص}{د س}$ عندما $س = ٢$ ؟ (٦ علامات)

ب) اذا كان $ن(س) = \sqrt[٣]{س^{٢} + ٧}$ ، وكانت $هـ(٢) = ٢$ ، $هـ'(٢) = ١٢$ . جد (٦ علامات)

$$\lim_{س \to ١} \frac{(هـ \circ ن)^{٢}(س) - ٤}{س - ١}$$

ج) اذا كان $ن(س) = ٢ + جا^{٢}س$ ، $س \in \left[٠ ، \frac{\pi}{٢}\right]$ (٨ علامات)

١) جد فترات التقعر للاعلى و الاسفل للاقتران ق(س)؟

٢) جد نقاط الانعطاف ان وجدت؟

## السؤال الرابع : (٢٠ علامة)

أ) رُسم للاقتران $ن(س) = أ س^{٢} + بس + ٦$ مماساً عند النقطة $(٢ ، ن(٢))$ فقطع من محور الصادات ٤ وحدات موجبة ، فإذا كان قياس زاوية ميل المماس يساوي $\frac{\pi ٣}{٤}$ . جد قيمة الثابتين أ ، ب ؟ (٧ علامات)

ب) اذا كان $ن(س) = هـ^{جاس + جتاس}$ ، حيث $س \in \left[٠ ، \frac{\pi ٣}{٢}\right]$ : (٧ علامات)

١- جد مجالات التزايد والتناقص للاقتران ق(س)؟

٢- جد نقاط القيم القصوى المحلية و المطلقة منها ان وجدت؟

ج) اذا كان $ن(س) = \sqrt{س^{٢} - ٩}$ ، $س \in [٣ ، ب]$ و كان متوسط تغير الاقتران $ن(س)$ في $[٣ ، ب]$ مساوياً $ن'(٥)$ ، فما قيمة ب ؟ (٦ علامات)



لاحظ الصفحة التالية

القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين و على المشترك أن يجيب عن أحدهما فقط.

## السؤال الخامس : (٢٠ علامة)

أ) جد قيم الثوابت س ، ص ، ع التي تجعل المعادلة المصفوفية الأتية صحيحة؟ (٧ علامات)

$$\begin{bmatrix} ٢س & ١ \\ ع & ٣ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} ٠ & ١ \\ -ص & ٤ \end{bmatrix} ٣ = \begin{bmatrix} ٢ع & ١ \\ ١ & س \end{bmatrix} ٣ + \begin{bmatrix} ص & ١ \\ ٤ & س \end{bmatrix}$$

ب) اذا علمت أن $ن(س) = \begin{cases} هـ(س) & ، \ ٠ \leq س < ٢ \\ ٣س^{٢} - ٢ & ، \ ٢ \leq س \leq ٤ \end{cases}$ (٦ علامات)

و كان ق(س) يحقق نظرية القيمة المتوسطة في $[٠ ، ٤]$ ، وكان هـ(س) يحقق شروط نظرية رول في $[٠ ، ٢]$ ، أثبت أنه يوجد $جـ \in ]٠ ، ٤[$ بحيث $هـ'(جـ) = ٩$ ؟

ج) مثلث متساوي الساقين طول قاعدته ٦ سم ، وارتفاعه ٨ سم ، يراد اقتطاع مستطيل منه بحيث يقع رأسان منه على قاعدة المثلث ويقع كل من الرأسين الآخرين على ساقي المثلث . جد بعدي المستطيل لتكون مساحته أكبر مايمكن ؟ (٧ علامات)

## السؤال السادس : (٢٠ علامة)

أ) اذا علمت أن $ص^{٢} = ٤ + ٢ جا س جتا س$ أثبت أن $ص ص'' + (ص')^{٢} + ٢ ص^{٢} = ٨$ ؟ (٧ علامات)

ب) جد حجم أكبر مخروط دائري قائم يمكن وضعه داخل مخروط دائري قائم طول نصف قطر قاعدته ٦ سم وارتفاعه ١٢ سم ، بحيث ينطبق رأس المخروط الداخلي على مركز قاعدة المخروط الخارجي ؟ (٧ علامات)

ج) اذا كانت $(١ ، ٢)$ نقطة انعطاف أفقي لمنحنى الاقتران $ن(س) = س^{٤} - ٤س^{٣} + هـ(س)$ ، حيث $هـ(س)$ اقتران قابلاً للاشتقاق على ع ، و كان $ك(س) = هـ^{٢}(س)$ . جد قيمة $ك'(١)$ ؟ (٦ علامات)

انتهت الاسئلة

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم شمال الخليل
مدرسة بيت أولا الثانوية للبنين

الاسم:.....
المادة : رياضيات
الصف : الثاني عشر علمي
التاريخ : ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م

يتكون هذا الاختبار من قسمين : القسم الأول اجب عن جميع الأسئلة ، القسم الثاني أجب عن أحد السؤالين

## القسم الأول

**السؤال الأول :** **( ١٨ علامة)**

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي :

١) إذا كان المستقيم $ص + ٣س + ٢ = ٠$ مماساً لمنحنى $ه(س)$ عند نقطة الانعطاف ، فإن ظل زاوية الانعطاف عند تلك النقطة يساوي :

أ) صفر ب) ١ ج) ٣ د) $-٣$

٢) لتكن $أ = \begin{bmatrix} جا٢س & ١ \\ & \frac{١}{٢} \\ ١ & \end{bmatrix}$ ، $٠ \leq س \leq \pi$ ، فإن قيمة / قيم س التي تجعل المصفوفة ليس لها نظير ضربي هي :

أ) $\left\{\frac{\pi}{١٢} ، \frac{\pi ٥}{١٢}\right\}$ ب) $\left\{\frac{\pi}{٦} ، \frac{\pi ٥}{٦}\right\}$ ج) $\left\{\frac{\pi}{٦}\right\}$ د) $\left\{\frac{\pi}{١٢}\right\}$

٣) إذا كان $أ = \begin{bmatrix} ١ & س \\ ٤ & ص + ٤ \end{bmatrix}$ ، $أ^{-١} = \begin{bmatrix} ٢ & \frac{-١}{٢} \\ س - ٥ & ١ \end{bmatrix}$ ، فإن $س + ص =$

أ) ٤ ب) ٢ ج) $-٢$ د) $-٤$

٤) إذا كان $ه(س)$ ، $هـ(س)$ معرفين على ح ، وكان $ه(س)$ متزايد على ح ، $ه(س) \neq ٠$ بحيث أن $ه(س) \times هـ(س) = ٧$ ، فإن أحد العبارات التالية دائماً صحيحة :

أ) $هـ(س)$ متزايد على ح ب) $هـ(س)$ متناقص على ح

ج) $هـ(س)$ ثابت على ح د) $ه(س) > هـ(س)$ على ح

٥) إذا كانت $أجـ + بجـ = \begin{bmatrix} ٣ & -٢ \\ ١ & ٠ \end{bmatrix}$ ، $جـ = \begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ ١ & ٤ \end{bmatrix}$ ، فإن $|أ + ب| =$

أ) صفر ب) ١ ج) $-١$ د) ٩

٦) عند حل نظام من المعادلات الخطية باستخدام كريمر وجد أن

$أ \times أ_س = \begin{bmatrix} ٥ & ٠ \\ ٣- & ٢ \end{bmatrix}$ ، $أ_س \times أ_ص = \begin{bmatrix} ٢ & ٤ \\ ٠ & ١٠ \end{bmatrix}$ ، فإن قيمة ص =

أ) ٣ ب) ٢ ج) ١ د) $-١$

٧) إذا كانت $أ ، ب$ مصفوفتان مربعتان ثنائيتان ، وكانت $|أ| = ٤$ ، $|٢أ^{-١} ب| = -٤$ ، فإن $|-٣ب| =$

أ) ٣٦ ب) $-٣٦$ ج) ١٢ د ) $-١٢$

٨) مجموعة قيم س التي يكون للاقتران $\text{هـ}(س) = \sqrt{س^{٢} - ٥س}$ عندها نقاط حرجة هي :

أ) $\{٥،٠\}$ ب) $\left\{٥ ، \frac{٥}{٢}، ٠\right\}$ ج) $\{٠\}$ د) $\{٥\}$

٩) إذا كان $\text{هـ}'(س) = (س^{٢} - ١)^{٣} (س - ٢)^{٤}$ ، فإن الفترة التي يكون فيها $\text{هـ}(س)$ متناقص هي :

أ) $]-\infty ، -١]$ ب) $[-١، ١]$ ج) $[١، ٢]$ د) $[٢ ، \infty[$

---

**السؤال الثاني :** **( ١٢ علامة : ٧ + ٥)**

أ) ليكن $\text{هـ}(س) = س + \frac{١٦}{س}$ ، $س \neq ٠$ ، أوجد :

١) مجالات التزايد والتناقص لمنحنى $\text{هـ}(س)$

٢) النقاط الحرجة لمنحنى الاقتران $\text{هـ}(س)$

ب) حل المعادلة الآتية : $\begin{vmatrix} ٢ & ٣ & ٤ \\ س & -٢ & ١ \\ -١ & ٤ & س+٢ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -٥ & ٣ \\ ٤ & س+٣ \end{vmatrix}$

---

**السؤال الثالث :** **( ١٤ علامة : ٧ + ٧ )**

أ) إذا كان $\text{هـ}(س) = جتا^{٢}س - ٢جاس$ ، $س \in ]٠ ، \pi[$ ، أوجد :

١) مجالات التقعر لأعلى وأسفل لمنحنى $\text{هـ}(س)$

٢) نقاط الانعطاف لمنحنى $\text{هـ}(س)$ ( إن وجدت )

ب) حل نظام المعادلات الآتي باستخدام طريقة جاوس :

$٢س + ص - ع = ٠$ ، $س - ص - ٦ = -ع$ ، $٢ص + س + ع = ٣$

---

**السؤال الرابع :** **( ١٤ علامة : ٨ + ٦)**

أ) شريط طوله ١٣٠ سم لف مرتين على علبة اسطوانية الشكل لتزيينها ، وخصص ١٠ سم لصنع ربطة التزيين العلوية ، جد طول نصف قطر العلبة وارتفاعها التي تجعل حجمها أكبر ما يمكن . ( انظر الشكل المجاور)

ب) إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٠ \end{bmatrix}$ ، حل المعادلة المصفوفية الآتية : $س \begin{bmatrix} -٢ & ١ \\ ٣ & ٤ \end{bmatrix} + ٢س = أ^{٢} + ٣م_{٢}$

## القسم الثاني

أجب عن أحد السؤالين الآتيين :

**السؤال الخامس :** **( ١٢ علامة : ٦ + ٦ )**

أ) إذا كان $\text{ه}(س)$ كثير حدود ، وكانت القيمة الصغرى المطلقة له تساوي ١ ، وكان التمثيل البياني لكل من $\text{ه}'(س)$ ، $\text{ه}''(س)$ موضحاً في الشكل المجاور ، أوجد :




١) قاعدة الاقتران $\text{ه}(س)$

٢) إذا كان $\text{ل}(س) = س^{٣} \text{ه}'(س) + \text{ه}^{٢}(س)$ ، أثبت أن $\text{ل}(س)$ متزايد عندما $س > ٠$

ب) إذا كان $\text{ه}(س)$ كثير حدود من الدرجة الأولى ، وكان $\text{ه}(١) = ١٥$ ، $\text{ه}(٤) = ٣٠$ ، جد قاعدة الاقتران $\text{ه}(س)$ مستخدماً قاعدة كريمر .

---

**السؤال السادس :** **( ١٢ علامة : ٦ + ٦ )**

أ) إذا كان $\text{ه}(س) = س^{٣} - ٦س^{٢} + أس$ ، جد قيمة / قيم الثابت أ التي تجعل $\text{ه}(س)$ متزايد على ح .

ب) باستخدام خصائص المحددات أثبت أن $\begin{vmatrix} ١ & ١ & ١ \\ س & ص & ع \\ صع & سع & سص \end{vmatrix} = (س - ص)(ص - ع)(ع - س)$

بالتوفيق والنجاح

| دولـــة فلســـطين<br>وزارة التربية والتعليم<br>مديرية التربية والتعليم/ نابلس<br>الامتحان المناطقي الموحد | بسم الله الرحمن الرحيم<br><br>امتحان نهاية الفترة الثانية | المبحث: رياضيات<br>الزمن: ساعتان<br>التاريخ : ١٩ / ١٢/ ٢٠٢١<br>العلامة: ١٠٠<br>الصف :الثاني الثانوي العلمي |
|---|---|---|

ملاحظة : عدد أسئلة الامتحان ستة أسئلة و على المشترك الإجابة عن خمسة منها

القسم الأول : يتكون هذا القسم من اربعة اسئلة أجب عنها جميعا

**السؤال الاول: انقل رمز الاجابة الصحيحة مقابل رقم الفقرة في دفتر الاجابة (٢٠ علامة)**

١)عدد النقاط الحرجة للاقتران ق(س) = $\sqrt{س^٢ - ٩}$ ، س ∈ [-١،٣] هو

أ) ٥ ب) ٤ ج)٣ د)٢

٢) إذا كان ق(س)= $هـ^{س^{٢}-١}$ ، س ∈ [-١ ، ١ ] فإن أصغر قيمة يتخذها ق(س) هي :

أ) هـ ب)٠ ج) ١ د) $\frac{١}{هـ}$

٣)اذا كان ق/ (س) = ١- جا٢س ، س∈ [ ٠ ، π ] فإن نقطة الانعطاف الأفقي لمنحنى ق(س) هي :

أ) $(\frac{π^٣}{٤}$ ، ٠) ب) $(\frac{π^٣}{٤}$ ، ق$(\frac{π^٣}{٤}))$ ج) $(\frac{π}{٢}$ ، ٠) د) $(\frac{π}{٢}$ ، ق$(\frac{π}{٢}))$

٤)اذا كان ن (س) = $س^٢$ + أس ، س ∈ [٣،٠] و كان ميل المماس عند جـ التي تعينها المتوسطة هو ١ ، فإن قيمة أ =

أ) $\frac{٣}{٢}$ ب) -٢ ج) ٢ د)-٦

٥)اذا كان ق/(س) = (١- $س^٣$)$^٢$ ( س-٢)$^٣$ فان ق يكون متزايدا في :

أ) [-١،٤] ب) [١،٢] ج)[∞-،٤][١،∞-] د)[١،٢][٤،∞-]

٦)الشكل المجاور يمثل منحنى ق(س) فأي من النقاط تكون عندها اشارة ق/ ، ق// سالبة




أ) ل ب) م ج) ن د) و

٧)الشكل المجاور يمثل منحنى ق//(س) وكان للاقتران نقطة حرجة وحيدة عند س=٢




و كانت ب ∈ مجال ق ، ب ≠٢ فإن

أ) ق(٢) = ق(ب) ب) ق(٢) <٠ ج) ق(٢) < ق(ب) د) ق(٢) >ق(ب)

٨) اذا كانت ب = $\begin{bmatrix} س & ص \\ ع & ل \end{bmatrix}$ ، | ٣ب|= -١٨ فإن $\begin{vmatrix} ع & ل \\ ع-٣س & ل-٣ص \end{vmatrix}$

أ) ٦ ب) -٦ ج) ٢ د) -٢

لاحظ الصفحة التالية

← يتبع صفحة( ٢ )

٢

تابع السؤال الأول :

٩)اذا كانت $[-٤ \quad س \quad ٠]\begin{bmatrix} ٠ & ٢ \\ ٥- & ٣ \\ ٣ & س \end{bmatrix}\begin{bmatrix} ٢ \\ ٤ \end{bmatrix} = [-٢]$ فإن س =

أ) - ٢ ب)-١ ج) ١ د)٢

١٠ ) إذا كانت ب ، جـ مصفوفتين مربعتين من نفس الرتبة و كانت جـ= $(\frac{١}{٢}$ ب$)^{-١}$ فإن ب . جـ =

أ) - $\frac{١}{٢}$ م ب) -٢م ج) $\frac{١}{٢}$ م د) ٢م

---

السؤال الثاني ( ٢٠ علامة)

أ) اذا كان ق(س) = $\begin{cases} س^{٢} - ٢س ، ٠ \geq س < ٢ \\ ٢س - ٤ ، ٢ \geq س < ٤ \end{cases}$ جد :

١)فترات التزايد والتناقص للاقتران ق

٢) القيم القصوى المحلية للاقتران ق (٨علامات)

ب) باستخدام القيم القصوى أثبت أن المقدار $٤س^{٣} - س^{٤} - ٢٩$ سالب دائما (٥علامات)

جـ) عند حل معادلتين باستخدام كريمر كانت س =$\frac{|أ_ر|}{|٤|أ_ر| + |أ_ر|}$ ، ١٠ ، وكانت $|٤|أ_ر| = ٦٤$ جد قيمة ص

( ٧علامات)

---

السؤال الثالث:(٢٠ علامة)

أ)اذاكان ق(س) = جا$^{٢}$س – جاس ، بين باستخدام نظرية رول أن للاقتران قتران ق(س) مماسا افقيا واحدا على الاقل في $]٠، \pi/٢[$ ، ثم جد قيمة جـ التي تعنيها النظرية (١٠ علامات)

ب)حل النظام التالي باستخدام طريقة جاوس

$٤|أ + ٥ب + جـ = ١٤$
$|أ + ٣ب + ٢جـ = ٧$
$ب + ١٠|أ = ١٢$

(١٠ علامات)

لاحظ الصفحة التالية

← يتبع صفحة(٣)

**السؤال الرابع : ( ٢٠ علامة )**

أ ) ا)اذا كان $س^{-١} = \begin{bmatrix} ٣ & ٢ \\ ٢ & ١ \end{bmatrix}$ ، $ص = \begin{bmatrix} ٢ & ٢ \\ -١ & ٠ \end{bmatrix}$ جد ع التي تحقق $ع^{-١} \times س = ص$ (١٠ علامات)

ب)اذا كان الشكل المجاور يمثل منحنى ق(س ) المعرف على] أ ، ب[

و كان ل/ (س) = $\frac{هـ^{س}}{ق(س)}$ جد فترات التقعر لمنحنى ل(س)




(١٠ علامات)

القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطالب الاجابة عن سؤال واحد منهما فقط

**السؤال الخامس: (٢٠ علامة)**

أ ) استخدم خصائص المحددات في إثبات أن $\begin{vmatrix} ١ & -١ & ب \\ ١-ب & ب & ب-١ \\ ب & -ب & ١ \end{vmatrix} = ١ - ب^{٢}$ (١٠ علامات)

ب) ق(س) اقتران كثير حدود له نقطة انعطاف عند س=٢ و معادلة المماس عندها هي ص= جـ س +٦ و قياس زاوية الانعطاف عندها $\frac{\pi ٣}{٤}$ جد نهـا $\frac{ق^{٢}(س) \cdot ق/(س)+١٦}{س^{٢} - ٤}$ (١٠علامات)

س ← ٢

---

**السؤال السادس: (٢٠ علامة)**

ب) إذا كان ق (س)= لـــو$_{هـ}$ ( س + $\frac{١}{س}$ ) ، س ∈ [أ ، ب] ، أ ، ب > ٠

استخدم نظرية القيمة المتوسطة في إثبات أن $\frac{لـــو_{هـ}(\frac{أ ب^{٢} + أ}{أ^{٢} ب + ب})}{ب - أ} = \frac{حـ^{٢} - ١}{حـ^{٣} + جـ}$ حيث جـ هي التي تعينها المتوسطة (١٠ علامات)

ب) مستقيم يمر بالنقطة (١، ٢) ويقطع محوري السينات والصادات في النقطتين أ ،ب جد أصغر مساحة ممكنة للمثلث و أ ب الواقع في الربع الاول حيث و نقطة الأصل (١٠علامات)

انتهت الأسئلة

الصف الثاني ثانوي علمي - رياضيات
امتحان نهاية الفصل الأول

التاريخ : ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م
مدة الامتحان : ساعتان ونصف

**القسم الأول : يتكون من أربعة أسئلة وعليك الإجابة على جميعها**

**السؤال الأول (٢٦ علامة): اختاري رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :**

١. إذا كان $ق(س) = ٨(\text{لو}_{هـ} س) + س^{٢}$ .جد قيمة/قيم $س$ التي تجعل المماس لمنحنى $ق$ $(س)$ أفقيا؟

أ) ٤ ب) ٢ ج) - ٢ د) $\pm ٢$

٢. إذا كان $ق'(س) = (س^{٢} - ١)^{٣} (س - ٢)^{٤}$ وكان $ق(س)$ اقتران متصل على $[٠ ، ٣[$ ما عدد النقاط الحرجة للاقتران $ق(س)$ :

أ) ٣ ب) ٢ جـ) ٤ د) ٥

٣. إذا كان $(أ - ب)^{-١} = \begin{bmatrix} ٢ & ٢ \\ ١ & ٠ \end{bmatrix}$ فما قيمة $٢أ - ٣(ب + ٤أ) + ٢ب$ :

أ) $\begin{bmatrix} ٠ & -١ \\ -\frac{١}{٢} & ١ \end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix} -١ & ١ \\ \frac{١}{٢} & ٠ \end{bmatrix}$ جـ) $\begin{bmatrix} ١ & ٠ \\ ٠ & -١ \end{bmatrix}$ د) $\begin{bmatrix} ٢ & ٢ \\ ١ & ٠ \end{bmatrix}$

٤. الشكل المجاور يمثل منحنى $ق'(س)$ . ما قيمة ظل زاوية الانعطاف لمنحنى الاقتران $ق(س)$ :

أ) صفر ب) ٢ جـ) ٤ د) ٥

٥. إذا كان للاقتران $ق(س)$ قيمة عظمى محلية عند $(٢ ، ٣)$ . وكان $هـ(س) = (١ - ق(س))^{٢}$ .فإن للاقتران $هـ(س)$

أ) قيمة صغرى محلية عند $(٢ ، -٨)$ ب) قيمة عظمى محلية عند $(٢ ، -٨)$

جـ) قيمة صغرى محلية عند $(٢ ، ٨)$ د) قيمة عظمى محلية عند $(٢ ، ٨)$

٦. ما قيمة $\text{نهـا}_{س \to ٠} \frac{(\text{لو}_{هـ}(س+١))^{٢}}{س^{٢}}$

أ) ٢ ب) ١ جـ) صفر د) $\frac{١}{٤}$

٧. إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} س & ١ \\ ص & ٣ \end{bmatrix}$ . $ب = \begin{bmatrix} ص - ٤ & ١ \\ س & ٣ \end{bmatrix}$ حيث $أ = ب$ . فإن قيمة $(س - ص)$ التي تجعل $أ$ منفردة :

أ) ٦ ب) ١٢ جـ) -٦ د) -١٢

٨. إذا كان $ق(س)$ كثير حدود معرف على ح . $ق'(١) = ٠$ . $ق''(١) \times ق''(٣) < ٠$ . وكان $ق'(س)$ متناقص في $[٢ ، ٤]$ . فإن النقطة $(١ ، ق(١))$ هي بالنسبة للاقتران $ق(س)$ :

أ) صغرى محلية ب) نقطة انعطاف جـ) عظمى محلية د) لايمكن تحديدها

٩. قذف جسم رأسياً للأعلى من سطح الأرض بحيث ارتفاعه بالأمتار عن نقطة قذفه يعطى حسب العلاقة $ف(ن) = أ ن - ٥ن^{٢}$ إذا علمت أن سرعة الجسم أثناء صعوده و بعد مرور ٦ ثواني تساوي نصف سرعته الابتدائية . فإن قيمة $أ$ :

أ) ١٢٠ ب) ٦٠ جـ) ٤٠ د) ٣٠

**القسم الأول : يتكون من أربعة أسئلة وعليك الإجابة على جميعها**

**السؤال الأول (٢٦علامة): اختاري رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :**

١. إذا كان ق(س) = ٨(لو س) + س$^{٢}$ .جد قيمة/قيم س التي تجعل المماس لمنحنى ق(س) أفقيا؟

أ) ٤ ب) ٢ ج) - ٢ د) ±٢

٢. إذا كان ق'(س) = (س$^{٢}$ - ١)$^{٣}$ (س - ٢)$^{٤}$ وكان ق(س) اقتران متصل على [٠ ، ٣[ ما عدد النقاط الحرجة للاقتران ق(س) :

أ) ٣ ب) ٢ جـ) ٤ د) ٥

٣. إذا كان (أ - ب)$^{-١}$ = $\begin{bmatrix} ٢ & ٢ \\ ١ & ٠ \end{bmatrix}$ فما قيمة ٢أ١ - ٣(ب + ٤أ) + ٢ب :

أ) $\begin{bmatrix} ٠ & -١ \\ \frac{-١}{٢} & ١ \end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix} -١ & ١ \\ \frac{١}{٢} & ٠ \end{bmatrix}$ جـ) $\begin{bmatrix} ١ & ٠ \\ \frac{١}{٢} & -١ \end{bmatrix}$ د) $\begin{bmatrix} ٢ & ٢ \\ ١ & ٠ \end{bmatrix}$

٤. الشكل المجاور يمثل منحنى ق'(س) . ما قيمة ظل زاوية الانعطاف لمنحنى الاقتران ق(س) :

أ) صفر ب) ٢ جـ) ٤ د) ٥

٥. إذا كان للاقتران ق(س) قيمة عظمى محلية عند (٢ ، ٣) . وكان هـ(س)= (١ - ق(س))$^{٢}$ .فإن للاقتران هـ(س)

أ) قيمة صغرى محلية عند (٢ ، -٨) ب) قيمة عظمى محلية عند (٢ ، -٨)

جـ) قيمة صغرى محلية عند (٢ ، ٨) د) قيمة عظمى محلية عند (٢ ، ٨)

٦. ما قيمة نهـا $\frac{(\text{لو}(س+١))^{٢}}{س^{٢}}$ ، س ← ٠

أ) ٢ ب) ١ جـ) صفر د) $\frac{١}{٤}$

٧. إذا كانت أ = $\begin{bmatrix} س & ١ \\ ص & ٣ \end{bmatrix}$ . ب = $\begin{bmatrix} ص & -٤ \\ س & ٣ \end{bmatrix}$ حيث أ = ب . فإن قيمة (س ص) التي تجعل أ منفردة :

أ) ٦ ب) ١٢ جـ) -٦ د) -١٢

٨. إذا كان ق(س) كثير حدود معرف على ح . ق'(١) = ٠ . ق''(١) × ق''(٣) < ٠ . وكان ق'(س) متناقص في [٢ ، ٤] . فإن النقطة (١ ، ق(١)) هي بالنسبة للاقتران ق(س) :

أ) صغرى محلية ب) نقطة انعطاف جـ) عظمى محلية د) لايمكن تحديدها

٩. قذف جسم رأسياً للأعلى من سطح الأرض بحيث ارتفاعه بالأمتار عن نقطة قذفه يعطى حسب العلاقة ف(ن) = أن - ٥ن$^{٢}$ إذا علمت أن سرعة الجسم أثناء صعوده و بعد مرور ٦ ثواني تساوي نصف سرعته الابتدائية . فإن قيمة أ :

أ) ١٢٠ ب) ٦٠ جـ) ٤٠ د) ٣٠

١٠) قيمة / قيم جـ التي تحددها نظرية رول للاقتران ق(س) = لـو (س + $\frac{١}{س}$) في الفترة [$\frac{١}{٤}$ ، ٤] هي :

أ) ١ ب) ±١ جـ) ٢ د) ٣

١١) إذا كان ق(س) = ٢ظا س . هـ(س) = $\frac{١}{١ + س^{٢}}$ وكان (هـ° ق)′($\frac{\pi}{٤}$) = $\frac{٨}{٢٥}$ جدي قيمة الثابت أ :

أ) -١ ب) ١ جـ) ٢٥ د) -٢٥

١٢) إذا كان ق(س) = $\frac{١}{هـ^{جاس}}$ . س ∈ [٠ ، π] . في أي الفترات التالية يكون ق(س) متزايد :

أ) [٠ ، $\frac{\pi}{٢}$] ب) [٠ ، $\frac{\pi}{٣}$] جـ) [$\frac{\pi}{٢}$ ، $\frac{\pi ٣}{٤}$] د) [π ، $\frac{\pi}{٢}$]

١٣) إذا كانت أ = $\begin{bmatrix} ١ & ٣ & ٥ \\ ٢ & ٤ & ٦ \end{bmatrix}$ . ب مصفوفة من الرتبة ن × ك . وكان أ . ب = م$_{٢}$ . فما قيمة المقدار أن + ك :

أ) ٦ ب) ٧ جـ) ٨ د) ٩

## السؤال الثاني : ( ٢٠ علامة )

أ) ( ١٤ علامة ) إذا كان ق(س) = س(٤ - س)$^{٢}$ حيث س ∈ [-١ ، ٥] جدي :

١) مجالات التزايد والتناقص
٢) القيم القصوى محددة نوعها
٣) مجالات التقعر
٤) نقط الانعطاف

ب) ( ٦ علامات ) إذا كان س جاص = ١ . أثبتي أن $\frac{ص}{س}$ = جتاص - قاص

## السؤال الثالث : ( ٢٠ علامة )

أ) ( ٧ علامات ) إذا كان جـ = $\begin{bmatrix} س & ١ & ١ - س \\ ١ - & ٠ & ٢ \\ س & ١ & ٠ \end{bmatrix}$ . أ = $\begin{bmatrix} س & ٢ \\ ٤ & ١ \end{bmatrix}$ ب = $\begin{bmatrix} ٢ - & ١ - \\ ٣ - & ٠ \end{bmatrix}$

جدي قيمة س بحيث | أجـ | - ٣ = | ٣ أ ب$^{-١}$ |

ب) ( ٨ علامات ) جدي معادلة العمودي على المماس لمنحنى العلاقة ٢ س$^{٢}$ - ٢ س ص + ص$^{٢}$ - ١ = ٠ .
عند نقطة تقاطع منحناها مع المستقيم س + ص = ٢

جـ) ( ٧ علامات ) ليكن ق . هـ اقترانين حيث ق(س) + هـ(س) = ٠ . هـ(س) - ق(س) = ٠ . وكان ق(س) ، هـ(س) > ٠ . وكان ع(س) = $\frac{هـ(س)}{ق(س)}$ . أثبتي أن ع (س) متزايد على مجاله .

**السؤال الرابع : (٢٠ علامة )**

أ) **( ٧ علامات )** إذا كان $أ = \begin{bmatrix} ١- & ٣ \\ ٠ & \frac{١}{٢} \end{bmatrix}$ . $ب = \begin{bmatrix} ٠ & ٤ \\ ٣ & ١- \end{bmatrix}$ أوجدي المصفوفة $س$ علماً أن :

$|أ^{-١}| س - ب س = أ^{٢}$

ب) **( ٧ علامات )** قذف جسم رأسياً إلى أعلى من سطح برج ارتفاعه ٢٢٥ م بحيث أن بعده عن قمة البرج يعطى بالعلاقة $ف(ن) = ٦٠ن - ٥ن^{٢}$ . جدي :

١. أقصى ارتفاع للجسم عن سطح الأرض

٢. سرعة الجسم عندما يكون قطع مسافة ٣٦٠ م

جـ) **( ٦ علامات )** جدي حجم أكبر مخروط دائري قائم يمكن رسمه داخل مخروط دائري قائم نصف قطر قاعدته ٤سم وارتفاعه ١٢سم بحيث يقع رأس المخروط الداخلي على مركز قاعدة المخروط الخارجي

**القسم الثاني : يتكون من سؤالين وعليك الإجابة على سؤال واحد فقط**

**السؤال الخامس : (١٤ علامة )**

أ) **( ٧ علامات )** إذا كان $٣ د(س) = د(٣س - ١) + د(٦ - س^{٢}) - ٢$ . وكان $د(٥) = ٤$ . جد متوسط تغير الاقتران $د(س)$ في الفترة $[١، ٥]$ حيث الاقتران $د(س)$ معرف في الفترة $[١، ٥]$ ؟

ب) **( ٧ علامات )** دون فك المحدد أثبتي أن :

$$\begin{vmatrix} ١ & ١- & ب \\ ١-ب & ب & ب-١ \\ ب & -ب & ١ \end{vmatrix} = ١-ب^{٢}$$

**السؤال السادس : (١٤ علامة )**

أ) **( ٨ علامات )** إذا كان $د(س) = \begin{cases} هـ(س) & ، ٠ \leq س < ٢ \\ ٣س^{٢} - ٢ & ، ٢ \leq س \leq ٤ \end{cases}$ وكان $د(س)$ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في $[٠ ، ٤]$ . $هـ(س)$ يحقق نظرية شروط نظرية رول في $[٠ ، ٢]$ . أثبتي وجود $جـ \in ]٠ ، ٤[$ بحيث $هـ'(س) = ٩$

ب) **( ٧ علامات )** إذا كان $س = جتا(٣ن) + \frac{١}{٢}$ . $ص = جا(٣ن) + \frac{١}{٢}$ . فجدي $\frac{ء^{٢} ص}{ء س^{٢}}$ عند $ن = \frac{\pi}{٦}$ .

**انتهت الأسئلة .. أمنياتي لكن بالتوفيق**

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم / يطا

الصف: الثاني عشر العلمي
التاريخ: الأحد ٢٠٢١/١٢/٢٦ م
مجموع العلامات ( ١٠٠ )

امتحان نهاية الفترة الأولى الثانية (الرياضيات) الزمن: ساعتان

**ملاحظة: عدد الأسئلة ستة أسئلة وعلى الطالب أن يجيب عن خمسة أسئلة فقط**

**القسم الأول: يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة على المشترك أن يجيب عنها جميعاً**

**السؤال الأول: (٢٠ علامة)**

**يتكون هذا السؤال من (١٠) فقرات من اختيار من متعدد، من أربعة بدائل، اختر رمز الإجابة الصحيحة، ثم ضع إشارة (×) في المكان المخصص في دفتر الإجابة:**

١. إذا كانت أ مصفوفة من الرتبة ٢ × ٣، جـ مصفوفة من الرتبة ٢ × ٥، فما رتبة المصفوفة (ب) حيث أ × ب = جـ؟

أ) ٢ × ٣ ب) ٣ × ٥ ج) ٥ × ٢ د) ٢ × ٥

٢. إذا كانت $\begin{vmatrix} س & ١ \\ ص & ٢ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ص & ١- \\ س & ٤- \end{vmatrix} = ٧$، فما قيمة ص ، س على الترتيب؟

أ) ٥ ، ٣ ب) ٣ ، ٥ ج) ١ ، ٤ د) ١ ، ٢

٣. إذا كان ن(س) = س $^{٢}$ |س|، ما العبارة الصحيحة فيما يأتي؟

أ) ن(٠) قيمة عظمى محلية ب) ن(٠) قيمة صغرى محلية ج) (٠ ، ٠) نقطة انعطاف د) ن$'$(٠) غير موجودة

٤. ما أقل قيمة للمقدار س$^{٣}$ − ٣س في الفترة [− ٣ ، ١]؟

أ) − ٣٦ ب) − ٣ ج) − ١٨ د) − ٢

٥. إذا كان ((س − ص) $^{٢}$ = ٤)، فما قيمة ($\frac{ص}{س}$) عند (ص = − ١ ، س > ٠)؟

أ) − ٢ ب) − ١ ج) ١ د) ٢

٦. إذا كانت معادلة العمودي على المماس لمنحنى ص = $\frac{أ}{س}$ عند نقطة التماس هي ص = أس، فما قيمة / قيم أ؟

أ) ٢ ب) ١ ج) ± ١ د) − ١

٧. إذا كانت (ن ∘ هـ$^{-١}$)$'$ (٢) = − ٦، وكان هـ(س) = س $^{٢}$ − س، فما قيمة ن$'$ (٣)؟

أ) $\frac{٣}{٢}$ ب) $\frac{٢}{٣}$ ج) ٢ د) − ٣

٨. إذا كانت ص$^{٣}$ = ن(٤س $^{٢}$ − س) ، ن$'$ (٥) = ٤ ، ن(٥) = − ٨، فما قيمة $\frac{ص}{س}$ عندما س = − ١؟

أ) − ٦ ب) ٣ ج) ٦ د) − ٣

٩. إذا كانت ن(س) = $\frac{س^{٢} - ٢س + ١}{س^{٢}}$، فان ق(س) متناقص على الفترة؟

أ) ]− ∞ ، ١[ ب) ]١ ، ∞[ ج) [٠ ، ١] د) ]٠ ، ١[

١٠. إذا كان لـو$_{هـ}$ ص = ١ + لـو$_{هـ}$ س، حيث س ، ص > ٠، فما قيمة $\frac{ص}{س}$، حيث هـ العدد النيبيري؟

أ) صفر ب) هـ ج) $\frac{س}{ص}$ د) ١ + هـ

**السؤال الثاني: (٢٠ علامة)**

أ) **إذا كان** $ن(س) = جا\frac{س}{٢} + \frac{١}{٢}جتاس$ ، $س \in \left[٠ ، \frac{\pi}{٢}\right]$ أجد كل مما يأتي: **(١٠ علامات)**

١. فترات التزايد والتناقص للاقتران $ن(س)$. ٢. القيم القصوى وبين نوعها.

ب) **إذا كان** $ن(س) = (س^{٢} - ١)(س - ١)^{٢}$ ، $س \in ]-١ ، ٥[$، أجد كل مما يأتي: **(١٠ علامات)**

١. فترات التقعر للأعلى وللأسفل للاقتران $ن(س)$. ٢. نقطة الانعطاف للاقتران $ن(س)$، إن وجدت.

**السؤال الثالث: (٢٠ علامة)**

أ) **إذا كانت قيمة** $\begin{vmatrix} س & ص & ع+٢ \\ س & ص+٢ & ع \\ س+٢ & ص & ع \end{vmatrix} = -٤$، استخدم خصائص المحددات لإيجاد قيمة المقدار $س + ص + ع$. **(١٠ علامات)**

ب) إذا كان المستقيم المار في النقطتين $(٠ ، -١)$ ، $(١ ، ب)$ ، مماساً لمنحنى $ن(س) = ٢س^{٢} - ٥س + ٧$، أجد قيمة / قيم $(ب)$. **(١٠ علامات)**

**السؤال الرابع: (٢٠ علامة)**

أ) إذا كان $(س - ص)^{٥} = س^{٢}$، أثبت أنّ $ص` = \frac{٣س + ٢ص}{٥س}$. **(١٠ علامات)**

ب) جد النقطة / النقط الواقعة على منحنى العلاقة $ص^{٢} - ٢ص - س^{٢} = ١١$، والتي تكون أقرب ما يمكن من النقطة $(٤ ، ١)$. **(١٠ علامات)**

**القسم الثاني: يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى المشترك أن يجيب عن أحدهما.**

**السؤال الخامس: (٢٠ علامة)**

أ) من قمة برج أسقط جسم رأسياً للأسفل بحيث أن المسافة التي يقطعها $ف = ٥ن^{٢}$، وفي نفس اللحظة قذف جسم رأسياً للأعلى من الأرض، بحيث أن ارتفاعه عن نقطة القذف $ف_{١} = ١٨ن - ٥ن^{٢}$، إذا قطع الجسم الأول $(\frac{٢}{٣})$ ارتفاع البرج عندما وصل الجسم الثاني إلى أقصى ارتفاع له عن سطح الأرض، وكانت المسافة بينهما في تلك اللحظة (٤٠) متراً، جد ارتفاع البرج. **(١٢ علامة)**

ب) الشكل المجاور يمثل منحنى كل من $ن`(س)$ ، $هـ(س)$، ابحث في تقعر الاقتران $ك(س) = (ن \circ هـ)(س)$ في $]أ ، ب[$. **(٨ علامات)**




**السؤال السادس: (٢٠ علامة)**

أ) **إذا كان** $ن(س) = \begin{cases} \frac{س^{٢} + أ}{س - ٢} & ، س < ٢ \\ ب س^{٢} + ﺟ & ، س \geq ٢ \end{cases}$، يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في $[١ ، ٣]$ جد.

١. الثوابت أ، ب، ﺟ. ٢. قيمة **ﺟ** التي تعينها النظرية. **(١٢علامة)**

ب) إذا كان $ن(٩ - س^{٢}) = ن(٢س + ١) - ن(س) + ٢$، وكان متوسط تغير $ن(س)$ في $[٢ ، ٣]$ يساوي $-٤$،أجد ق(٧) علما أن ق(٠)=ق(٣). **(٨ علامات)**

**انتهت الاسئلة**

القسم الأول : يتكون من أربعة أسئلة أجب عنها جميعاً

السؤال الأول: اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي: (٢٤ علامة)

١) إذا كان ق(س، ١) = س٣ + ٣س + ب ، فما متوسط التغير في الاقتران ق(س) في الفترة [-١، ٢]

أ) -٣ ب) -١ جـ) ١ د) ٢

٢) ما أكبر قيمة للاقتران ق(س) = $\frac{٣}{س^٢ + ١}$ ؟

أ) ١٠ ب) صفر جـ) ٣ د) ٢

٣) النقطة (٠، ١) هي نقطة انعطاف لمنحنى أحد الاقترانات التالية :

أ) ق(س) = س٣ + ١٠ ب) هـ(س) = ١ - س٣

جـ) ل(س) = س٣ + ١ د) س٢ + ١

٤) إذا كانت أ = $\begin{bmatrix} ١ & ٥ \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$ فإن أ٢٠٠ + (أ)٢٠٠

أ) $\begin{bmatrix} ٢ & ١٠٠٥ \\ ٠ & ٢ \end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix} ١ & ١٠٠٠ \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$ جـ) $\begin{bmatrix} ٠ & ٢ \\ ١٠٠٠ & ٠ \end{bmatrix}$ د) $\begin{bmatrix} ١ & ٠ \\ ١٥٠٠ & ١ \end{bmatrix}$

٥) $\lim_{هـ \to ٠}$ $\frac{جا^٢(س + ٢هـ) - جا^٢س}{٣هـ}$

أ) ٢ جا٢س ب) $\frac{١}{٣}$ جتا٢س جـ) جاس جا٢س د) جتا٢س

٦) إذا كان ق(س) = $\begin{cases} ٢س & ٠ \leq س < ١ \\ س^٢ + ١ & ١ \leq س \leq ٢ \end{cases}$ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في [٠، ٢] فإن قيمة جـ التي تحققها النظرية

أ) $\frac{٤}{٥}$ ب) $\frac{٢}{٣}$ جـ) $\frac{٣}{٢}$ د) $\frac{٥}{٤}$

٧) إذا كان لمنحنى الاقترانين ق(س) = ٢س٣ + ١ ، هـ(س) = ٣س٢ + ب س مماساً مشتركاً عند س = ١ ، فما قيمتي ٢ ، ب على الترتيب

أ) ٣ ، ٢ ب) ٣ ، ٤ جـ) ٢ ، ٣ د) غير ذلك

٨) عند حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة كرامر وجد أن $\text{أ} = \begin{pmatrix} ٨ & ٣ \\ ٥- & ٢- \end{pmatrix} \cdot \text{ب} = \begin{pmatrix} ٢- \\ ١ \end{pmatrix}$ . فإن قيمتي س ، ص على الترتيب

أ) ٢ ، ١ ب) -٢ ، -١ ج) ١٠ ، ٢٠ د) ٢ ، ١٠

٩) إذا كانت س ، ص ، ع ثلاث مصفوفات من الرتبة الثانية ، $|\text{ع}| = ٥$ ، فإن إحدى العبارات التالية صحيحة دائماً

أ) إذا كانت س ≠ ص ، ص ≠ ع فإن س ≠ ع ب) إذا كانت س ≠ ص ≠ و فإن س ≠ و أو ص = و

ج) $\text{س}^{٢} - \text{ص}^{٢} = (\text{س} - \text{ص})(\text{س} + \text{ص})$ د) $|(٢\text{ع})^{-١}| = \frac{١}{|\text{ع}|٤}$

١٠) من الشكل المحاور الذي يمثل الاقتران ق (س) ، إذا كانت $\text{ص} = \text{ق}'(\text{س})$ ، فإن $\int_{-٤}^{٠} \text{ص}\,\text{د س}$ تساوي




أ) -٤ ب) ١ ج) ٢ د) ٨

١١) إذا كانت $\text{ص} = \sqrt{\text{س}^{٢} + ٩}$ فإن $\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} =$

أ) س ب) ٢س ج) $\frac{\text{س}}{\text{ص}}$ د) $\frac{\text{ص}}{\text{س}}$

١٢) إذا كان ق(س) = ٥ ، ٢ ، فإن ق(٢) =

أ) ٢٠ ب) ١٠ ج) ٤٠ د) ٦٠

---

السؤال الثاني: أ) باستخدام طريقة حاوص حل النظام التالي: (٢٠ علامة)

س + ص + ع = ١ ، س + ص + ٤ع = ٤ ، س - ص - ع = -١

ب) إذا كان ق(س) كثير حدود من الدرجة الثانية والمار بنقطة الأصل يحقق شروط نظرية رول على الفترة $[٠ ، ٤]$ وله قيمة صغرى قيمتها -٤ ، حد قاعدة الاقتران ق (س)

ج) إذا كان ق (س) = (س + ٢)$^{٢}$ (س - ٢) حد مجالات التقعر و نقطة / نقاط وزوايا الانعطاف للاقتران ق(س)

---

السؤال الثالث: أ) إذا كان ق(س) = ما (جتا س) + طاس ، حيث $\text{س} \in [٠ ، ٢\pi]$ حد مجالات التزايد والتناقص والقيم القصوى مبيناً نوعها (٢٠ علامة)

ب) إذا كان $\text{ص}^{٣} = \text{ص}^{٢} - (\text{س} + \text{ص})^{٢}$ أثبت أن $\frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \frac{\text{ص}}{\text{س}}$

ج) إذا كانت $\text{ب}^{-١} = \begin{pmatrix} ٥ & \text{س} \\ ٣ & ٤ \end{pmatrix} \cdot \text{ب} = \begin{pmatrix} ٦ & \text{س}^{٢} \\ ١٠ & ٨ \end{pmatrix}$ فجد المصفوفة س بحيث أن :

$\text{س} = ٤ (\text{ب ب}^{-١})^{-١} = \text{ب} \times \begin{pmatrix} ٢ & ١ \\ ٠ & ٣- \end{pmatrix}$

السؤال الرابع: أ) إذا كان ق(س)= ٢جاس ، هـ(س)= $\frac{\text{س}^{٣}}{\text{س}^{٢}+٥}$ وكان ( هـ ∘ ق )$'(\frac{\pi}{٦})$ = صفر ، (٢٠علامة)

جد قيمة الثابت ٢ ، حيث ٢≠٠

ب) قذف جسم رأسياً إلى أعلى من قمة برج بحيث أن ارتفاعه عن قمة البرج معطى بالعلاقة ف= ٣٠ن ـ ٥ن$^{٢}$

، حيث ف الارتفاع بالأمتار ، ن الزمن بالثواني جد :

١) ارتفاع البرج علماً أن أقصى ارتفاع للجسم عن سطح الأرض = ٢٨٠ م .

٢) سرعة ارتطام الجسم بالأرض

ج) إذا كانت س= $\begin{bmatrix} \text{جا}^{٢}\text{س} & \frac{١}{٢}\text{جا}٢\text{س} \\ \frac{١}{٢}\text{جا}٢\text{س} & \text{جتا}^{٢}\text{س} \end{bmatrix}$ وكانت ص = م ـ س ، اثبت أن ص$^{٢}$= ص

---

القسم الثاني: يتكون من سؤالين أجب عن أحدهما

السؤال الخامس: أ) ا ب ح مثلث قائم الزاوية إحداثيات رؤوسه ا(٥ ، ٠)، ب(٠ ، ٠)، ح ( ٠ ، ٥ ) ، (١٦علامة)

رسم بداخله مستطيل ينطبق رأسان من رؤوسه على الضلع ب ح وأحد رأسيه الآخران على الضلع ا ح

والرأس الآخر على الوتر ص=س$^{٢}$ ، جد أكبر مساحة ممكنة للمستطيل

ب) حل المعادلة المصفوفة الآتية ٣س ٠ س$^{-١}$= $\begin{bmatrix} \frac{١٥}{٢} & \frac{١٣}{٢} \\ ٢ & ٠ \\ ٤ & ٠ \end{bmatrix}$ علماً أن ا (٢س)$^{-١}$= $\frac{١}{٨}$

---

السؤال السادس: أ) في الشكل المجاور الذي يمثل ق(س) ، هـ(س) في [ ا ، ب] اثبت أن (١٠ علامة)

٢ ( ق(س) ∘ هـ(س))$'$ > (ق$'$(س))$'$ ـ (هـ$'$(س))$'$




ب) باستخدام خصائص المحددات اثبت أن :

$$\begin{vmatrix} ب & ا & ا \\ ا & ب & ا \\ ب & ا & ب \end{vmatrix} = -(ب - ا)^{٢}(ا + ب)$$

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي
مديرية التربية والتعليم/ شمال غزة
الفترة الصباحية

امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية لمبحث الرياضيات
للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢
للصف الثاني عشر علمي

٨٠

التاريخ : ٢٧ / ١٢/ ٢٠٢١
الزمن : ساعة ونصف

اسم الطالب: .....
اسم المدرسة : .....

ملاحظة :عدد أسئلة الورقة (خمسة) أسئلة ، أجب عن (ثلاثة) منها فقط

القسم الأول : يتكون هذا القسم من (ثلاثة) أسئلة ، وعلى المشترك أن يجيب عن سؤالين منها على أن يكون السؤال الأول منها.

**السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة (١٨ علامة)**

١) إذا كان ميل المستقيم القاطع الواصل بين (٢ ، ق(٢)) و (٥، ق(٥)) الواقعتين على منحنى ق(س) = س$^{٢}$ + ب س يساوي ٤ ، فما قيمة الثابت ب؟

أ) -٣ ب) ٣ جـ) -٧ د) ٧

٢) إذا كان ص = س + [س + ١,٢] + $\sqrt{س^{٢}}$ ، فما قيمة $\frac{ص}{س}$ عندما س = -١؟

أ) غ.م ب) ١ جـ) ٢ د) صفر

٣) إذا كان ص = ل$^{٢}$ ، (س + ل)$^{٢}$ = ٤، فجد $\frac{ص}{س}$ عندما س = صفر ، ل > ٠؟

أ) -٣ ب) -٢ جـ) -٤ د) -١

٤) إذا كان ق(س) = س$^{٣}$ - ٤، فإن قيمة (ق ∘ ق)$'$(١) = .....

أ) ٢٥ ب) ١٠٠ جـ) ٥٠ د) -٥٤

٥) ما قيمة $\frac{ص}{س}$ لمنحنى العلاقة س = ظا(ص)، عند س = ٢؟

أ) $\frac{١}{٥}$ ب) ٥ جـ) $\frac{١}{٢}$ د) ١

٦) إذا كان ق(س) اقتران متصل على [-١، ٣] ، وكانت ق$'$(س) = $\frac{(س-١)^{٣}}{(س-٢)^{٢}(س+١)}$ ، فإن عدد النقاط الحرجة للاقتران ق(س) هي.....

أ) ٢ ب) ٣ جـ) ٤ د) ٥

٧) إذا كان ق$'$(س) متناقصا على ح ، وكان ق$'$(٢) = ٠، فإن النقطة (٢، ق(٢)) هي:

أ) قيمة صغرى محلية ب) قيمة عظمى محلية جـ) نقطة انعطاف د) ق$'$(٢) = ٠

٨) إذا كان ق(س) = ٣$\sqrt{س^{٢}}$ ، س ∈ [-١، ١]، فإن للاقتران ق قيمة صغرى مطلقة عند ....

أ) (-١ ، ١) ب) (١ ، ١) جـ) (٠ ، ٠) د) (٠ ، ١)

٩) إذا كان المستقيم س - ص + جـ = ٠ يمس منحنى الاقتران ق(س) = $\frac{-١}{س}$ عند النقطة (س ، ص) ، فإن قيمة الثابت جـ تساوي.....

أ) ١ ، -١ ب) ١، -٢ جـ) ٢، -٢ د) ٢، -١

اقلب الصفحة

**السؤال الثاني : (٣٧علامة)**

أ) ق(س) كثير حدود معرف على ح من الدرجة الثالثة ق(س) + ق″(س) = س$^{٣}$ + ٦س$^{٢}$ − ٣س + ٢، جد القيم القصوى المحلية وفترات التزايد والتناقص للاقتران ق(س)؟ (١٧علامة)

ب) إذا كان ق′(٢س) = (١ + س)هـ$(\frac{٢}{س})$، جد معادلة العمودي على منحنى الاقتران ق(س) عند $(٤، \frac{١}{٤})$ علمًا بأن معادلة المماس لمنحنى هـ(س) عند س = ١ هي ص = ١ + ٤س ؟ (١٠علامة)

ت) إذا كان ق(س) كثير حدود، وكانت $\lim_{س \to ١} \frac{\sqrt{ق(س)} - ٢}{٢س - ٢} = ٥$ ، ك(س) = $\frac{س^{٢}}{ق(س)}$، جد ك′(١)؟ (١٠علامة)

---

**السؤال الثالث : (٣٧علامة)**




أ) الشكل المجاور يمثل منحنى ق″(س) إذا علمت أن ق(س) اقتران كثير حدود معرف على ح له ثلاث نقاط حرجة عند س = −٢، ٢، ٦

جد : مجالات التزايد والتناقص للاقتران ق(س).

فترات التقعر لأعلى ولأسفل ، ونقطة الانعطاف إن وجدت. (١٧علامة)

ب) يتحرك جسم على خط مستقيم وفق العلاقة ع$^{٢}$ (ن) = ٦ − $\frac{١}{ف(ن)}$، حيث ف : المسافة بالأمتار ، ن الزمن بالثواني

جد قيمة الثابت أ علمًا بأن تسارع الجسيم في لحظة انعدام سرعته هي ٩ م/ث$^{٢}$ . (١٠علامة)

ت) إذا كان ق(٢س + ٥) = س$^{٣}$ + ٢س، قابلا للاشتقاق، جد $\lim_{ع \to ١} \frac{ق(ع^{٢} + ٢ع) + ٣}{لو_{هـ} ع^{٢}}$ (١٠علامة)

**القسم الثاني : يتكون من سؤالين وعلى الطالب الإجابة عن أحدهما**

**السؤال الرابع : (٢٥علامة)** ( ٩- ١٠-٦)علامة

أ) بين أن الاقتران ق(س) = س$^{٢}$ − س − ٦ يحقق شروط نظرية رول في [١، ٤]، ثم جد قيمة جـ التي تعينها النظرية.

ب) علبة على شكل متوازي مستطيلات قاعدته مستطيلة الشكل طولها ضعف عرضها، فإذا كان مجموع ارتفاعها ومحيط قاعدتها يساوي ٤٥ سم، فأوجد أبعاد العلبة عندما يكون حجمها أكبر ما يمكن؟

ت) إذا كانت ص = (جاس + جتاس)$^{٤}$ ، فأثبت أن ص″ + ٤ص = ٢ اجتا$^{٢}$٢س.

---

**السؤال الخامس: (٢٥علامة)** ( ٩-١٠-٦)علامة

أ) بين أن الاقتران ق(س) = س$^{٣}$ + ١ يحقق شروط نظرية القيمة المتوسطة في [−٢، ١]، ثم جد قيمة جـ التي تعينها النظرية .

ب) مستطيل محيطه ٣٦ سم ثني ليكون أسطوانة، فأوجد أكبر حجم ممكن للأسطوانة.

ت)إذا كان ص = $\frac{١ - ظاس}{١ + ظاس}$ ، أثبت أن $\frac{د ص}{د س} = \frac{٢}{١ + جا٢س}$

انتهت الأسئلة

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

**السؤال الثالث:** (٢٠ علامة)

أ) جد معادلة المماس المرسوم من النقطة (-٥ ، ٠) لمنحنى الاقتران ق(س) = $\frac{١}{س - ٣}$ . (٨ علامات)

ب) إذا كان ق(س) = ٤س$^{٣}$ - س$^{٤}$ ، س ∈ [-٥،٣] أوجد : (١٢ علامة)

١) مجالات التزايد والتناقص للاقتران ق(س).

٢) القيم القصوى المحلية والمطلقة للاقتران ق(س).

٣) مجالات التقعر للأعلى وللأسفل للاقتران ق(س).

**السؤال الرابع:** (٢٠ علامة)

أ) أثبت باستخدام نظرية بلزانو أن الاقتران ق(س) = جاس + جتاس يقطع محور السينات في الفترة ] $\frac{\pi}{٢}$ ، $\frac{\pi ٣}{٢}$ [ ثم جد الإحداثي السيني لنقطة تقاطع منحنى الاقتران ق(س) مع محور السينات. (٩ علامات)

ب) أجرى سباق بين طريقان متعامدان في هـ طولهما ٩٠٠ متر ، ٧٠٠ متر على الترتيب ، تحرك رجل من أ إلى هـ بسرعة ثابتة ٦م/ث، تحرك رجل آخر من ب إلى هـ بسرعة ٨م/ث بعد تحرك الأول بثانيتين ، جد معدل تغير مساحة المثلث الذي رؤوسه موقعا الرجلين والنقطة هـ بعد ٥ ثواني من تحرك الشخص الأول. (١١ علامة)

**القسم الثاني: يتكون من سؤالين وعلى الطالب الإجابة عن سؤال واحد فقط**

**السؤال الخامس:** (١٠ علامات)

أ) إذا كان س = طاس + قاس أثبت أن س' = ١ - جاس . (٥ علامات)

ب) إذا كان ق(س) = ب طاس ، هـ(س) = $\frac{١}{٢س + ١}$ وكان (هـ ∘ ق)'($\frac{\pi}{٤}$) = $\frac{٨}{٢٥}$ ، نهـا ق(س) = ٢ جد قيمة الثابت ب (٥ علامات)

**السؤال السادس:** (١٠ علامات)

أ) سلك طوله ٦٠سم قطع إلى جزأين فكون من كل جزء مستطيل طوله مثلي عرضه جد أقل مساحة ممكنة للمستطيلين. (٥ علامات)

ب) بالاعتماد على الشكل المجاور أثبت أن الاقتران ل(س) = (ق × هـ)(س)

متزايد للأعلى في الفترة ] -∞ ، ٢[ حيث هـ(س) اقتران خطي . (٥ علامات)




**انتهت الأسئلة**

ج) استخدم طريقة جاوس لحل النظام الآتي :
$$\begin{aligned} س - ص + ع &= -٢ \\ س + ٢ص + ع &= ٤ \\ -٢س + ٢ص - ع &= ٣ \end{aligned}$$
( ٦ علامات )

---

السؤال الرابع : ( ٢٠ علامة)

أ) جد قيمة / قيم س التي تجعل $\begin{vmatrix} س & -١ \\ ١ & س \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ٢ & -١ & ٣ \\ ٤ & س & ٥ \\ ١ & ٦ & ٣ \end{vmatrix}$ ( ١٠علامات )

ب) شبه منحرف فيه ٣ أضلاع متساوية في الطول وطول كل منها ٦سم ، جد أكبر مساحة ممكنة لشبه المنحرف .




( ١٠ علامات)

القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطالب أن يجيب عن سؤال واحد فقط .

السؤال الخامس: ( ١٠ علامات)

أ) إذا كانت س = ظا ص ، أثبت أن $ص'' = \frac{-جا٢ص}{(١ + س^{٢})^{٢}}$ . ( ٥ علامات )

ب) إذا كان ق(س) كثير حدود معرف على ح وكانت $ق'(٢) = ق'(٦) = ٠$ ، $ق''$ متناقص على $]-\infty ، ٤]$ ومتزايد على $[٤ ، \infty[$ جد :
١) نقط القيم القصوى المحلية للاقتران ق(س)
٢) مجالات التزايد والتناقص للاقتران ق .
( ٥ علامات)

---

السؤال السادس : ( ١ علامات)

أ) إذا كانت $هـ^{ص+ص} = هـ^{ص} + هـ^{ص}$ أثبت أن $ص' = هـ^{ص} - هـ^{ص-ص}$ . ( ٦ علامات)

ب) استخدم خصائص المحددات لأثبات أن $\begin{vmatrix} ١ & ٢جا^{٢}١ & ١ \\ ٢جتا^{٢}١ & ١ & ١ \\ جتا^{٢}١ & جا^{٢}١ & ١ \end{vmatrix}$ = صفر . ( ٤علامات)

انتهت الأسئلة
مع أمنياتنا لكم بالتفوق دائماً